



27,140/3





Digitized by the Internet Archive  
in 2018 with funding from  
Wellcome Library

[https://archive.org/details/b30528112\\_0003](https://archive.org/details/b30528112_0003)





3385  
ANTONII DE HAEN

S. C. R. A. MAIESTATIS CONSILIARII ET ARCHIATRI  
NEC NON MEDICINÆ IN HAC ALMA ET ANTIQ.  
UNIVERSITATE PROFESSORIS PRIMARIJ,  
SOCIETATIS MAARLEMENSIS SOCH,

PARS SEXTA

RATIONIS MEDENDI

IN NOSOCOMIO PRACTICO,

*Quod in gratiam, & emolumentum  
Medicinæ Studioforum*

CONDIDIT

MARIA THERESIA,

AUGUSTISSIMA ROMANORUM

IMPERATRIX,

HUNG. BOHEM. &c. REGINA &c. &c.



LUCÆ MDCCLXV.

---

Ex Typographia Jacobi Justi,  
SUPERIORUM PERMISSU.



SACRÆ, CÆSARÆ, REGIÆ, APOSTOLICÆ, MAJESTATI,  
AUGUSTISSIMA ROMANORUM  
IMPERATRICI,  
HUNGARIÆ, BOHEMIÆ, DALMATIÆ, CROATIÆ,  
SCLAVONIÆ, &c. &c.  
REGINÆ,  
ARCHIDUCI AUSTRIÆ, &c. &c.  
MARIÆ THERESIÆ,  
DOMINÆ SUÆ CLEMENTISSIMÆ,

ANTONIUS DE HAEN.

**M**ole grandescit, quod ad pedes MA-  
JESTATIS TUÆ annum depono opus: quo-  
niam primo frequentioris experimenti sese ob-  
tulit occasio; deinde arcanas Naturæ leges in-  
vestigandi ardor Inventis ingeminabatur; tan-  
dem



4  
dem discendi avida, atque insatiabilis, Juven-  
tus Academica, nova in dies a me expectavit,  
petivit, urfit. Symbolam contulit longe fre-  
quentius Chirurgiæ, Medicinæ genuinæ Soro-  
ris, exercitium. Quin etiam notabiles, damno-  
sique in Arte errores, examinandi, atque ex-  
pugnandi fuerant. Crevit sic in immensum  
Labor, sed una cum labore Voluptas: cum  
quod Artem purificare, & amplificare posse,  
jucundissimum sit; tum quod eo majorem be-  
nevolentiam, eo gratiosorem MAJESTATIS  
TUÆ favorem, me mihi conciliaturum certo  
nossem, quo demandatam abs TE provinciam  
majori cum ardore, discentiumque emolumento,  
excoluissem.

Die 26. Octobris  
1761.

ELEN-

# ELENCHUS CAPITUM.

## C A P. I.

De Cardialgia Chronica.

## C A P. II.

De vario Hydrope ac tumóre Abdominis.

## C A P. III.

De Hydrope pectoris.

## C A P. IV.

Problemata & Difficultates.

## C A P. V.

De Calculo Vesicæ Urinariæ, & Lithotomia.

C A P. VI.

De Cranii uestione in pertinacioribus vi-  
tiis Capitis.

C A P. VII.

De quorundam Medicamentorum viri-  
bus.





## C A P U T I.

### De Cardialgia Chronica.

---

§. I. Cardialgia multis oriunda de causis; protopathica datur, & deuteropathica. §. II. Scirrhi; ut causæ, susceptionem tum diuturnitas morbi; tum ejusdem pertinacia, haud immerito fecerunt; interea dum remedia nonnulla diu, constanterque adhibita, constantemque sanitatem operata, clare demonstrant, necdum scirrhum adfuisse, sed alias pertinaces causas. §. III. Nihilominus frequens heu nimium! Cardialgiæ causa scirrhus est; quem cognoscendum regulæ artis sæpenumero quidem dant; quanam vero in parte is resideat, rarius viventibus ægris, frequentius in denatis, certo novimus. §. IV. Causa in Pyloro protopathica dum adest in nonnullis; jugi ingestorum vix mutatorum vomitu se prodit; in aliis minime: probatur utrumque exemplis. §. V. Frequentior ea nihilominus Observatio est, quod vomitus ille adsit, dum vel causa protopathica in Pyloro, vel deuteropathica pone Pylorum est, quam quod non adsit. Historiæ id confirmantes: §. VI. Solet eo in casu ventriculus vehementer augeri, nonnunquam sola amplitudine; aliquoties etiam crassitie: vix capitur vera hujus differentiae ex observationibus causa. §. VII. Quæstio hæc ad plura

*cava viscera adplicata, varietatem detegit eandem. Discrepantia sententiarum circa uterum aufertur exemplis, quæ indubie demonstrent illum crescendo haud amittere crassitiem, quam non imprægnatus habebat. Tuba, Ovaria, Hydatides, quoque crassitudine tunicarum passim augentur. §.VIII. Confirmatur argumentum de difficiliore hujus morbi Diagnostica; dum vomitus vix mutatorum ingestorum diuturni latentissima & insolita plane causa nonnunquam deprehenditur. Prudentia & Præcautiones commendantur, dum ejusmodi insolite causæ suspicio est.*

§. I. **C**ardialgiam Chronicam hic describere animus non est, sufficienter id scholis, scriptisque Medicorum præstantibus; verum ea potius communicare, quæ propriæ observationes ad illam elucidandam contulerint. Quod ordine ut faciam, præmittere debebo recensitionem variarum admodum partium, viscerumque, in quibus hic morbus sedem, originemque, unquam habuisse inventus est.

Ac primo quidem ipse Ventriculus cum Pyloro recensetur, suo affectus in cavo, substantiave. Estque tunc Protopathica Cardialgia, quo etiam eæ species pro parte referendæ, quæ N<sup>o</sup> 28. 29. 30. 31. recensentur. 2. Oesophagus pone ventriculum. 3. Diaphragma. 4. Pancreas. 5. Duodenum. 6. Omentum. 7. Hepar. 8. Splen. 9. Sternum aut mucrone suo, aut adnato sibi tumore. 10. Muscoli Recti Abdominis. 11. Vesicula fellis. 12. Mesenterium. 13. Renes & Ureteres. 14. Uterus. 15. Ovaria. 16. Tuba Fallopii. 17. Præternaturales Concretiones ac Tumores, in appendicibus per Abdomen adiposis. 18. Hydatides. 19. Aqua, Serum, Pus, Ichor, Mucus, Sanies, aut quicunque alii liquores, sive in vacuum effusi Abdomen, sive faccis, hydatidibusque contenti. 20. Affectiones spermaticorum vasorum. 21. Aneurismata varia. 22. Viscerum variorum degeneratio. 23. Mutuaque eorundem inter sese concretio. 24. Hernia



nīa levior, euns, redeuns, sæpe ignota. 25. Prolapsus uteri, ac vaginæ varius. 26. Multiplicia intestinorum incommoda. 27. Cephalæa. 28. Nimia debilis ventriculi sensilitas. 29. Hystericus clavus. 30. Peculiares atque insuperabiles ventriculi crampi dicti. 31. Humores acidi, alcalini, fordes, vermes, in ventriculo fixi, aut perpetui.

De Cardialgia in enumeratorum partium una, pluribusve, sede; a recensitarum una, pluribusve, causis; innumera quidem exempla nos convincunt; at vero cum de Cardialgia, ut monui, tractatum non conscribam, ea modo tangam, circa quæ mea, aliorumque, sive nuperimæ, sive saltem necdum publice editæ observationes versantur. Si qua tandem veterum observata simile quid innuant, ea quoque recensebo.

Multis admodum ventriculus, longo annorum spatio, irritato artis conamine, dolet, nauseat, vomit; & his quidem perpetuo, aliis vero periodice.

Emetica, alvi purgationes, antacida, roborantia, nerviana, carminantia, opiata, haud raro, sive singula, sive succedente ordine data fuerint, levamen afferunt, at passim fugax illud, atque inconstans, sæpe omnino fallax. His omnibus vel Protopathicum malum est, quibus ventriculus debilis, aut sensibilissimus, aut multo acore obsessus, aut in fabrica sua varii generis tumores gerit; vel est deuteropathicum, dum vel corrupti humores ex Intestinis, perque Intestina, aut vermes, aut fordes, multave bilis in *πυρόχολος ἀνὰ*, in ventriculum sæpius, inexhaustoque fonte, irrepunt: maxime autem quando ille adjacentium partium tumore, duritie, scirrho, premitur, vellicatur, continuoque irritatur.

§. II. Quos mihi hoc morbo laborantes videre contigit, annosum admodum malum passim hi testabantur, & ad oblata auxilia rebelle. Unde scirrhi, aliussve generis tumoris, sive Ventriculi, Pylorique, sive partium vicinarum, Ventriculum, aut Pylorum comprimētis, vehemens sæpe suspicio mihi nata est. Incertus tamen, atque



que animo fluctuans, dum sequentia adhibebam, dicere vix possum, quam multis integram attulerim sanitatem, adeoque omnem apud illos scirrhorum suspicionem mente excusserim. Præfari autem oportet Incomparabili *Boerhaavio* me hanc methodum debere.

Primo ad externam ventriculi regionem sequens ad-movi Emplastrum: R. Empl. de Labd. vel Diabot. unc. js. Camphoræ, Opii crudi, a scrup. s. gr. xv. scrup. j. Balf. peruy. q. s. M. Diu gerendum hoc Emplastrum fuit, dumque laberetur, reficiendum. Et si quis cutis ardor, vel efflorescentia in nonnullis ejusdem ablationem nonnunquam posceret, adplicationis continuationem cutis denuo in plerisque admisit, sit sæpius sapone cum lacte lota, fotaque fuerat. Deinde assumere quovis bihorio, aut trihorio cochlearia duo Misturæ hujus: R. Lap. Cancror. unc. s. Ol. still. Menthæ cum Sacchari dr. iij. in Elæosacch. redacti gutt. X. Spir. Menth. unc. j. Laud. Liq. Syd. dr. s. Syr. Menth. unc. j. Ag. Menth. unc. viij. Est id genus hominibus tarda passim & sicca alvus: quemadmodum alias sæpius adverti, ita hic quoque plures fuere, quibus Opium & Carminantia hujus misturæ alvum maxime naturalem redderent, vel operationem levioris subinde dati purgantis egregiam perficerent. Haud defuere tamen nonnulli, quibus vis Acidi potentior, datis cum mistura pilulis ex Sap. Veneto copioso, cum pauco stimulo gum. ammon. & mas. pill. Ruffi, infringi debuerit. Dabantur quoque, quibus ventriculi non ita acor, sed potius frequens spasmus & debilitas, dolorem concomitari viderentur: his summe conditum hoc profuit: R. Cort. peruv. unc. iij. Camphor. Myrrh. a dr. js. Syr. Diacod. & Menth. a unc. iijs. M. ut sexies de die magnitudinis nucis muschatae frustulum fumerent. Aderant, quibus opii majorem longe dosim, ad noctem præcipue, dari oportuerit. Multi sane homines a Cardialgia penitus convaluerunt, modo, durante cura, exacte abstinere ab iis, quæ difficulter digeruntur, & a

Lacte, Caseo, Aceto, Vinis acidis; diætamque Alcalē-  
scentem observarent.

Hæc, inquam, dando, his proficiendo, tandem didici inveteratos ejusmodi Cardialgicos, eo quod Medicamenta sine curæ stabilitate per annos abligurierint, incurabiles fere, scirrhoque ventriculi, aut partium pone illum sitarum, laborantes haberi; curam tamen & integram, & perseverantem has scirrhi suspiciones plane abigere. Concludere hinc debui, plures dari, quibus immodicus ventriculi acor fere indomabilis adesset, quibus debilitas ventriculi foret insuperabilis, quosque a flatibus, a spasms, a convulsionibus primarum viarum liberare, ferme impossibile videretur; licet nunc antacida, nunc paregorica, alio tempore purgantia, alio iterum roborantia, & carminantia dicta, ipsis sæpius exhiberentur; eo quod optima hæc remedia nec sufficiente copia, nec tempore haud interrupto, nec multa horum sociata, nec longo post synptomatum silentium tempore sumerentur.

§. III. Quamvis hæc ita se habeant, ultro tamen fatendum est, Ventriculi, Oesophagi, Pylori, partiumque hisce vicinarum scirrhum, morbum frequentem esse, quem palliamus potius, quam curamus; nisi initio advocati, & signa ejus certiora contemplati, quam quidem in casibus §. II. lenissimis solventibus, & præprimis copiosissimo, eodemque pertinaci mellis usu, nascentem hanc Diathesim dissolvamus. Hinc juvat mente præsentia hæc signa gerere, quæ Ars observanda detexit.

Sunt 1. causæ prægressæ, ut v. g. ventriculi Inflammatio, nec benigna resolutione, nec critica eva-cuatione soluta. 2. Mali diuturnitas. 3. Pertinacia ejusdem ad selecta remedia. 4. Vomitus frequens sub actu digestionis. 5. Loci pondus. 6. Dolorum moderamen a fortiore ventriculi, abdominisque compressione. 7. Ventris externi tactus. 8. Vitia affecti visceris, quod, defectu secretionis, corporis œconomiam plus, minus, turbat.



Exacte locum determinare indurati tumoris, sive ipso in ventriculo hærentis, sive ejus, qui in vicinia natus ventriculum premit, facile nonnunquam datur, aliquando difficulter, sæpe vero neutiquam. Tot hinc in consultationibus litigia. Versati utcunque in Anatomicis Medici, qui semel, iterumque Pancreas scirrhum invenire; idem posthac perpetuo accusant: legerunt alii, videruntque ex ipso Mesenterio enatum tumorem, qui sursum vergens ventriculo in functionibus suis impedimento fuerit; nihil in posterum, nisi Mesenterium clamant. Sic iterum alii aliud. At vero ingenue fateamur certa signa rarissime dari, quæ ex innumeris causis veram determinent, quæ locum, quo tumor hæreat, quæ viscus, quod occupet, quæ modum impediendi, naturamque, examussum explicet. Cadavera passim nos erroneæ convincunt sententiæ. Exemplis videre juvat.

§. IV. Perillustis ac longe doctissimus, expertissimusque Vir, *G. Macneven o Kelly ab Agrim*, Fac. Med. Prag. Director sapientissimus, consummatus Pathologiæ ibidem Professor, verum nostræ Artis ornamentum, edidit 1760. Dissertationem de *Raro ventriculi casu*, in quo vomitus ingestorum vix mutatorum, in provento admodum morbo, impedimentum circa Pylorum hædere indicabat. Probabilis sane hæc dicta de causa sententia erat; haud tamen ita, ut una constaret utrum in ipsa Pylori substantia, an in circumjacentibus partibus, hæreret id, quidquid esset demum, obstaculi. Cadaveris autem sectione patuit scirrhum adesse, eumque ita totum ambitum occupare Pylori, ut transitus per illum vix setæ mediocri concederetur. Eo obstaculo effectum id, ut eam sensim in molem creverit ventriculus, quæ, facci instar, universum expleret abdomen, suoque fundo inter Rectum & Vesicam insinuans sese, simul causa tenesmi extitisset, frequentisque stranguriæ. Ingens adeo hic ventriculus, ut, referente Claro Autore, „ filum arcui majori circumductum, antequam evacuaretur, ulnam Bohemiam, „ cam,



„ cam, cum tribus quadrantibus, & duobus pollicibus  
 „ æquaret: minor arcus tres daret quadrantes, cum uno  
 „ pollice.

2. Apud *Riverium* observatio *A. Jodon*, *Antissiodorensis* Medici, habetur, hominis nempe, qui integro triennio cum tumidissimo ventre *sine vomitu* conflictatus, demum febre & anxietatibus emaciatus, periit. Ipsius *Jodon*, qui historiam narrat, Anatomen fecit. Hydatidis magna in medio pendebat Pyloro, hydatidibus tota scatebat universi ventriculi interior superficies: liquidum vero in hoc ventriculo contentum *nonaginta librarum* pondere fuit. Ventriculus medius dissectus, superabat ulnam *Parisiensem* (quæ media parte *Viennensi* longior) ambo ventriculi ora fere juncta erant. Hic autem homo cur non vomuerit? Quia ventriculus cum Peritonæo arcte connatus. Igitur hic videmus casum, in quo cum omnibus vomendi causis vomitus fuit impossibilis. *Blancard Cent.1. N.84.* vel ipsissimam historiam habuit, vel eam *Jodonis* inter suas retulit.

3. Et rarior ille casus, quem *Tom. 5. Cap.2. pag.26. Rat. Med.* dedi, in quo ventriculi pars prope Pylorum, ipseque Pylorus, Omenti parvi *Winslowi* crassa, duraque productione premebantur, ac præterea peculiari extrinsecus adnato tumore Pylorus compressus erat; ille, inquam, casus vomitum cetera inevitabilem, tamen impossibilem fuisse ostendit, præ ponderosissimo, rigidissimoque omento ventriculum immobilem figente.

4. Quid mirabilius, quam quod 10. Aprilis 1758 in publico auditorio circa hoc ipsum negotium demonstraverim! Ventriculus primo formabat lagenam, sinistrorsum productam,  $3\frac{1}{2}$  pollicum; deinde ex fundi sui latere dextro tubum emittebat, diametri sex linearum, qui pedetentim ad sesqui pollicis amplitudinem latefcens, longitudinemque  $4\frac{1}{2}$  pollicum æquans, demum Pylorum formabat, & in Duodenum abibat. Pinguis moles ventriculo

ad-

adnata, magnamque adepta duritiem, in causa fuerat, cur ventriculus hanc assumsisset figuram. Interim homo hic, cujus morbum Cap. 4. probl. 8. enarrabo, ante ultimum suum, ac brevem morbum nunquam vomuit. Cujus miri phænomeni si a me causa quæritur, aliam non novi, nisi quod Natura nonnunquam sese monstrosis accommodet. Et quidni? Antiquos scirrhus in cadaveribus reperimus, qui sui signa ita per annos dederint, ut homines subinde per plures septimanas, mensesve, a quovis dolore, ac vomitu liberi vixerint. Cur, quod per menses, id quoque non posset per annos, non posset per totam contingere vitam?

5. Aurifaber *Riverii* Cent. 1. N°. 90. ingentem Pancreatis ac Mesenterii scirrhum gessit, qui Pylorum, Jejunique principium, ita angustaret, ut omnis fere præcluderetur transitus, quique dolores crearet enormes. Hic homo a tribus saltem mensibus, antequam adesset ipsi *Riverius*, & aliquo adhuc postmodum tempore, neque sponte vomuit, neque dato Emetico vomere potuit, nisi eodem repetito; quamvis ventriculus materie esculenta & potulenta plenus a morte inveniretur. Cur non vomuerit, data historia non exponit: cum autem ex Natura morbi vomere debuerit, nec vomuerit tamen, videmus plures dari, qui cum omnibus vomendi causis neutiquam vomant.

§. V. Igitur ut in quibuscunque fere aliis morbis, ita quoque hic miras detegimus exceptiones. Cæterum, si nec ventriculus manifesto aliis de causis a vomitu impediat, nec forte ærumnis hisce assuescat sic, ut inde ad vomitum non proritetur, solent passim id genus hominum vomere, hocque mox, aut brevi post assumpta; quæ tunc fere immutata prodire cernas. Centena id demonstrant exempla. Novendecim anni sunt, quod publice ediderim Anatomen feminae, perpetuo vomentis immutata sæpe ingesta; qua constitit omentum geminos digitos crassum adhæsisse ventriculo, jecinori, intestinis, colo, jejunio, duodeno, omnesque has partes, in unam veluti fasciam, contraxisse.

Obiit



Obiit 19. Aprilis Anni præsentis Prænobilis sanitatis Consiliarius, ac præstantissimus Medicus, *Leopoldus Erndl*, qui sane noverat 15. annorum spatio immedicabilem sui ventriculi morbum, vomitusque frequentes, prudentia, & solertia sua ita palliare, & moderare, ut in 45. ætatis annum vitam suam inter labores practicos, Vir Deo & hominibus carus, produxerit. Invenimus porro ventriculum sic se habentem; primo instar inversæ lagenæ longitudine  $8\frac{1}{2}$ , pollicum, ad umbilicum fere usque descendebat, inde angulo factō affurgens, atque canalem quatuor pollices longum formans, ad Pylorum petebat.

Porro hujus miri phænomeni gemina patuit causa mechanica; quarum prima ventriculus in genere extendendus, altera in hanc præcipue formam mutandus fuerit. Scilicet Pancreas sensim indurefcens, auctaque tumescens mole, compresserat retroflexum a Pyloro Duodenum; quo effectum id, ut Duodenum contra vertebrae Dorsi pressum, Chymum ventriculo pulsum sæpe retardaverit, imo demoratum sit. Hæc igitur vera causa ventriculi universalis distensionis, utpote accipientis, nec nisi per lucida intervalla dimittentis. At vero immensum jecur æque in toto latere sinistro, quam in dextro, ultra umbilicum productum, sic formatum erat, ut sub lobo sinistro suo, utpote tenuiore, ventriculus in crassæ lagenæ ventrem abire potuerit; lobo autem dextro admodum crasso, idem ventriculus non potuerit in latus distendi; sed unice supra umbilicum, ubi aliquod spatium inter utriusque lobi pendentis crepidines nactus, angustus plane ille ut oblongum lagenæ collum, aliquantisper decurrebat, & angulo factō affurgebat, itidemque sub crassissimo lobo Hepatis dextro, angustiore tubo ad Pylorum pergebat. Ita ut evidens sic fiat, quod dixi, Duodeni compressione oportuisse, ut universus ventriculus sensim distenderetur; monstrosa jecinoris forma contigisse, ut in sua distensione ventriculus in hanc figuram potissimum mutaretur.



§. VI. Expedit meditationem super hisce malis ultra producere. Viscera cava, Tumores cystici, Aneurysmata, uno in corpore reperiuntur eo tenuiora, quo expansiora; in alio vero quo ampliora, eo crassiora. An lenta extensione, crassitudinem; cita, tunicorum extenuationem referant? id Anatome non ita admittit. In historia *Ill. Mac-neven*, ut sensim mole ventriculus, ita & crevit substantia. E contrario scirrhus ingens *Octaviani a Taxis*, Pylorum *sensim* angustando, in causa quidem fuerat, ut immensum ventriculus distenderetur, haud vero ut augetur crassitie, cum *Högstettero* solito tenuior inventus sit: & licet *Optimi Erndl* ventriculus non nisi lentissime distentus sit, incrassatas tamen tunicas non habuit. In cadavere, cujus Historiam Cap. 3. §. 2. dabo, cupido me invasit capacitatem mensurandi ventriculi, qui lenta & continuata per annos epulatione pedetentim in magnum faccum abiverat. Mensura male capta fuit; nam antequam Pylorum ligaremus, neglexeramus ventriculum a multa copia contentorum, qua utcunque turgebat, exonerare. Nihilominus quinque mensuras, sive viginti libras aquæ commode infudimus, plus infusuri, si ejusdem prope æsophagum tenuitas, qua illum digitis ad infundendam aquam dilatabamus, profunde dilacerata non fuisset. Ut eo loco, sic ubique membranarum ventriculi tenuitas deprehendebatur.

§. VII. Differentia igitur magna in ampliato ventriculo, lente quantumvis distento, observatur. In vesica fellea, & urinaria, pro distensione tenuitas crescere solet. Sed quid demum de utero est?

*Galenus* L. de uteri Anatome Cap. 8. pag. 280. apud *Charterium* in Tom. 4. „uterus in principio conceptus „ crassus, cum prope tempus pariendi accedit, magnus „ quidem, sed tenuis: crassitudo enim in longitudinem „ extensa absumitur „. Eodemque *Charterii* Tomo pag. 653. *Galenus* idem repetit Lib. 14. Lib. de usu part. Cap. 14. Cum subsequantium sæculorum Autores, &  
Ara-

Arabum schola, non nisi in *Galen*i verba jurarent, nec facilis daretur occasio examinis gravidæ uteri, mirari non oportet, quod in postrema usque hæc tempora apud omnes passim Medicos, imo etiam celebres Anatomicos, v. g. *Vesalium*, receptissima sententia hæc fuerit. *Du Laurent*, *Riolanus*, *Bartholinus*, *Plazzonius*, *Harvæus*, alique. Sic demum magna hæc quæstio devolvebatur ad *Moricæum*, qui antequam sua ederet, jam magnam vitæ partem circa uterum, & in utero triverat. Audacter ille *Galen*i sententiam tuitus est, & putavit meridiana luce se eam clariorem demonstrasse. Putat *Moricæus*, plures ideo supposuisse non extenuari gravidos uteros, quod viderint crassiores eosdem manere, qua parte placentam habeant, statuerintque ut ibidem, ita se habere ubique; porro id falsum esse, & uterum cæterum pro ratione extensionis tenuiorem fieri. *La Motte*, *Trew*, *Moebius*, pluresque alii, uterum saltem non minui a naturali in non imprægnatis crassitie; *Sylvius*, *Heyster*, *Palfinus*, alique uterum scribunt crassiorem naturali reddi.

Incomparabilis *Albinus* hic præprimis laudandus, qui nobis naturali forma dederit uteri gravidæ figuras egregias, varioque aspectu contemplandas, in quibus uterum cernimus, minime pro ratione extensionis extenuatum. Egregius, & vere Doctissimus *Noordwyk*, in sua uteri gravidæ Anatome in 4to edita 1743. idem in utero, forte 5. menses gravido demonstravit. Tandem testis autoptes rem pulcra occasione contemplatus sum *Hagæ Batavorum* 26. Maji 1751. Gallica femina septem mensibus gravida, infantis ad finem usque experta motum, phthisi pulmonali moribunda jam, Rev. P. Carmelitæ *Cyrilli* cura omnis eo tendebat, ut mox ab ejus morte tentaretur, an civis Reipublicæ, an Ecclesiæ membrum subita sectione servari forte posset. Hinc rogabar, ut proximis in ædibus cum Chirurgo, eo fine præsentem me sisterem. Unde quo momento moriebatur, intrantes examinabamus, num vere mortua esset? maritumque & feminas adstantes rogaba-



mus, num vere mortuam eam crederent? annuentibus cunctis, opus aggressi sumus. Uterum dextro in latere incidentes, vitaturi placentam, in eandem pervenimus tamen. Hinc frustra copiosum sanguinem vi ex vasis linearum duarum lumine vidimus profilientem. Opposito igitur in latere mox secantes digiti ubique crassitudinem uteri offendimus. Crassior antea certe fuit, cum ab ipso primo sectionis inceptæ momento rivatim effluens cruor aliquem crassitudinis collapsum effecerit oporteat. Membranis pertusis vi aqua profiliit, infansque facie prona coxygem Matris versus educebatur. An id elidit communem sententiam infantis se capite deorsum circa ultima graviditatis tempora duntaxat vertentis? Mortuus jam erat infans. Placentam prudenter ab uteri parte dextra separaturus, hic facile, ibi eam non nisi aut ejusdem, aut uteri læsione, solvere potui. In magna plaga facillime separata Placenta, sinus vidi plures, lacunasve, utero contiguas, cruore plenas, sed uteri in eadem plaga deterfa superficies nihil mihi aperti, nihil ostendit sinuosi. An uteri ibidem Sectio primum facta, mutavit quidquam? Lineas quasdam albescentes, fibras referentes, vario modo per uteri fundum dispersas vidi; quæ an ipsissimæ illæ sint, quæ *Ru-ischio* ideam muscularis ibidem fabricæ dederint, ignoro. Sed nihil difficilius fuit separatione Chorii ab utero: quantumque enim prudentia id separare contendebam, erat cellulositatis & vasorum tantum robur, ut vel uterum lædere, vel membranæ Chorii lacinias deberem relinquere. Amnii a Chorio separatio facillima sine ulla læsione. An si peperisset hæc femina, membrana Chorii non mansisset utero affixa? & forsitan Placentæ pars? Confirmabit hanc veritatem Historia uteri, sanie pessima distentissimi, & in sua substantia pollicem crassi, quam Cap. II. §. III. dabo.

Atque hæc de utero dicta sufficiant, ut convicti simus non nisi similibus experimentorum raritate contigisse, ut uteri gravidæ extenuationem falso plurimi statuerint; &



& ab altera parte, ut inventam ejusdem 2. 3. 4. pollicum in fundo crassitudinem ad præternaturalia forte relegamus.

Solent etiam Tubæ fallopianæ, Ovaria, Hydatides, Cystici in superficie corporis tumores, eo crassiores habere tunicam, quo plus extenduntur. Sic habui Tubam fallopianam hac hyeme septem librarum; his diebus aliam, quam ob dissectionis distinctioris causam dilacerare ubique debui, adeoque ponderare non potui, sed plures certe libras habuisssem. *Cyprianus* saccum hydropicum, ex tuba formatum, & 150. libras aquæ continentem, invenit librarum 30. pondere. Politi & æquabiles raro hi sacci sunt, passim aut alterutra, aut utraque superficie inæquales, tuberosi.

§. VIII. Unde demum patet scirrhus, aliosque tumores Mesenterii, Pancreatis, Pylori, Omenti parvi, ac magni Renis, (quem sex circiter libras pendentem præterito anno publice demonstravi), varios Ventriculi morbos, ingestorumque vix mutatorum vomitum generare posse, nec tamen signa pathognomonica adesse, quæ clare arguant, quænam potissimum pars hic peccet, adeoque sæpe nos ignorare utrum protopathicus sit, an deuteropathicus Ventriculi morbus.

Equidem Ventriculum circa Pylorum comprimi ex ingestorum fere immutatorum vomitu concludunt Practici, dum vident cætera viscera inculpate se habere; sed falluntur, dum nonnunquam vitium totum in externis Abdominis partibus modo hæreat, cujus en exempla!

In Tom. 1. Act. Chir. Paris. *Garengeot* descripsit nobis Herniam sub cartilagine ensiformi, a secedentibus binis rectis Abdominis musculis, illudque in spatium prolapsa parva Ventriculi plaga. Aliam Herniæ Ventriculi speciem habet, dum pars ejus prolabitur ab utroque latere ejusdem Cartilaginis, in illo triangulari spatio, quod inter illam, & marginem Vaginæ musculorum rectorum intercurrit; quo in loco Vasa ad muscolum pectoralem, aliasque pectoris externas partes transeunt. Causam esse

eam credit, quod solius Obliqui externi musculi, (non vero ut alibi, Obliqui interni, Transversique), Aponeurosis, hanc formet Vaginam. Post *Camerarii* & *Renealmi* auctoritatem, laudat etiam Collegas suos, *Petit*, *Andouillé*, & *Arnaud*, ut qui similia observassent. Historia adjecta evincit innumeros fere Medicos in Europa & America, annorum spatio, deceptos fuisse, dum pertinacis morbi causam ad varios affectos locos; & propter ingestorum vix mutatorum ejectionem, Alvumque incredibili temporis spatio pertinaciter semper clausam; ad Pylorum, vel saltem ad proxime adjacentes partes, referrent: interea dum attentum examen loci demonstraverit veram Ventriculi Herniam in causa esse, quam idonea compressio & ligatura vel curare, vel saltem, ut non noceat, palliare potuerit. Ut proinde in causarum vomitus immutatorum ingestorum recensione, etiam opus sit ad hanc miram attendere causam.

At nihilominus iudicio hic opus. Quotidie videmus, & prostant adhuc exempla in nosocomio, internas Pectoris suppurationes viam sibi in variis Pectoris plagis quærere, & iisdem omnino locis, quos dixi, formare tumorem. Adeoque non omnis ibidem tumor Hernia Ventriculi est: quam tamen ut talem suspicari quis posset, licet vix vomitus adesset, quandoquidem etiam inguinalis & femoralis Hernia per annos aliquando sine vomitu adsint. Egregius *Foubert* eodem *Chir. Paris.* Tomo primo, ejusmodi causam describit, quem nonnulli Practici Herniam Ventriculi esse crediderant, quem tamen ex præsentia Phthisis pulmonalis, pressique undulatione tumoris, purulentum pulmonis tuberculum esse asseveravit. Lubenter ut tale aperuisset, nisi oppositæ Medentium sententiæ, & conclamatus fere ægri status, eum cohibuissent. Inspectione porro Cadaveris intellexit salutarem forte futuram fuisse aperturam viæ, quam pus ex concreto ibidem pulmone sibi quæsiverat.

Sed & hanc aperturam periculum habere suum, Tom. 5. Cap. 6. a pag. 93. & seq. demonstravi, ubi omnia



omnia signa puris ex pulmone eo pergentis aderant, & Aneurysma tamen sub pure latitare deprehensum est.

Tandem ingestorum vomitus inseparabilis causa inventa fuit ab omnibus hucusque recensitis prorsum aliena. Duo exempla notabilia habet *La Motte de Re Obstetr.* Lib. 4. Cap. 17. Obs. 375. alterum Matris suæ, alterum gravidæ feminæ. His intropressa ensiformis cartilago ventriculorum in continuos egit vomitus. Feminis his, thorace in genua reflexo, cartilaginem digitis suis extrorsum duxit, hincque irritatione perpetua Ventriculi ablata, curavit Vomitus. Addit casum frequentiore esse, seque plures cujuscumque ætatis, & sexus ab indomabili cæterum vomitu sic curavisse.

## CAPUT II.

## De Vario Hydrope ac Tumore abdominis.

§. I. Tuba Fallopiana sinistra pendens Libr. 7. continens 32. Libr. liquidi. Disquisitio super puris generatione in hac femina. Etiam in Virgine uterinum systema inflammari, ac suppurari potest. §. II. Possibilitas demonstratur conceptus & incrementi fœtus in Tuba Fallop. §. III. Exemplum notabile extensarum, ac materia repletarum ambarum tubarum, uteri, ac superioris Vaginæ partis, una cum vulgo dicta Imperforatione, sive Atresia. Digressio occasione Atresie, ejusque varie species, ac curandi modi. Incurabilitas. Aliud mirum Atresie exemplum, cum addita cura. §. IV. Tumores Ventris notabiles ab Hepatis, vel Lienis, vel utriusque, sanissimi, mole duntaxat aucta, juncto illi, aut non juncto, Hydrope. De Incertitudine Diagnoseos in cunctis enarratis casibus. §. V. Novum genus tumoris cystici, quem Parisiorum methodo tractare natura ipsa indicabat; quemque incurabilem fuisse Anatome docuit. Novoque exemplo confirmatur id, quod ad §. I. de puris generatione dictum.



**Q**Uamvis in omnibus fere hujus operis Tomis de vario Hydrope ac tumore Abdominis egi, abruptam tamen retexere telam cogor novarum observationum multitudine, quæ antedicta partim corrigant, partim augeant, confirmentque.

1. Femina 30. annorum innupta, bonæ famæ, rusticola, elapso abhinc quadriennio quartana laboraverat, quam debellare petitis undique, ut ruri potissimum fit, ad id remediis, quocunque modo sategerat, ac debellaverat tandem. Febrè libera, menstruis caruit, tumoremque mox in sinistro hypochondrio animadvertit, sensim crescentem, eique demum universi Abdominis junctum Asciten.

In *Nosocomio Pasmanniano*, ab optimo ibidem Physico D. Collin suscepta, & deobstruentibus atque diureticis ex Arte tractata, a Mense Augusto 1760. multum lucrabatur. Sed anno hoc 1761. ineunte, anxietate victa Paracentesin subiit, eaque aquosi quidem nihil, liquidi autem gelatinosi Libras 24. Medicas emisit. Detumescente inde ventre eo manifestior, palpabiliorque tumor descriptus percipiebatur. Malorum cumulo pectore tanta subito copia puris erupit, ut suffocaretur, & repleta pure tota trachæa inventa sit. Tumorem hunc una cum Utero, Vagina, Recto, excisum, D<sup>us</sup> Collin ad me, publicæ demonstrationis ergo, perhumaniter misit.

Primo totum ponderavimus. Libras Medicas 31. æquabat. Deinde omnibus vero in situ positis; evidenter constitit Tubam Fallopianam sinistram esse, quæ tumorem formabat, adesse ceterum Ovarium, quod naturalem haud multum excederet magnitudinem. Porro ex hac tuba extraximus liquoris purulenti albi 18. libras. Tubæ substantia, seu membrana tumoris hic duas, tres illic, lineas crassa, erat intus a pure erosa, ac lacera, extus vero vasis quam plurimis dives; quæ tamen minoris diametri erant, quam quidem ea aliis occasionibus videram.

At tumori huic sic aperto alius reperiebatur inclusus, membranæ suæ crassitie ut prior, continens liquidi fusci, tenuioris ac turbidi, Libr. 4. Si unica libra addatur, quæ inter examen effluens, capta erat, si dematur pondus uteri & intestini recti, ac vesicæ, Tubæ degeneris pondus septem librarum fuit, & liquidorum Libr. 23.

Ut febres intermittentes sæpe salutares sunt, ita non raro vel per se, vel male curatæ, perniciem inferunt, obstructione pertinaci, & catameniorum defectu. Tuba vitiosa ostendit, quemadmodum ubicunque locorum degenerascere inde corporis partes variæ potuissent, ita nunc se potissimum pati. Undenam vero dum nihil inflammationis in tota anamnesi habetur, dum corpus videtur a diathesi phlogistica prorsus alienum, undenam, inquam, tamen pus in sacco Tubæ? undenam pus in pulmone, tam copiosum, ut ruptis repagulis suis totum spatium aëreum pulmonis inundaverit, suffocaritque feminam? Sane eâ nostrorum naturâ humorum est, ut citra topicas inflammationes, citra phlogisticas febres, diathesin inflammatoriam contrahant, eamque conservent perpetuo. Tomo 2. Cap. 2. hanc veritatem, nisi me animus fallit, demonstravi, & novis exemplis reliquorum annorum decursu evidenter confirmavi. Imo ex ipsis intermittentibus pus posse generari, *libro de Febris Cap. ultimo*, invictis probavi exemplis. Phlogistice igitur noster cruor degeneret, aut naturalibus viis se eliminat, ut v. g. pulmone, rene, intestino; aut novâ sibi via factâ effluit, ut naribus, auribus, pudendis; aut format sibi receptacula novâ; aut denique vias varias adit. In hac femina, & novum sibi receptaculum fecit, & obruit pulmonem. Et ne quis ob Tubæ hujus degenerationem, feminæ hujus virginitatem suspectam habeat, monere debeo etiam totum genitale systema mulieris æque sedem degenerascentis humoris fieri posse ( licet eâ innupta, castaque sit ) quam aliâ quamcunque partem. Analogia utique id docet; plura Sanctionialium exempla probant, & tertia ordine enarranda historia invictæ id demonstrabit.



II. *Cyprianus* ita *Tubam* descripsit, quæ libras 30. pendebat, & aquæ libras 150. continebat. Dum igitur quis hanc, & præcedentem historiam contemplatur, evidenter intelliget, quâ fieri potuerit, ut maturi foetus, aut inventi aliquoties in *Tubis* fuerint, aut vivente matre, sive integri, sive frustulatim, per aperturam umbilici, abdominisve, a natura factam, vel indicatam saltem, educti fuerint. Ipse *Abraham Cyprianus* olim *Leovardie*, pluribus & Medicis & Chirurgis præsentibus, eduxit foetum maturum post 21. menses a conceptu elapsos, ex umbilico: huic quippe connata ingens illa *Tuba*, ibidemque inflammata ac suppurata, iter omnino liberum ad foetum, ope placentæ adhuc cum *Tuba* sua nexum, concesserat.

III. *Tuba* ut alterutra, ita utraque potest affici. Longam, sed per omnia notabilem, historiam hic dabo; quæ quamvis plura continet, quam ad præsentem nostrum scopum faciunt, ad praxin tamen summopere omnia spectant, integra omnino enarranda est.

Virgo 24. annorum ab octo retro annis quodvis auxiliorum genus, ad menses provocandos, frustra experta, totum suum Hypogastrium tumidum, durumque habebat; quam duritiem durissima, sed æquabilis Zona ad umbilicum, per universam Abdominis amplitudinem terminabat. Octo annis miseriarum elapsis, demum ab obstetrice *Atresia* laborareprehenditur: examine a præstantissimis Medico & Chirurgo repetito id confirmatur.

Unde hi 25. Jan. 1761. operationem instituere. At vero Imperforatio sola hic non aderat, verum etiam tanta partium, situ, figura, structura, immutatio, ut impossibile plane fuerit operationem debitam perficere. Hymenis quippe lata facta sectione, stylo prius, deinde digito, amplum in cavum penetrantes, concludere debuerunt in vaginam penetrasse se se; conclusionem confirmari merito crediderunt profluentis ilico nigerrimi sanguinis, ex facta apertura, copia. Ita nempe solet res in bona operatione



se habere. Sed certe ne sic quidem perforatam ullatenus virginem fuisse se eventus docuit. Languens a longo tempore virgo triduo post obiit. Optimi illi viri veniam secandi cadaveris sollicitaverunt, eamque adepti, me ad sectionem perhumaniter invitaverunt. Rem igitur sic invenimus. Uteri stupenda moles, monstrosæque utrinque Tubæ, tumorem una formabant, qui totum hypogastrium explens, superiore sui parte illam Zonam constituebat, quæ in vita deprehensa fuerat, totum veluti ventrem intus cingere. Multa copia nigræ turbidæ fætentis aquæ deprehendebatur cavum in ventrem effusa, sed examine constitit ex parvis hinc inde tubarum putridarum aperturis eam profluere. Ruptura sane hæc videtur mortis causa fuisse. Ovaria vix solitam figuram excedebant.

Ordine sic ad contemplandam vaginam ducebamur. Patuit Hymenis sectionem sufficienter amplam factam esse, ita quidem ut si vagina alias se secundum naturam habuisset, hæc eadem sectio Hymenem, adeoque vaginam, egregie aperuisset. Quoad modum sectionis Hymenis; *Celsus* eam binis se invicem decussantibus incisuris fieri oportere scribit; cui adstipulatur *Benivenius*: *Job van Meckeren* unica cæsura, sed obliqua, ut ne lædatur urethra: *Wierus* facta parva apertura ope novaculæ superius, ne urethram lædat, obtusæ, inducit instrumentum obtusum, digitumve, & prudenter tunc hinc & inde ad latera perfcindit membranam. Alias idem *Wierus* speculum incurvum immisit, ejus dens superior urethram, ne læderetur, tegebat. *Aquapendens* unica, eaque recte sectione operationem perfecit. *Aquapendentem* optimi viri hi secuti, recta, eaque unica sectione, membranam aperuerunt. Monui antea omnes partes præter naturam se hinc habuisse. Igitur sectio eorum, in qua peragenda urethram evitare studuerunt, nunc inveniebatur per urethram in ipsam penetrasse vesicam; hinc illum omnem nigricantem cruorem facta sectione proflientem, non nisi ex læsis profluisse vasis concludebant: adeoque quantumvis evitare urethram

flu-

studuissent, videbant se ob præternaturalem mox exponendam partium structuram, id præcise, quod evitare conati erant, effecisse, adeoque concludebant tutius se imposteorum non *Aquapendentem*, sed alios, qui obliquam incisuram commendassent, secuturos; cum præternaturalis conditio partium nequeat prævideri.

Igitur Hymene perfecto, ne vestigium quidem Vaginæ adfuit, sed solidum corpus totam vaginam explens, pollicis diametrum, in amplitudine, sesqui pollicem in altitudine habens, eoque modo cum vagina unitum, ut proprie loquendo, ipsa vagina videretur undique incrassata fuisse, & ita in medio vaginæ centro, coagmentata, ut non nisi unicum solidum, sine concretionis vestigio, repræsentaret. Porro supra hoc Carnosum solidum corpus, cavæ vaginæ erat portio, eaque adeo amplissima, ut caput infantis capere posset, plena sanie fusco-nigra; Tubæ immensæ utrinque molis eadem materia distentæ, licet hinc inde per foraminula multum ejusdem in cavum ventrem, quemadmodum supra jam narraveram, profudissent. Uterus pollicem in substantia crassus, ingenti, amplissimoque suo cavo eandem nigram saniem continuit.

Igitur virgo, de cujus virginitate illibata nulla nunquam quæstio erit, potest vaginæ, uteri, tubarum amborum degenerationem tantam pati, quantam unquam gravidæ aut puerperæ; quod supra promiseram demonstrandum.

Singulare certe Atresix exemplum est, cui simile me legisse, aut audivisse, non memini. Id tamen ex historia Medica concludi oportet, quod varius omnino sit in hoc vitio naturæ lusus. Primo describitur Atresia cum Hymene integro, eoque vel clauso omnino, vel, (ut *Wolff* apud *Schenckium*, ut *Wierus*, ut Celeberrimus *Albinus* Exert. Acad. Lib. 4. Cap. 10.) rotundo foramine perforato; quod vel parvum omnino erat, vel quemadmodum *Fallopianus* viderat, digitum, aut ut *Albinus* in adulta femina detexerat, penem virilem admittebat.

Im-



Imperforationis, membrana integra, aut leviter modo perforata, natæ, videtur meminisse *Hippocrates* Lib. de Sterilibus apud *Charter*. Tom. 7. pag. 851. Libro de natur. Mul. Cap. 68. Lib. de morb. mulierum Cap. 22. pag. 743. ut & *Celsus* Lib. 7. Cap. 28.

2. Imperforatio detecta a *Ruyschio* est Obs. 22. primo ab Hymene, qui perforatus, dein ab alia altiore membrana imperforata. Parturienti huic feminae debuit discindere utramque. Etenim per Hymenis foramen imprægnata erat, via inde ad uterum tunc temporis libera; post imprægnationem vero videntur laxissima vaginæ latera mutuo se excoriasse affrictu, mutuis coivisse parietibus.

3. *Celsus*, *Aquapendens*, *Ruysch*, a vero vaginæ coalitu solo Atresiam observarunt.

4. Hymenem non connatum, sed vitiose generatum, *J. N. Pechlinius* in Observ. phys. med. observavit, ab urina nempe acri, vulvam excoriantem puellæ; ita ut a coalitu primo laterum in uno puncto, eorundemque iterum inde recessu, vera formaretur membrana.

5. Vidit idem *Autor* Nymphas & carunculas circa futuros menses ita crescere, ut vulvam, eo, inquit, modo clauderent, quo cor valvulæ tricuspidales; veroque glutine ita coirent, ut femina vi quadam hoc veluti sepimentum digitis remove, quo sanguis effluere posset, debuerit.

6. Atresia cæterum in vaginæ substantia ex tumoribus natis, viamque proinde plus minus angustantibus; eadem orta a vaginæ tumore, qui ad 2. 6. imo ad 12. libras extra vulvam pendebat; imperforationis denique species ea, quæ ab uteri, vaginæque prolapsu, quem tempus induravit, adeoque ineptum reductioni reddidit; abunde describitur, & exemplis confirmatur a *Zacuto Lusitano*, *Ruyschio*, *Boneto* &c.

7. Singularitatem habet casus observatus *Simoni Schultzio* apud *Manget*. Bibl. Chir. Tom. 4. Hymen quip-

quippe ante urethram erat; ita ut urina parvo tantum foraminulo membranæ stillaret foras, pessimis cum symptomatibus. Percindendo omnia curabantur.

Similem, sed rariorem casum haud ita pridem in Nosocomio nostro habuimus. Juvencula 20. annorum, mensibus carens, ab anni retro spatio gravibus ventris doloribus corripiebatur. Cepti hi dolores supra umbilicum, per latera se se, indeque ad pudenda diffundebant, tenesmos recti, vesicæque, excitantes. Pressis manu in hoc dolore inguinibus, urina promovebatur in paroxysmo, alvus vero sequente modo die demum sequebatur. Finito paroxysmo dolore toto eo die vacua ac sana fuit. Rediit similis exacerbatio die altera, rediit tertia, atque ita integro mense.

Advocabatur tunc optimus loci Physicus Exp. D. *Josephus Schreyer*. Is a principio ad finem usque prudentis ac sapientis Medici partes explevit examussim omnes. Morbi symptomata mitigavit, dies nonnullos doloris expertes conciliavit, consilio cum Chirurgis inito Atresiam detexit, ejusque perforationem consilio Medicorum vicinorum, quod convocari petebat, voluit proponere. Parentes autem maluerunt *Viennam* adducere filiam, ac Medici sui epistolam afferentes me consuluerunt.

Aug. 19. proxime elapso, puellam examinans, Atresiam vidi. Hymen fuit fere ad labia vulvæ producta, antèrius altius, ut quid superesset adhuc de vagina inter Hymenem & labia; posterius vero ad vaginæ finem erat sic, ut cum labiorum, ac fossæ navicularis confunderetur substantia. A parte anteriore ultra lineæ, a vagina, distantiam, parvum foramen erat, quo inductus stylus primo difficulter adscendebat; prudenter autem postmodum agitatus, in vesicam urinariam libere penetrabat. Utrinque ad latus foraminis levior eminentia erat, circa medium Hymenem sensim evanescens. An, quod nullæ Nymphæ repertæ, hæc vestigia Nympharum?



Turgebat porro concava superficie hymen, intropressusque pondus incumbentis designabat materiæ. An materies hæc sanguis menstruus collectus? Videbatur sic: nam cum foramen in hymene nullum, nisi quod in urethram continuaretur, sanguis menstruus nullam elabendi viam habuit.

Prognosis dubiam dedi. Brevem sponendi, felicemque curam, si hymenis præsentia unicus puellæ defectus esset: difficilem, si vagina, si uterus, si tubæ, si ovaria, notabiliter essent affecta, ut quidem prægressa symptomata forsitan innuebant: impossibilem, si casus similis illi, quem supra enarravi, existeret.

Circa sectionis modum cum Chirurgo nostro D. *Leber* conveni, haud esse nobis sectione recta *Aquapendentem* sequendum, sed obliqua *Jobeum van Meckeren*, urethræ vitandæ studio. Statim per aperturam prodire sanguinis nigri ac tenacissimi sic, ut vix flueret, unc. xxx. Forceps dein latera incidens cruciatam fecit sectionem *Celsi*, ut ne denuo latera coirent: magnaue *Turunda* primum melle rosaceo, deinde digestivo illinita, suppurationem membranæ promovit. Cum urinæ exitus hinc impediretur, debuit prima & altera die toties educi, quoties urina urset, postea vero libere secundum *Turundam* effluxit. Emulsio paregorica illico ab operatione dabatur.

Brevi post operationem vix tumebat venter, sed quærelæ die illo, alteroque, fiebant molesti ardoris ad vaginam, tertio die etiam ad Hypogastrium. Quarto autem die venter totus usque ad summum Epigastrium tendebatur magno cum dolore, frequenti vomitu, & intolerabili plane febre. Ter vena secta, enemata emollientia & oleosa continuo injecta, cataplasmata admota ventri, decocta emollientia, ac leviter subacida, paregorica, haustus oleosi multi, demum effecere, ut 7. die ab operatione, 4. die a nato ventris dolore, Febris illa continua mitesceret, & prodiret urina flava cum multo crasso, gravi, subpurulento, sedimento.

Verum inde non est judicata. Continuae febris successit continua remittens, cum gravi exacerbatione matutina, cum gravissima pomeridiana: & quidem die tertio adeo vehementi, atque diuturna, tantoque cum vomitu, ut, ne hoc in paroxysmo moreretur, metueremus. Unde finito hoc paroxysmo, mox dedi misturam cum unc. s. extr. cort. peruv. assumendam antequam sequens exacerbatio expectaretur, interea dum reliqua omnia interna continuabantur, externaque anxilia. Sic prosequendo vidimus, hanc quoque febrem, hosque vomitus, 7. dierum spatio terminari.

Durante hac febre, urinae semper pauciores quidem, at flavae eadem, & constanter omnes gravi materie alba, puriformi, saturae. Febre absente urinae paulo copiosiores, simili autem materie perpetuo refertae.

Alvus toto febrium tempore cruda enematibus prodit; post corticis usum coctior, febre devicta sanorum instar, nisi quod a cortice fere nigra.

Toto morbi tempore injectio aquae hordei cum melle rosaceo ter die in vaginam facta, eduxit primo tenacis sanguinis reliquias, deinde saepius quid purulenti.

Quod ad ventris descriptum dolorem, ac tensionem attinet, id memorabile videtur, quod primo die a febre cessante in toto epigastrio dolor ac tensio cessaret, ex eoque tempore vomitus quoque siluerit; interea dum per universum quidem hypogastrium, maxime vero circa ilium sinistrum, summa, eaque dolentissima tensio observaretur; quod tertio die & hoc ilium sinistrum mollescere inceperit, dieque sexto nihil ultra aut dolentis, aut tensi exhiberet; quod etiam deinceps medium hypogastrium & ileum mollius, indolentiusque sit, & dum hac scribo, jam ileum dextrum totum concidat.

An spes est materiem morbi continuatis ejusmodi urinis posse solvi? saltem hucusque omnis urina hanc materiem constanter gerit.



Interim difficultatem explicandi summam hic casus habet. Fuit olim tumor imo quidem in ventre animadversus, verum quia nil tumidi, ac tensi primo post operationem tempore deprehenderimus, verosimiliter idem tumor a vagina, copioso sanguine immensum turgida, & uterum atque vesicam sursum trudente, oriundus fuisse videtur; unde etiam evacuata vagina, hypogastrium totum concidere debuit. Id si ita se habet, cur tertio ab operatione die ardor, quarto tensio ac dolor totius abdominis, cum vehementissima febre? Si liceat per analogiam quid proferre, in sectione calculi vidimus anno 1760. triste exemplum ejus, quod ut periculosissimum Lithotomi adeo formidant, scilicet ventrem ab operatione summe tensum, dolentissimumque, cum febre violenta. Nunquid ergo vulnera nervosarum, adeoque sensibilium admodum partium, ut vesicæ, hymenis &c. inexplicabili modo inflamment universum, aut externum saltem, abdomen?

Condonabitur, opinor, mihi hæc circa Atresiam digressio, quam explicatio, de variis abdominis tumoribus danda, necessariam utique & inevitabilem reddebat: abruptum retexam filum.

IV. Vir nobilissimus, bellicis induratus laboribus, procerus, hilaris, facetus, anno vitæ suæ 38. gravi contumelia afficitur, tacito animo concoquenda. Unde in summam, sed sine materie, ut loqui Ars amat, Melancholiam, dilabitur. Quindecim exinde elapsis mensibus, fortuna rider, honosque ad contumelias prægressas delendas aptissimus, succedit. Sed, o tristes mortalium calamitates! radices adeo altas egerat prior animi affectus, ut corporea organa, viscera, nervos, humores, inficiens, morbum nunc ex spiritali materiale produxisset, verumque generasset Ascitem. Nihil ars hic præstitit. Carolinis thermis semel in anno, octennii spatio, æger usus, Hydropis quidem experitur imminutionem, at vero durtiem primo sinistro, deinde etiam in dextro abdominis latere, sensim crescentem, animadvertit.

Varietas sententiarum circa naturam morbi ingens fuit; eoque major, quo Abdominis Latex uno tempore copiosior, confusorem redderet affectarum contactum partium; alio iterum tempore parcior, contactum præberet liberiores. Lien sæpe accusabatur, & his quidem infarctus, aliis vero scirrhusus. Tempus fuit, quo tumor duplex, alter loco lienis, alter lapideus fere, ventriculo adhærere quibusdam visus fuerit. Omentum postea accusarunt, Mesenterium dein, tandem tympaniticum Coli tumorem. Biennio ante mortem Ill. *Præses*, egoque, sententiam rogati, respondimus nec quænam potissimum partes, nec quonam illæ demum modo, affectæ essent, determinare certo nos posse. Contigit autem semianno ante mortem, ut illum primum præsens viderim, examinaverimque; contigit idem aliquoties postmodum; hydrops nonnunquam minor, suspicionem mihi Lienis augere potuit, sed firmam sententiam pronunciare, frequens cadaverum, toties illusionem Medicorum manifestantium, recordatio prorsum vetabat.

Extra urbem morienti non adfui, nec corporis aperturæ; sed jecur & splenem corpore exemptum ad me miserunt. Insolitæ magnitudinis ac soliditatis ambo hæc viscera, ponderavi; ac jecinoris pondus novem libras cum  $\frac{1}{4}$ . splenis autem 6. cum dimidia libras æquare deprehendi, solidum utrumque, sed ne minime quidem scirrhusum. Ergo & qui solum Lienem accusaverant, & qui solum hepar, tum etiam qui scirrhum pronuntiaverant, erraverant. Nescio, quæ fiat ut in corporibus, quæ ceterum emacientur, & tabescant, viscera nonnulla, ac præsertim jecur ac splen, in monstrosam molem, eamque cetera sanam, abeant? 21. Dec. 1758. publice exhibui splenem eadem, qua hepar, magnitudine,  $4\frac{1}{2}$ . libras æquantem, substantiæ plane bonæ ac sanæ; dum interim corpus a subito profligata intermittente febre obstructum, & asci-



asciticum, penitus contabuisset. Et 2. Jan. 1759. demonstravi in corpore maxime cachectico, & vertebrarum omnium, thoracis, ac lumborum, ossis sacri, pluriumque costarum, pessima carie demum peremto, Hepar adeo magnum, Lienem ita ingentem, ut nec legerim, nec viderim unquam, hæc bina monstrosiora; doleamque exactum horum pondus in Diariis meis desiderari; ambo hæc viscera ad pelvim usque extendebantur. Cap. 1. §. 5. enorme hepar, non morbosum omnino, in cachectico corpore quoque mirati sumus. Dum viventibus has partes tangimus, vix, quid tangamus pro certo affirmare possumus; Tumores enim Mesenterio enati, Renes monstrosi, Sacci degenerascentium viscerum variorum, ipse Ventriculus, licet vomitu nonnunquam sui affectionem prodiderit; vel in alterutro, vel in utroque abdominis latere, simile quid, quod tale Hepar, aut Lien, tactu exhibent. Cum autem, quo plura inciderimus cadavera, eo plures causas detegimus, quæ licet a se mutuo diversissimæ, tamen eundem, aut similem contactum explorantibus exhibent, ideo discamus sententiam propriam dubitanter proferre, saltem eam contra alia opinantes non acriter defendere. Si cadaver post mortem incidatur, demonstrabit forte, quorumcumque erroneas sententias esse, & causam mali aut nunquam adhuc observatam, aut saltem ab iis Medentium in dato casu alienam, dabit. Et si casu quis rem acu tetigerit, & inde velit magnus videri Apollo, facile in proximo futuro casu suam incitiam, & vanitatem, aperto cadavere demonstratam videbit. Ut clarius inde convincamur, perpendamus sequentem historiam.

§. V. Dec. 4. anni 1760. puerum decennem suscepimus, cujus en vitæ historiam! Primo vitæ Biennio sane vixisse dixere parentes, facie tamen inflatum perpetuo. Bienni ipsi post clamores nocturnos, crus fuisse veluti contractum, quod frictionibus mater emendasset; idem denuo octeni contigisse, iterumque frictione emen-

datum. Variolis inter 2. & 3. vitæ annum laborasse, & integris sex mensibus exinde pectore anxium fuisse, at tamen & medicamentis ad id datis reconvaluisse. Sanum utcunque præter ea, quæ nunc enarrata, infantiam, & pueritiam, hucusque transegisse, at comatosum tamen perpetuo, idque potissimum singulo autumno; frigidum quippe semper, mox ubi hypocausti ignis cubiculum calefaceret, vix ab eo removendum fuisse, atque hinc magis somnolentam hyeme vitam egisse, buccisque utrinque pendulis hyeme adhuc plus apparuisse.

Præprimis autem hic notamus ab Autumno 1759. & comatosum, & crure sinistro affectum, eum intelleximus, tumorem in sinistro hypogastrio comparuisse, quem Mater diligenti attentione de die in diem profecuta, supra pubem & inguen sinistrum primo, deinde ad cristam Ilei surgentem, sensimque ad costas, spinamque Lumborum adscendentem observasse se aiebat, & spinam dorsii ipsam tunc notabiliter fuisse incurvatam. Tumorem ipsi examinantes, non in hypogastrio, sed supra cristam Ilii, inter costas spurias, spinam, & hanc cristam, locatum deprehendimus, eumque durum totum, excepta plaga ejusdem superiore, & ad spinam proximiorē, quæ manifestam fluctuationem exhibuit. Pectore tussim, & ronchum audivimus.

Circa naturam tumoris dubii fluctuantes, indicationes manifestas ilico sequebamur; expectorationem oxymelle squillitico promovendo, & tumorem cataplasmate ultra emolliendo. Emendata hinc respiratio est, & tumor sui aperturam, vel brevi sponte futuram, vel arte faciendam, indicabat.

Die 18. Dec. aperuimus, eduximusque plusquam 4. lib. crassi, flavi, nec foetentis puris. Specillum ad medium abdomen pene intravit. Ex illo tempore aperturam sæpius dilatavimus, ut commodè pus exstillare posset: fane exstillavit illud ad mortem usque fere perpetuo, tussis ope multo copiosior. Bis die injectio aquæ hord.  
cum



cum melle rosaceo facta est, toto morbi tempore; stylus postremis temporibus, & injectio ipsa, vix cavum ultra dari indicabant. Toto hoc tempore bono nutrimento, frictionibus, remediis primo attenuantibus, postmodum solventibus, tandem roborantibus, flaccidum corpus emendare conatus, æthiopem lavi. Imo a 15. Feb. 1761. crus sinistrum fungoso tumore ad malleolum primo internum, deinde ad externum affectum est; instar veræ spinæ ventosæ malum, dum tumor externe aperiretur, nuda jam ossa ostendebat.

Aprili finiente cum magna dorfi apertura, magna-que boni puris effluentis copia, febricitare cepit, & spina lumborum, dorisque dolere. Febris exin continua fuit, sæpe cum vespertinis, sæpe cum vagis exacerbationibus, cum dolore spinæ fere perpetuo; quam accubitus puris ad illam, natæque inde rosioni, tribuebamus. A medio Majo febris intensior, diarrhœa argillacea, ut sæpe in suppuratis observamus, dysenteria nonnunquam cruenta, & a 22. Maji fungosi tumores ad articulum cubiti sinistri, ad dorsum dextri pedis. Tandem 7. Junii, finis miseriarum, mors.

Ingens Ventriculus, bonum Abdomen, nisi quod hinc inde, idque potissimum in pelvi, pauxillum flocculenti puris inveniretur, præterque illud tres propemodum Lymphæ libræ. Stylus ulceri inductus moderabatur sectionem præcipuam. Hac lege deteximus saccum quendam, formatum a postica parte Quadrato lumborum, & Psoa magno; antè Psoa parvo, a majore multum remoto, albido, mucoso, & Peritonæo; a latere interno, corpore quodam calloso, quod spinæ lateri accretum, quodque Psoam parvum multum a majore removebat; a latere tandem externo, Transverso Abdominis.

Porro tria hic summe notanda erant. 1. Saccus nunc descriptus, qui descendebat super Iliacum internum, secundum magni Psoæ latus, ejusque tendinem, angusto ductu, eodemque calloso, donec cæco fine terminaretur

Inter tuber ischii, & trochanterem majorem. 2. Apertura, quam natura indicaverat, quamque 18. Dec. anni proxime elapsi feceramus, eo proprie loco fuit, quo Transversus Abdominis incepit haud ultra a Quadrato Lumborum regi, eadem circiter cum suprema vertebra lumborum altitudine. 3. In magno sacco prius descripto fistula lateralis erat, quæ stylum nostrum ducebat ad infimam dorſi vertebra, eamque scabram & erosam, deinde ascendendo secundum vertebra, usque ad quintam vertebra thoracis. Callositas vestiebat utrinque spinam, vertebra enumeratae omnes & corporibus suis, & processibus, erosae, consumtae, ichore ac pure undique sordentes.

Considerando igitur 1. puero huic, dudum antequam in Nosocomio susciperetur, spinam dorſi tam extrorsum, quam leviter introrsum, idque loco affecto potissimum, incurvatam fuisse: 2. Tumorem primum non in summo femore, ubi sacci finis erat, sed supra inguen finistrum adverti incepisse. 3. Cæcum omnino & callosum fuisse finem in femore sacci: 4. In sacco Abdominis præter Psoæ parvi flaccitiem nihil degenerascentis repertum fuisse: 5. Adfuisse lateralem sacci fistulam, quæ cum erosis undique vertebra communicaret: hæc, inquam, omnia considerando, in eam facile sententiam imus, quod ad hujus cachectici, & cacoehymici Pueri, spinam dorſi, morbi origo hæserit; quod morbus inde inchoans, sibi viam inter musculos & peritonæum rodendo paraverit; quod copia ac pondere materiae saccus deorsum elongatus fuerit; quod in fistulam oblongam ultra ossis pubis marginem abiverit; sed quod materia minorem resistantiam supra os pubis, quam infra inveniens, in tumorem primo in inguine collecta fuerit, deinde sensim altiora petiverit.

Sed undenam primo quatuor Librae puris, purisque continuus semianni spatio fluxus? Pus sane paucum intus delituit, nec in pulmone, aut reliquo corpore ulla vomica fuit. Ex observationibus toties iteratis patuit ad purulentas excretiones annosas solam sanguinis phlogistici dia-

the-



thesin requiri, quæ continuo se inde liberet: adeoque sanguinem facile a spinæ carie phlogisticam reddi potuisse, & hanc eandem phlogisticam materiem circa spinam deposuisse, sensimque copia ac pondere suo faccum descriptum formasse.

Conclusio hujus capitis est, quod inter innumeros Abdominis tumores & hydropes, in variis hujus operis Tomis recensitos, ne bini quidem sibi similes reperiuntur; quodque id omnino certum videatur, quo plura cadavera postliminio inciderimus, eo nos plures inter se dissimiles inventuros casus, quorum dissimilitudines in vita non potueramus deprehendere. Adeoque repeto quod pag. 33. monui. Conclusio denique est, complures semper fuisse casus, itidemque semper futuros, qui Parisinorum curam (ut Tom. 4. Cap. 3. exposita fuit) nunquam admittant; esse quoque ejusmodi, in quibus hæc ipsa methodus a natura per continuum puris effluvium indicata, unice palliet, neutiquam curet, quemadmodum historia pueri, ultimo enarrata, evincit.

### C A P U T III.

#### De Hydrope Pectoris.

§. I. *Hydrops Abdominis & Pectoris a nimio hæmorrhoidum fluore: Habitus ventris tympaniam mentiens. Pulmões toti degenerascentes & corrupti, itidemque universa pleura, & tamen nullus ullibi eorum coalitus. Anatome ut per omnia notabilis erat, ita notabilior ob defectum sanguinis in toto corpore.* §. II. *Hydrops pectoris per 14. dies præcipuo suo symptomate, signoque carens, sine nota causa. Anatome exhibet ingentem vitalium partium degenerationem, quæ non expectabatur; nulla calculose diathesios signa in systemate arinoso, bilioso, pneumonico, quam suspicati haud immerito*

*fueraimus. Respondetur ad quaestionem, cur homo hic praecipuo morbi sui signo aliquando caruerit? §. III. Phthisis pulmonalis abscondens notabilem Pectoris Hydropem. Hydrops hic, etsi cognitus debito tempore fuisset, Paracentesi non potuisset sanari. Singularis locus, in quo collecta aqua. Confirmatur ex his omnibus proposita Tomo V. hujus morbi difficilis cognitio, difficillima curatio. Qui nocturnas anxietates in lecto evitaturi, in sedili se collocant, hos non semper easdem evitare, haud infrequens observatio docet.*

**T**omo hujus Operis V. multus fui in hoc morbo describendo, ejusque tum rariore cognitione, tum difficiliore, ne dicam, impossibili curatione, enarrandis; quæ recens observata idem argumentum confirment, nunc tradam.

Die 8. Jan. 1761. homo 30. ann. consilii causa in Nosocomium venit; triennium elapsum esse ajens, cum melancholia ex oppilatis Abdominis visceribus laborans, Hæmorrhoidas sibi provocasset: ex eoque tempore easdem large fluentes quovis mense habuisse: nunc vero a 5. Septimanarum spatio tumidas se quidem illas, at plane siccas, habere. Quatuordecim diebus, ab ultimo fluxu hæmorrhoidali elapsis, tussim sibi natam esse, eamque siccam, & molestam, vires inde minui, jamque ab octiduo & ventrem sibi, & crura tumere. Debilis totus homo apparuit, anhelus, macer, fusco-pallidus.

Homo hic, optimi Medici optimo consilio, fluorem hæmorrhoidalem ante triennium sibi adplicitis provocavit hirudinibus. Verum & optima consilia sua incommoda habent. Toties clari viri id notarunt, quod aperta vasa hæmorrhoidalia sæpe non sufficienter postmodum claudantur, hincque nimio fluore hydropem, ac mortem producant. A Galeno in hæc usque tempora id Medicos luxisse, Tractatu de hæmorrhoidibus evici. Hinc infidum aliquando auxilium est. Pœnas certe inde homo noster luit. Cachexia dudum affuerat, Tussis accessit 14. die ab  
ulti-



ultimo fluore, hydropem Pectoris referens; manifestusque apparuit Hydrops Abdominis & Crurum, quo tempore prima vice deficiebat hic fluxus. Hinc evidentissimum fit, Tussim ac Hydropem non a suppressis, sed a nimis hæmorrhoidibus sumsisse originem.

Datis remediis, potissimum diureticis, hydrops minuebatur, sed sonus Tympaniticorum similis in ventre successit, tumorisque inæqualitas, referens Tympaniam: Diuretica, Purgantia, & Roborantia, aliquo tempore admota, mensis spatio omnem sustulere Hydropem. Sed nullam spem inde concepimus, cum vires decrescerent. 23. Feb. mortuus est.

Nihil tympanitici in abdomine inventum est: sed, quod nos deceperat, & tympanitidem erat mentitum, omentum fuit, quod in inæqualia, oblongaque tubera degenerascens, ac peritonæo horum opæ cohærens, ventrem more tympanitico inæqualem repræsentaverat: imminuto quippe plurimum hydrope, non poterat peritonæum sufficienter se ad intestina adplicare, præ tuberebus crassis densis omenti secum connati. Hinc intestina in vacua hæc spatia intrare, aëre sæpe distendi oportuit, adeoque percussum abdomen sonum edere, licet neutiquam in formam tympaniticam perpetuo extensa essent. Jucundum interim videre erat, quam mire decepti essemus. Omentum enim totum ab inferiore parte intestinorum remotum, atque in se revolutum, ab angulo coli sub hepate, usque ad flexuram ejusdem sub liene, in duram, crassam, ac cartilagineam substantiam, digitum pluribus in locis densam, degeneraverat, ubique cum peritonæo connatum. Hinc anatomie difficilis erat, præcipue cum intestina tenuia, omento non tecta, cum peritonæo levibus vinculis hinc inde cohærerent. Igitur degenerascens omentum, inæqualitate ventris; intestina, dum flatibus distenta loca inter tubera omenti vacua occuparent, sonitum tympaniticum in percussione abdominis dabant.

Cæterum, peritonæum totum, omnia intestina, integrum mesenterium, universa pleura, superficiem, substantiamque suam totam, granulofam habuere; granulis albis, multum eminentibus, durisque iisdem, & quam proxime sibi invicem adpositis. Hepar, Lien, Renes boni. Renibus pinguetudo nulla. Vix libræ tres lymphæ in toto ventre. Flavedo hujus lymphæ intensa; num a vehementer transsudante vesicula fellea? Bilis cystica profunde flava. Levis utroque pectoris in cavo hydrops, a libra dimidia in singulis aquæ fusco-rubra. Cor in substantia pallidum, in cavis utrisque multo grumoso cruore plenum: ad principia vasorum majorum paucus sanguis; sed mox inde complanata aorta, vena cava, vasa iliaca: percissaque eadem in longitudine, vix guttam sanguinis dabant. Nec putat quis vulneratis aliis id contigisse vasis; nam a principio ad finem usque, Cl. collega *Gasser*, totumque auditorium medicum, siccissimam anatomen mecum mirabantur. Pulmones toti quanti duris erant tuberculis, ad sensum cartilagineis, pleni; transcissi autem, pus undique inter illa tubercula fuderunt. Quod autem mirum maxime, nullibi cum pleura accreti fuere.

Simulata tympanitide deceptos nos fuisse, supra ostendi: verum an nos quoque non decepit pectoris personatus hydrops? utique a tanta universi pulmonis degeneratione tussis, anxietas respirationis, anhelitusque, verosimilius causa deducitur, quam ab unica libra liquidi in utroque pectoris inventi cavo. Nisi statuere maluerimus, sicut diureticis, & hydragogis aquam ventris, ita quoque eam pectoris evacuatam fuisse.

An granulosa tam substantia, quam superficies membranarum, ad vitæ finem generata est a Phlogistico illo, quod toties invenimus transsudasse, & alias, quadam ceu membrana, viscera; pleuram, ac peritonæum texisse?

Cur sanissimi pulmones, ut toties vidimus, brevique novis confirmabo exemplis, tam sæpe ita accreti Pleuræ, Diaphragmati, Mediastino, Pericardio, ut nullo in puncto-



Et liberi sint; & in hoc homine, in quo corruptissimi erant, ubicumque liberi reperti sunt? Causam non bene capio: Hydropem pectoris forte olim copiosiore, id non impedivisse, firmus teneo; primo quia concretionem hanc, majorem, minorem, in Hydrope pectoris passim invenimus; secundo quia ab aquis versus pectoris inferiora locatis, ut in Hydrope pectoris assolet, superna Pulmonum pars versus jugulum a concretione cum Pleura prohiberi non potest.

§. II. Vir idem, cujus capacissimum Ventriculum pag. 16. descripsi, dat nobis mirabilia observanda. Quippe tribus ille de causis a me aperiebatur. Primo quod calculo laborasset, plurimosque labentibus annis calculos urethra reddidisset; jamque ab anni retro spatio ita immunis a calculi vixisset ærumnis, ac si eodem laborasset nunquam. Secundo quod certo creditus pectore hydropicus, signis hujus morbi primariis, quæ nocte potissimum adfuerant, sub vitæ finem noctibus caruisset. Quod tertio suspicio orta esset, an non Hydrops pectoris, eo quod cessantibus calculi excretionibus & cruciatibus, natus esset, calculosis forte in pulmone concretionibus deberetur? Quod ad calculum attinet, id Cap. VII. dabo; impræsentiarum modo illa, quæ quæstionem de Hydrope pectoris elucidant, enarrabo.

Annorum hic ultra quadraginta, cum diem fungeretur, multis ab annis calculo laboraverat, calculos plures urethra excreverat, donec demum remedio quopiam sumpto se calculorum exemptum cruciatu gauderet: ex quo autem hac a calculo immunitate fruebatur, pectore angere cepit, cruribus intumescere, ac tussi molesta, leviorque cruoris sputo vexari. Crevere hæc symptomata ita, ut post elapsos 3. menses nequiverit, nisi in dextrum latus decumbere; anxietates a primo inito somno experiretur; cruribusque interea ac femoribus vehementer tumesceret; ventre interim multis retro ab annis semper a natura, haud vero a colluvie aquarum, tumidulo. Co-

piofum Oxymel squilliticum cum multis aliis diureticis, Kermes minerale, Gummi ferulacea, interposita Hydrogaga, motus, frictiones, nihil profuere.

Sed insolitum quid contigit ultimis 14. vitæ diebus. Consuetas suas noctes calamitosas ne experiebatur quidem ultra, sed tranquillissimo somno, sex, septem, horarum spatio, lætus fruebatur, ita ut primarium illud Hydropis pectoris signum prorsum evanesceret. Quod autem mirabile erat, si ad beatum hunc statum continuandum solito diutius decumberet, en sensim, quæ nocturnæ olim fuerant, nunc anxietates fiebant diurnæ; imo eundem sæpius in sedili positum invadebant. Crurum autem tumoris, ac universi corporis debilitatis, insigne fuit incrementum, & post 14. optimas noctes demum 12. Maji, cum levi ac vago delirio, obiit.

Sequenti die Cadaver aperuimus, egregius Medicus Aulicus Nobilis *ab Hentschel*, Chirurgus *Leber*, egoque. Purpureum corpus ac lividum, spatio horarum 36. a morte elapso, ad Humeros, Jugulum, Thoracisque tum superiora, tum latera. Venter longe quam in vita tumidior. Costarum cartilagine totæ, infimarum exceptis, ossæ. In dextro Thoracis latere octo libræ foetidæ, subrubescensque aquæ, in sinistro vix uncia paucæ. Cordis bovinæ magnitudinis dexter Ventriculus parietum tenuitate hic vix lineam, ibi sesqui lineam, crassus, cavitate magnus; sinister autem pollicis crassitie, exiguum valde cavum habuit. Aorta, Carotides, Subclaviæ substantia crassissimæ, amplissimæ diametro. Polyposi quid utroque in cordis cavo. Lividi, flaccidi pulmones, quocumque in loco transcinderentur. Hepar lobo sinistro parvum, dextro monstrosum fere, longum ita, ut cum peritonæo circa cristam Ilei connatum esset. Flava ac multa bilis, nulli calculi biliosi. Ventriculus ingens, ut pag. 16. Cap. 1. enarravi. Ren dexter quadruplo majus naturalis, mollis, flaccidus, cætera bonus, sine calculo. ejusdem bonus ureter. Extenuatus ita Ren sinister, ut  
nec



nec longitudine, nec crassitie, digitum excederet, alias nec purulentus, nec calculosus. Naturalis omnino & sine Calculo Vesica urinaria. Peritonæum pulvinaris instar tumens, lumbos totos in pelvim usque explēbat; corruptamque cellulositatem esse, quæ tantum utrimque pulvinar componebat. Corrupti ac fere consumpti Ploæ.

Anatome igitur constitit 1. indicationem Hydropis pectoris rite captam esse. 2. Nullas calcareas concretiones in pulmonibus esse inventas, ut quidem suspicio ferebat. 3. Hominem hunc, qui summus olim Nephriticus numerosos calculos sæpius excrevisset, totam Diathesim demum superasse, nec habuisse partium degeneraciones, ut vocant, essentielles; cum Renis sinistri cætera sani parvitas, mole dextri compensaretur.

Verum cur placidas adeo noctes ultimis vitæ 14. diebus egit? Phænomenon hoc mihi vix explicabile. Respondeo duntaxat me *Tom. V. hujus Operis* evidenter demonstrasse ingentem Pectoris Hydropem, in quo nocturnæ anxietates quinque mensibus siluerint: tum & alium validissimum Hydropem Pectoris, cui anxietas illa nocturna affuerit nunquam: deinde mox daturum me Hydropem Pectoris a morte inventum, una cum Phtisi Pulmonum, eorundemque pessima degeneraciónē, quo in homine Hæmoptoe, cum sputis purulentis, ac febris hectica, veram Phthiseos pulmonalis ideam exhiberent, nullo vero modo eam Hydropis Pectoris. Hinc quamvis Phænomeni dati causam non intelligo, merito tamen concludere videor id minime mirum nobis oportere videri, quod 14. diebus in vero Hydrope pectoris præcipuum signum deficiat; siquidem idem & longe diutius, & perpetuo defuisse, aperta cadavera demonstrent.

Quæ ultra circa calculosam hujus hominis diathesin, & cor, notata fuerint, hæc suis quæque locis dabo; enarrabo modo nunc, quam mox promisi, historiam.

Ineunte Junio proxime elapso cadaver aperuimus, Magn. D. Kessler, Expert. Guarin, egoque, hominis,  
apud

apud quem olim ter, quater, fueram in consilium vocatus, & ubi ex copioso Baccho Hæmoptoem, & sputa purulenta, copiosa, febrimque continuam remittentem, constanter animadvertentes, Phthisim pulmonalem adesse statuebamus; neutiquam vero, cujus nunquam signa videramus, Hydropem pectoris: nisi forte obscura quædam sub ultimis vitæ diebus adesse suspicari forsitan quis potuisset. En vero Anatomen! sex libras aquæ abdomen dabat,  $7\frac{1}{2}$ . libras dextrum Thoracis cavum, sinistram libram unam. Pulmonum cartilaginea substantia longe durior, & pluribus in locis fere ossea; ut portione clam mecum lata, publice demonstravi: Vesicularis autem eorum fabrica plurimis sebaceis corporibus plenissima. Substantia denique Pulmonum tota fere diffuens præ corruptione. Mucosi tumores tremuli, gelatinæ instar, membranis conclusi, magnitudine pugni virilis, supra utrumque Renem inventi. Ventriculus commode excipiebat libras 12. aquæ. In Vesica fellea tres polygonati calculi.

Sed modus considerandus est, quo hydrops pectoris hic formatus. Non proprie, ut affolet, in cavo pectoris hærebat aqua, verum Pulmo, inferiore sui parte, ad altitudinem trium digitorum supra locum, quo Diaphragma Thoraci connectitur, Pleuræ, Diaphragmati, Mediastino, intime connatus; superiore autem parte undequaque latitudine duorum digitorum cum Pleura unitus. Porro intra locum cohesionis superioris, & inferioris, Pleura nuda erat, &  $7\frac{1}{2}$ . libræ aquæ ad Pleuram nudam accumbentes, removerant Pulmones, eosque sursum, deorsum, atque ad mediastinum, compresferant, quo sibi spatium compararent. Eratque hoc spatium ad costarum arcus; ita ut Pulmo ad latera sterni, & spinæ dorsii arctissime cohæreret, in medio vero Thorace circa arcus costarum nihil Pulmonis esset.

Hinc iterum concludo, polymorphum hunc morbum, gravem posse, diuturnumque adesse, quamvis sui vix  
signa



signa edat. 2. Confirmari hinc quæ superiore anno super difficillima ejusdem diagnosi differuerim. 3. Ex loco, quem hic aquæ occupaverint, itidem confirmari, quæ hic aquæ accupaverint, itidem confirmari, quæ de morbi hujus per paracentesim curatione, ut theoretice potius, quam practice proposita, adnotaverim: Quippe loco solito instituta Paracentesis, Pulmonem accretum vulnerasset, nullas eduxisset aquas. Frequentia hujus accretionis, quæ tanta, ut tertiæ, saltem quartæ, mortalium parti contingere *Diemerbroeckio* visa sit, curam hanc, si instituere-tur, inutilem sæpe ostenderet.

Absoluturus hoc Caput, Lectoribus in memoriam revoco, quod *Tom. V. Cap. 3. Pag. 52. & seq.* post *Pisonem* notaveram; nempe pectore Hydropicos, cum subita corporis erectione, a nocturnis anxietatibus in primo somno invadentibus, se levare advertissent, voluisse easdem postmodum in sedili, erecto corpore dormiendo, prævenire, sed incassum: cum igitur etiam sic erectos dormientes anxietas invaderet, rationem hujus nocturnæ anxietatis nobis difficiliorem intellectu videri. Sane Historia penultima priores observationes confirmat, in eo adhuc notabilior, quod etiam de die in sedili dormientem anxietas caperet eadem. Non do equidem hanc observationem, ut universalem: dantur forte, quibus primum somnum in sedili transigisse profuerit; sed contraria *Pisonis*, meaque, sæpius confirmata observatio, casum saltem haud infrequentem esse demonstrat.

## CAPUT IV.

## Problemata, &amp; Difficultates.

§. I. Laus Pathologiæ, & frequens certitudo; sed simul ejusdem curta sæpenumero suppellex. Ratio est, quod Pathologia unico duntaxat modo vitam humanam utcumque intelligat, Adorandus vero vite Autor, & Fons, vitam humanam posset infinitis concedere, & conservare modis. Exempla, quæ id evincant. §. II. Historia curæ Aneurismatis spurii, quæ optime quidem feliciterque peracta, infelicissima tamen, ignotis de causis, fuit. Plenitudo vasorum cunctis conspicua signis, ad mortem usque; Vasorum tamen perfecta post mortem vacuitas. §. III. Anatome hominis, cui per annum ante mortem pulsus nunquam debilis, sed semper fortis, durusque, usque ad ultimam luctam mortis, in quo, nulla prægressa evacuatione, nullus sanguis fluidus, sed exile modo filum polyposum in omnibus, iisque dilatatissimis corporis vasibus, inventum est. Quædam horum similia, sed imperfectiora, ex Cl. Lieutaud. §. IV. Casus femine, quæ nunquam symptomata affecti cordis, majorumque vasorum passa, cor & vasa majora monstrosa ac vitiose magnitudinis, totum fere thoracem occupantis, habuisse deprehensa fuit. §. V. Anatome portentosi cordis, in cujus substantia officulum, & cujus valvulæ tricuspidales non modo initia Coronariarum neutiquam tegere potuerunt, verum etiam Cor digiti amplitudine apertum semper reliquerunt. §. VI. Vita, & Respiratio non multum incommoda, cum Pleuræ, Diaphragmatis, Mediastini, Pulmonum, Pericardii, Cordis, majorum Vasorum, firmissima inter sese concretio, sic, ut, nonnisi unicam, eandemque immobilem prorsus molem, præ se ferret. §. VII. Affecti ossis sterni, mortisque mirabilis historia, in qua nec sufficiens causa morbi in vita, nec vera causa mortis



*tis in cadavere, detecta est; & in qua febris hectica cum omnibus suis signis adfuit, excepto eo, quod & obesum, & torosum, ad ultimum usque vitæ halitum, corpus perseveraverit. §. VIII. Testis contusio generat horrenda in abdomine; itidem seminis abundantia & corruptio citra contusionem. Stupenda Anatome. Castratio proVectum eousque morborum non tantum non curat, sed mortem accelerat calamitosam. Quædam in hanc rem ex Hildano, aliisque. Consilium præcavendi. §. IX. Tumor in Tibia ex contusione natus, 30. annis inculpate gestatus, tandem malignus factus, curatur enucleando. Recrescens irritamenta patitur, generatque Emprostotonon, & Maxillæ Tetanon. Ablato tumore, hæc symptomata perseverant, occidunt. Doctrina magni Hippocratis circa Tetanos. Calor urens in Ardente febre vix auctis Thermometri gradibus. Tetanus musculorum & tendinum, diu a morte superstes. §. X. Anatome intricatissima, in qua omnia intestina tenuia, & crassa, a sua externa tunica separata inveniebantur, & ex eadem, tanquam ex vagina, aut theca, evaginabantur illæsa. Demonstratio hinc confirmata 1. quod intestinam suam tunicam extimam a Mesenterio, ac Mesocolo, mutuentur. 2. quod ligamenta coli a tunica externa potissimum oriantur. Determinatur justa Intestinarum longitudo. Difficultates circa veram hujus morbi naturam. §. XI. Hernia intestinalis, vaginalis, & causa Ileï morbi vehemens, longis ab annis in corpore præsentis, sine ullis suis signis, aut symptomatibus, Anatome.*

**P**athologia nititur quatuor potissimum fundamentis, quorum primum quidem Anatome est, quæ omnium humani corporis partium figuram, molem, situm, variumque cum aliis nexum, & harmoniam, docet. Alterum est Physiologia, una cum Mechanice, Hydraulice, ceterisque adscitis Physiologiæ Disciplinis. Hæc partium per Anatomicum cognitarum destinationem, usumque, exponit, indeque humanarum functionum & actionum exercitium explanat. Tertium ejus fundamentum merito habet

betur experientia medica, eaque eo quidem tempore potissimum capta, quo illæ ipsæ functiones, earumque instrumenta, aut otiantur, aut læduntur, aut destruuntur. Quartum denique tum omnium in genere Cadaverum inspectio est, tum præcipue eorum, quorum morbi, dum viverent, attente considerat fuerant, diligenterque adnotati.

His innixa Pathologia, sæpius morbos multos a principio ad finem ita explicat, ut nulla certior, evidentiorque Demonstratio haberi in Physicis queat. Constatque inde Pathologicum bonum esse neminem, qui non simul bonus Anatomicus, qui non accuratus existat Physiologus. Ut enim linea recta ad curvæ nos adducit in cognitionem, ita fani, vegetique hominis, intellecta Natura, functionumque integritas, nos in intellectum ducit causarum, quæ earundem functionum læsionem, perversionem, destructionem, soleant producere.

Verum enim vero occurrunt nobis sæpenumero morbi, quorum Phænomena laudatis hisce ac necessariis principiis haud modo non explicantur, sed iisdem plane adversantur. Ecqua tandem hujus causa portenti? Paucis dicam. Eorum, quæ ad hominem pertinent, multa novimus, omnia non novimus; & quod res est, vitæ, ut ita dicam, ignoramus latitudinem. Perennat siquidem illa quandoque, idque notabiliore tempore, interea dum otia-ri videantur, imo dum destructa, aut inepta saltem, ea organa, illa vitæ appareant instrumenta, quæ quidem ex veris Artis principiis ad vitam, vitæque functiones, absolute necessaria statueramus. Velimus, nolimus, hic, hic inquam, curtam nostri ingenii supellectilem fateamur oportet: incipimusque sub his Velamentis Illum detegere, quem Fontem Vitæ Sacra vocitent, qui dum secundum nostra Anatomica, Physiologica, Mechanica, Hydrostatica, Hydraulica, Hygraulica principia, vitam conservat Mortalibus, Naturæ se monstrat Autorem; dum vero reclamantibus hisce legibus eandem perpetuat, Omnipotentem sese, infinitarumque, ut ita dicam, Naturarum Creatorem esse, & ut paucis omnia  
com-



comprehendam, libera Voluntate cuncta se agere, ostendit.

Quum plura observata mea propria argumentum horum, quæ dixi, subministrant, præcipua collegi, & ordine enarrabo.

## P R O B L E M A P R I M U M.

**F**Emina 65. ann. optima sanitate semper gravida, corripitur media nocte 22. Martii 1761. anxia respiratione ac leviori hæmoptoë. Vocatur extemplo, Vénam qui fecet, Balneator. Is porro, instrumento suo resiliante, arteriam tundit, ingentique saltu profilientem cruorem comprimere satagens, nonnisi tertio repetito adparatu compescit. Adstantes Chirurgum exonerant, retrotractum ab ægra brachium causati.

Vulnus, ad 12. diem non amoto apparatu, vidimus 18. die ab eodem inflicto, deteximusque ingentem in humero, ac brachio a compressione tumorem. Pulsus in carpo fortis, & calor, vel arteriam haud valide compressam esse indicabant, vel nunc per laterales arterias ex Humeraria ortas, jamque dilatatas, sanguinem in laterales arterias, quæ ex brachiali arteria ante, postque ejusdem bifurcationem egrediuntur, nunc retrogrado motu inferri in arteriam brachialem, aut radiaam, atque circuitum humorum in manu hoc modo resuscitari.

Sphacelus humeri præ foribus adstans, citam operationem poposcit. Perfecit eam *D. Leber* Assistentibus *D. Chirurgis Homburg, Fischer, & Reichberger*. Methodum comprimentem intercipienti prætulimus, ob rationes Tom. 4. Cap. 2. §. 10. laudatas. Apposita machina tortili supra arteriam humerariam, Operator sondam cavam induxit in vulnus cutis, atque cava omnia esse detexit. Integumenta supra sondam cavam transcidit ad digiti lon-

gitudinem, eduxitque sanguinis grumosi, nec dum fœtētis, libram dimidiam, & prudenti digito quasvis hujus massæ reliquias abstulit: tunc sondam prudenter deorsum in vulnus duxit, ut prius, ita & nunc, caute evitans vulnus arteriæ, arteriamque ipsam; ac congrumatum ibidem sanguinem, cute ad pollicem latum percissa, eduxit.

His factis relaxavit paulisper comprimens Instrumentum, quo rite contueremur Arteriæ vulnus. Horruimus profecto videntes idem quatuor lineas longam, ita ut accusatio retracti sub venæ sectione brachii confirmari videretur. Portio aponeureticæ expansionis Bicipitis Brachii suo erat loco. Arteria Vulnerata Humeraria fuit ante suam in Radiæam & Ulnarem divisionem. Quodque Tom. 4. Cap. 2. de corpore rotundo immobili, ad Vulnus Arteriæ notavi, idem hic quoque invenimus, formatum a vagina cellulosa arteriam, venam, nervosque, hic loci involvente. Hæc valida nimirum compressione a Chirurgo facta cum ipsa Arteria ubique conglutinetur, coalescitque, eo excepto loco, quo vulnus est. Vis enim sanguinis hanc cellulositatem a se repellit, suoque in illam impulsu tumidam, atque rotundam efficit.

Adverteramus porro loco citato, in aliorum, nostrisque casibus, Aneurysmata spuria integre curari sola compressione externa, quando Vagina hæc sic cum Arteria coit, ut sanguis per vulnus arteriæ in saccum hunc se penetrans, nequeat amplius latera sacci, cum arteria coalita, ab eadem remove: curari vero minime, si compressione nec sufficienter, nec tam feliciter facta, impetus cruoris, in saccum insilientis, latera sacci hinc inde ab arteria removeat, seque hinc furtim per totam diffundat brachii, humerique cellulositatem. Atque præsens casus cum sic se haberet, non poterat compressione sola, sed operatione quadam instituta, curari. Porro cum hoc sacco arcte unita Aponeurosis erat, vi compressionis.

Edo-



Edocti igitur Aneurismata egregie curari relictis his cunctis concretis portionibus, eluimus primo brachii ac humeri vulnus, vulneri Aponeuroseos pulverem fungi Agarici inspersimus, totique sacco: dein Agarici rite compressi laminas ordine septem, sensim grandiores, imposuimus, & compressam, ut vocant, desuper; tandem idonea ligatura totum firmavimus adparatum. Brachio, humero, manui, fomentum vini, aqua calida diluti, adpositum est.

Conquesta licet ægra dolorem, bene tamen toto eo die habuit se, & usa Emulso cum Diacodio, ac Nitro, bene dormivit. Die sequenti bene habuit, ad Vesperas autem febris magna orta est, cum anhelitu, stupiditate, desipientia levi, pulsuque celeri, forti, duro. Unde ad octavam vespertinam unc. vj. sanguinis sano de brachio eduximus, & misturam Aquæ Hyssopi, oxym. squill. ac stib. diaph. dedimus. Refrigeratus sanguis rubram insulam bene consistentem, crustamque inflamm. densam, hinc albescentem, inde leviter rubentem, formabat. Impetuosius vena exsilierat. Interim Brachium aneurysmaticum naturaliter calebat, infraque ligaturam pulsabat, circum ligaturam autem anxie circumspicientes, omnia sicca læti deprehendebamus. Ita ut hucusque nullam, hac saltem de causa, inquietudinem animo foveremus. Hora vero undecima adparatus leviter madere, tingique, observabatur. Ilico tamen hæmorrhagiam hanc incipientem, constrictior Machina, tortilis compressit. Ægra interea somnolenta fiebat, & ad mediam horam primam pulsus, etiam sub ligatura, fortior deprehensus est. Ad primam nocturnam expiravit, horis 41. ab operatione elapsis.

Ad 8. matutinam brachium examinantes, deprehendimus vix 5. aut 6. uncias sanguinis hæmorrhagia illa exivisse: id enim exacte nos inspectis lintheaminibus determinare didicisse Tom. 4. Cap. 6. evici. Ergo non pe-

riit hæmorrhagia; 1. quod post cohibitam eandem, inventus sit fortior pulsus. 2. Quod modica admodum copia effluxerit. 3. Quod sanguis, dum paulo ante de Vena educeretur, valido jactu profilierit.

Neque a Gangræna, compressionem validiorem haud raro sequente, extincta est. Pulsus namque sub eadem semper manifestus ad mortem usque fuit, & manus egregie semper caluit, imo ipse anatomicus conspectus quamvis gangrænæ suspicionem amovit.

Examinantes deinde operationis apparatus, invenimus illum egregie adhærere, infimamque agarici lamellam adeo vulnere esse infixam, ut scalpello inde amovenda fuerit. Figuram vulneris eidem pulcre impressam, *Clar. Professor Gasser*, qui ipse eam a vulnere vi amoverat, nobis omnibus demonstrabat. Sanguis sub agarico in sacco congrumatus & consolidatus fere totus. Quamobrem merito conclusisse videmur levem illam Hæmorrhagiam ex laterali vase, alicubi in integumentis non compresso fatis, ortam fuisse.

Horum recensione crediderim, quosvis æquos rerum æstimatores concludere 1. Operationem egregie institutam fuisse. 2. Mortem neque ab Hæmorrhagia, neque a Gangræna, contigisse. Quænam igitur causa Mortis? Prosequamur reliquam Anatomiam.

Viscerum bona conditio. Sed vasa universi corporis, majora, minora, ita & flaccida, & vacua invenimus, ut sicciorem Anatomen nemo viderit. Sanguis unice inventus est fluidissimus in basi cranii ad unc. ij. copiam effusus, ita ut ibidem videatur vasculum fractum fuisse.

Repetamus igitur Historiam totam. Quinque ante mortem horis pulsus, celer, fortis, durus, proinde phlogisticus, fuit. Sanguis de vena tusa vere inflammatus prodiit, saltu exsiliens, vi reprimendus, dum vena clauderetur. Exigua admodum Hæmorrhagia fuit. Post venæ sectionem & hæmorrhagiam, dimidia ante mortem  
ho-



hora, fortior deprehensus pulsus est tam in affecto, quam sano brachio. Interim sanguis nullus in arteriis, venisque fuit, ne ejusdem quidem illa minima columna, quam a minima arteriæ contractione manere oportere vulgo credimus. Vacuitas perfecta æque in venis, quam in arteriis.

Itaque mortis causam proximam video a compressione, quam ab effuso intra cranium sanguine Medulla oblongata, Nervorumque origines passi sint; vitam tamen ex sanguis corporis, cum signis ad mortem usque plenitudinis vasorum, cum non capio, lubenter aliis, me in arte versatioribus, exponendam relinquo.

### §. III. PROBLEMA ALTERUM.

**A**Rthriticus homo, de quo Tom. 5. Cap. 5. pag. 86. & seq. & in *Differtat. de Irritab. & sensib.* egi, in omnibus suis calamitatibus, durum, fortemque pulsus nunquam non habuit; ut toties mecum per longum ejus morbum Medicinæ Studiosi observarunt mirabundi. Constanter hic pulsus adfuit, nisi morte jam adstante præ foribus. Cum mortuum illum 2. Octobr. 1759. aperiremus, invenimus Aortam universam, Arterias Emulgentes, Iliacas, Femorales, amplas quidem, sed flaccidas, suo in cavo ad crura usque, gerentes nihil, quam filum, sive chordam tenuem, albam, polyposam, quæ crassitudine inæqualis, in maxima sua diametro vix sesqui lineam haberet, pluribus in locis lineam vix excederet, dum interea vas columnam digito crassiorē sine ulla extensione continere potuisset. Cor itidem crassum, pallidum, vacuum, habens tantummodo dextra in auricula, sinuque quid polyposi, & in sinu sinistro pauculum grumosi cruoris, in subclaviis atque carotidibus arteriis, funis, sive filum polyposum, vix lineæ fuit.

Ad venas autem quod attinet, Cava, atque Renales, diametro maximæ, sed vacuæ; excepto filo, illi simili, quod in arteriis inventum, sed hinc inde filo arterioso linea crassiore. Aquam multam utrunque pectoris cavum habuit, sanguinem vero nullum; ita ut æque sicca hæc, quam proxime præcedens Anatomie fuerit.

Nullas evacuationes passus hic homo est, quia nec habuit sufficientes: cum transpiratio, sudor, alvus, urina, postremis vitæ diebus penitus deficerent; atque a mensis retro spatium parcius debito fluxissent. Quæ ergo vitæ ratio in illo homine fuit? Non sanguis, sed chorda polyposa in vasis fuit, tenuis adeo, ut vasorum parietes ad columnam decuplo crassiorem vix adplicare se se contrahendo potuissent. Interim homo vixit, & perpetuo forti suo, duroque pulsu, in diuturnis suis ærumnis nos omnes in admirationem rapuit. Unde rogo, cum evacuationes non modo non præcesserint, sed quæ necessariae, dudum & imminutæ, & suppressæ fuerint; cum nullus fere sanguis cunctis fuerit in vasis; cum denique vasa amplissima amplecti filum hoc tenne, si fluidum adhuc in vita fuerit, nequiverint; undenam vita hæc misera tamdiu protracta? & protracta quidem perpetuo, cum duro, fortique pulsu?

Cl. Lieutaud in Epitome Med. Pract. 1759. Parisiis edita, ubi Annemiam ad classes morborum refert, asseverat vasa sanguinea interdum usque adeo sanguine vacua reperiri, ut caput, pectus, & abdomen, tam sicca sint, ut ceram referant, vasa minora tum omni carere sanguine, majora semiplena esse, utrumque genus aere turgere. In Virgine, cui anni spatium sanguis centies deductus fuerat, subito extincta, cerebri vasa ne vestigium quidem sanguinis ostendisse. Homini ob frequentiores in morbo acuto venæ sectiones Leipothymia post mensem, & mors, contingunt. Adverterant tamen paulo ante mortem vires reparari, & pristinum redire homini colorem. In cadavere vasa cerebri penitus sicca, cor sanguine vacuum



cum reperiffè se, omnesque sectiones plane siccas feciffè, Vir Clarus testatur. Sed evacuationes hic prægressæ sunt; in casibus vero binis nostris, vel vix notabilis evacuatio, vel nullà, prægressa est, in quam tantæ vacuitatis vasorum causam refundas. Quanquam in *Lieutanti* cadaveribus difficultate non careat, vitam aliquantisper productam fuisse, cum tanta humorum penuria.

#### §. IV. PROBLEMA TERTIUM.

**F**EMINA 37. ann. mense Septembri 1760. in Nosocomio *Pasmanniano* ab Ictero curata, inde exivit renitente optimo ibidem Physico *Collin*, cui mens erat eam firmioris sanitatis reddere, antequam domum repeteret: aucta postmodum debilitate, & difficili respiratione, Nosocomium repetiit, ineunte Decembri. Licet respiratio nunc difficilior esset, tamen nunquam sive quando ictero olim laborabat, sive nunc secundo suscepta, ullum cordis vel dolorem, vel palpitationem passa, conquestaque est; nunquam intermittentem, inæqualem, remittentem, pulsum habuit, nisi ad mortem, quæ a febre, & extrema debilitate contigit 14. Decemb. Cor cum Pulmonibus exemptum *Cl. Collin* pro publica demonstratione ad me misit.

Ut in enarranda hac Anatome merite capiant benevoli Lectores, monitos eosdem volo, in ponderibus numerandis me ubique pondus commune medicum 12. unc. intelligere; in mensuris autem capiendis me pedem sumere, pollicemque *Viennensem*. Pollex *Viennensis* lineæ minor est *Parisiensi*;  $\frac{4}{3}$ . longior *Rhenolandico*; dimidia linea longior *Londinensi*. Captæque fuerunt omnes hæ mensuræ postquam cor  $2\frac{1}{2}$ . diebus in spir. vini aquæ misto servatum, adeoque utcunque contractum esset.

Cor cum radicibus majorum vasorum elotum, deterfum, mollique linteamine probe exsiccatum, pondus librarum duarum æquabat. Magnitudo autem cordis, pondusque, maxime a mole Ventriculi sinistri nascebatur. Capacitas Ventriculorum tanta, ut ultra duas libras caperent ambo, sicut exacte capta mensura docuit. Dexter Ventriculus in longitudine percissus, & situ naturali in tabella explanatus, sex pollicum, seu semipedis, latitudinem, prope basin cordis habuit; sinister Ventriculus octo pollicum. Circumferentia basis cordis pedis integri cum  $\frac{1}{3}$ . pollicis. Ossea Aorta ad basin cordis abscissa 4. pollicum in circumferentia fuit. Cordis sinistri densitas firma, compacta, dura, erat 10. linearum. Dextri autem crassities naturalis. Longitudo dextri ventriculi cum ea sinistri æqualis. Capacissima Aortæ altitudine hinc 3. illinc 4. linearum, totoque in ambitu, osseum fuit; per universum autem ejus decursum insulæ osseæ, a se invicem remotiores, inventæ sunt. Pulmones boni quidem, sed ob cordis molem parvi, & in superiore thorace tantummodo inveniendi.

Si hæ omnes adeo insignes mutationes intra breve spatium prope mortem generari potuissent, in promptu responsum haberetur ad quæsitum, cur femina nunquam anxietatem ad Vitalia, turbatos nunquam perceperit pulsus? At vero Historia tota inquit a longo retro tempore enormem hanc Vitalium viscerum degenerationem sumfisse originem; dum interea, quæ eam denotarent, symptomata minime observarentur. Utique cor ita monstruosum, ut, explens maximam Thoracis capacitatem, pulmones angustum in spatium cogat; Cor idem præ densitate indurata vix contractile; adeo capax, ut ultra duas libras liquidi contineat; Osseus Aortæ annulus; Aorta dilatatissima, atque indurata, pluribusque latis Osseis insulis vitiata; hæc, inquam, omnia cum pulmone vix sanguinem transmittente, vix explicabili, debuerunt neces-

fario



sario ejusmodi humorum fecisse Circulum, quem Physiologicæ leges explicare nequeunt.

## §. V. PROBLEMA QUARTUM.

**I**N consilium vocabar finiente Novembri 1760. ad Viduam quinquagenariam, cum pie defuncto D. *Erndl*, & egregio Viro, Nosocomii Hispanici Medico, *Hasenöhr*, Autore egregiorum binorum tractatum practicum. Erat spasmis illa, anxietatibus, animi affectionibus, maxime iræ, perquam obnoxia. Paregoricis, ac Neuroticis, hinc olim levata, jam haud levabatur ultra; quin potius animo incepit linqui. Judicavimus omnes Vitalia, si non protopathice, quod verosimile, saltem deuteropathice, affecta esse. Hydrops pectoris sui quidem suspicionem fecit, verum palam asseri, præ multorum defectu signorum, non potuit. Die 15. aut 16. exinde elapso, extincta est.

In cadavere hydrops pectoris demonstrabatur. Cor cum vasis exemptum publico examini subieci. Ambitus vacuati cordis fuit ad basin 9. poll. 7. lin. Ambitus cordis in medio 9. poll. 5. lin. Altitudo a cuspide ad basin 4. poll. 2. lin. Officulum oblongum in substantia superioris partis sinistri Ventriculi, digitum immisum mox afficiens, & sic se detegens, longitudine octo linearum, in media latitudine trium linearum, durissimum. Auricula sinistra repleta erat materie crassa, sebacea, inæquali, & cum auricula firmissime accreta; in dextræ auriculæ cornu quoque quid simile fuit.

Valvulæ tricuspidales ad Aortam bonæ quidem figuræ, at durissimæ, totoque margine ossæ: corpuscula autem eorum rotunda, a *Morgagni* tam bene descripta, tum universa durissima erant, tum unum triplo majus, osseum. Valvulæ Venæ pulmonalis fere unitæ in unicam, sam-

eamque latam Zonam, sed naturali duplo majorem, crassam, inæqualem, duas lineas densam.

Ambitus Aortæ ad basin cordis 4. pollicum; ad curvaturam suam 4. poll. 2. lineis minus; ubi subclaviam generat  $3\frac{1}{3}$ . poll.; Ambitus Arteriæ pulmonalis 3. poll. 8. lin. Trunci coronariarum semipoll.

Valvulæ ad Aortam tegere, ac claudere Coronarias non poterant, licet easdem tenaculis fortiter attraheremus. Hoc sæpe. Unde *Morgagni* ex 18. cadaveribus invenit 13. esse, in quibus idem observatum.

At non modo Valvulæ non tegebant originem Coronariarum, verum etiam breves, induratae, contractæ cum essent, haud tantum non claudebant aperturam Arteriæ, sed tale, ad minimum, spatium in medio relinquebant, ut Aorta communis magnitudinis per illud commode transivisset. Jamque dudum id ita fuisse, Valvularum crassitudo & durities, ossiumque in una corpusculum, demonstrabant.

Porro quis circulus, qualisnam sanguinis motus, corde sinistro semper aperto, & aperto ad tantam amplitudinem? certe in Arteriæ systole dum ad Arteriarum fines resistentia est, hac via patula, multum sanguinis in cor refundi oportuit. Valvulæ enim non obstitere. Proinde debuit cor continuo ex aorta se contrahente sanguinem copiosum recipere. Unaque modo columna a corde per arteriam, numquam intercepta, semper integra fuit. Nec spatium in hoc ventriculo fuisse videtur ad excipendum pulmonalium venarum sanguinem. Si nunc consideremus vitium hoc antiquum fuisse, ut ante patuit, quaeritur physiologica circulationis in hac femina, quantumvis vitiosa fuerit, expositio, & modus.



§. VI. PROBLEMA QUINTUM.

**R**Evoco huc casum, quem Tom. 2. *Rat. med. cap.* 8. dedi, hominis scilicet, qui insolubili, & antiqua concretionē, connatas mutuo inter sese quascunque Thoracis partes habuit, Pleuram, Mediastinum, integros Pulmones, eosdemque iterum mutuis inter sese lobis, Pericardium, Cor totum; ut proprie loquendo omnes hæ partes nonnisi idem, unicumque viscus referrent. Nec singularis hic casus est, duos similes Pueri & Puellæ Cap. VI. dabit. Quæritur, quis hic vitæ fuerit, circulationisque modus?

§. VII. PROBLEMA SEXTUM.

**P**Uella 14. annorum anxia pectore, difficulterque respirans, cætera sana fuit. Nata 16. annos, mensium fluxum ter passa est, sequenti vero triennio nunquam. Anno vitæ 18. nascitur ipsi in sterni tumor, materiem fluctuatione designans. Cum hoc tumore prima vice ad nos accessit die Decemb. 30. anni 1758. Quia vagæ febres aderant, copiosamque materiam in hoc tumore interno de pectore ortam, suspicabamur, credidimus vel ab ejusdem resorptu, vel ab ossis carie, has febres nasci. Ea de causa aperuimus tumorem, ex eoque pus tum illo tempore, tum deinceps quotidie, vidimus effluere. Binis elapsis exinde mensibus, nempe finiente Februar. 1759. novus apparuit altiore sterni loco fluctuans tumor; qui itidem apertus jugi fluore stillavit. Cortex peruvianus, & lactea diæta, febres egregie profligarunt. Aprili mense novus tumor cum ossis prominentia, sed is sponte re-

recessit. A Majo mense ad Novembrem fluentibus jugiter ulceribus, sanissima vixit, res domesticas Parentum in ædibus optime curavit. Menstruo fluxu Majo, Junio, Julio, Augusto, gaudebat, deinceps vero haud ultra. Nov. 16. eam denuo intra Nosocomium suscepi, eo quod novus tumor in depresso sterni sede appareret. Aper-tus is, perpetuo deinceps fluxit. Sponte aperiebatur & quartus. Febres denuo continuæ remittentes, vix ultra cortice & lacte moderandæ, fecerunt vehementem materiæ ab ossæ sterni, vel forte ex Mediastino resorptæ, suspicionem. Postremoque hoc tempore Tussis accessit, ac puris sputum, tandemque vomitus, singultus, diarrhœa, consuetis immorigera remediis; superstite nihilominus pul-cra corporis, facieiue torositate: ita ut cortex, & lac corpus pulcre viderentur sustinere.

Hac rerum conditione in consilium vocavi optimos Chirurgos nostros: *Homburg* Chirurgum SS. MM. *Leber* Nosocomii Chirurgum, jamque Chirurgiæ in hac alma Universitate designatum Professore, *Reichberger* optimum ad *S. Marcum* Chirurgum, Veteranum Chirurgiæ Doctorem *Reutter*; quibus sese, præter egregium Medicum *Erndl* adjungere dignatus est Ill. *Præses*. Quæreba-tur quæ morbi sedes, quæ ejus natura foret? Equidem sternum quatuor diversis, & manantibus, & inter sese, facta injectione, communicantibus foraminibus, pertusum erat, per aperturam autem inferiorem specillum ad pro-funditatem sesqui pollicis immergebatur, fursumque du-ctum liber aliquantisper ambulabat. Idem specillum su-periori foramini inductum circa 3. & 4. costam laterali-ter pollicis latitudine intrabat; ut communicatio sic esset a sterni ulceribus ad quandam seu fistulam, seu cavitatem lateralem. Cavitas autem illa lateralis non videbatur in ipsam pulmonum abire substantiam, sed inter pleuram ac pulmonem; aut potius pleuram inter, costasque, & mu-sculos: siquidem aër fortiter inspiratus, & expiratus, ad-

mo-



motam candelam minime movebat. Pronum inde fuit cogitare forsitan in dilatato Mediastino Vomicam latere, quæ sensim sibi viam per exteriora moliretur, & quæ ad superiora sterni lateralem haberet processum. Quærebatur 2. in hoc consilio, foretne alia, quam quæ adhibita hucusque esset, adhibenda curandi norma? An perterebratio ossis, ut *Galenus* fecisse se scribit, qui quoque corrupti Pericardii portionem, osse terebrato, abstulit; nudique conspexit cordis motum? Qualem operationem quoque factam historia famosi *Ademoni Becker* testatur, qui ipse in opposito ad parietem speculo proprii cordis motus contemplatus fuerat? Verum ab una parte sternum, inæquale, & gibbosum admodum, Trepanum difficulter admissurum esset; & suspicio duntaxat, non certitudo, aderat, sub eodem inveniendæ in Mediastino Vomicæ: siquidem non Mediastinum modo, verum etiam quævis partes, tum proxime adjacentes, tum remotius sitæ, circa sternum ea, qua turgent, materie, evacuare se possint; unde frustra forte foret Terebratio. Ab altera parte quatuor diversis aperturis cum pus manaret, habebat Natura, quo se expurgaret.

Conclusio igitur fuit præsentia symptomata mitigare; corpus decocto Bardannæ, & lacte, implendo, & depurantibus injectionibus hucusque adhibitis substituendo novam, quæ aliquoties mire profuerit in similibus; scilicet cocta uncia media Colcotharis Vitrioli in aqua per semihoram, ut libra liquidi superesset: quibus per aliquod tempus continuatis, novum consilium super agendis convocandum esset. Atqui Vomitus, singultus, diarrhœa, nulla ratione curabantur, ulcera siccabantur, vires cito concidebant, octiduo post consilium elapso, moriebatur.

Cadaver pulcre torosum, pingue, crassum. Crassum omentum, adeo magnum, ut universum abdomen tegeret. Colon appendicibus innumeris pinguiferis cinctum. Ventriculus, Intestina, Diaphragma, Jecur, Splen, Mediastinum, Cor, Pulmones, qui in dextro cavo thoracis mul-

multum, in sinistro parum, cum Pleura cohærebant, optimi, sanissimi.

Cum igitur omnia Viscera summam spirarent sanitatem, sternum examinandum accuratius fuit. Incrassatum illud, convexum valde, tribus in locis erosione perforatum, pluribus plagis nudum, carie exesum, ab interiore parte saccum gerens, quem pleura a sterni, costisque, recedens formaverat; nempe ad trium digitorum latitudinem, in tota fere sterni longitudine, Pleura utrinque recefferat a costarum cartilaginibus, & anteriore parte musc. intercost. internorum, una cum sua productione media, Mediastinum format. Pollicis distantia Pleura hic a sterni distabat, non tantum quia retropulsa a contenta materia, sed quia sternum, ut dixi, convexum erat. Paucum pus hic aderat, quia ab octiduo vix quid effluerat, sed certo certius videtur a pure copiosiore hic collecto, formatus olim hic sacculus, sive hoc puris receptaculum fuisse.

Hoc ipsum receptaculum communicabat cum sinu, seu appendice ejusdem oblongo, cæco utrinque, in Thorace locato, inter pleuram, & musculos intercostales, digiti longitudine: Pus nunc paucum inerat ita ut vix intra Thoracem hi sinus prominerent. Ossa costæ 3. & 4., numero a superioribus ducto, utroque Thoracis in latere, circa sinus illos exesa, scabra, tamen alba: unica in plaga Musculus intercostalis internus multum, externus parum, exesi erant.

Phænomena morbi, mortisque considerando, mortis causam quærendo, hæreo aqua. Pure copioso olim fluente, sanissima vixit; domesticos alacriter peregit labores. Posthac quamvis pus copiose manaret, hecticæ febres, cortice insuperabiles, vomitus, singultus, diarrhœa, vehementer eam affligunt. Tandem siccis fere ulceribus, vomitu, diarrhœa, singultu, auctis, intra octiduum moritur. Periit quidem hæc Juvencula omnibus quidem symptomatibus hecticis, sed non modo citra hecticam corporis, humorumque

con-



consumtionem; verum etiam cum venusta musculorum torositate, cum totius obesitate corporis. Colliquescens, seu, ut in scholis loqui amant, colliquativa diarrhœa Phthysicorum more, vitam extinxit; corporis pulchra torositas, & obesitas, viscerum omnium illibata integritas, colliquescentem morbum plane negant. Neque enim, si sterni territorium cum sinibus suis lateralibus excipias, quidquam toto in corpore, quod sanissimum non fuerit, inveneris. Totum vitium fere extra leges circulationis hæsit.

An pus fundum receptaculi post sternum copia, ac pondere suo, in Diaphragma pressit, atque illud convellendo, singultum, vomitumque genuit? vix videtur, cum ultimis vitæ diebus sicca ulcera, & saccus fere vacuus fuerit, interea dum eadem symptomata pergerent.

Nunquid vitium in osse sterni natum prius fuerit, & quidem a valida Thoraculi in sternum compressione, quam sero deteximus? An proinde nata sanguinis phlogistica diathesis ab osse affecto, quæ quotidie per idem os evacuaverit se sic, ut corpus maneret sanissimum? An hæc ita aucta postmodum Diathesis, ut licet plurimum ulceribus efflueret, multum tamen sanguini intime commistum hæserit? Nunquid hinc 10. ante mortem septimanis Diarrhœa, vomitus singultus? Et denique an ultimis vitæ diebus cum ulcera siccesserent, sanguis nimia copia phlogistici oneratus, adeoque per minima vascula transfluere ineptus mortem induxerit?

Si simul corpus dudum extenuatum, & eniaciatum fuisset; causam manifestam interitus deprehenderemus; prout *Tom. 2. Cap. 2.* & passim in omnibus reliquis *Tomis*, multorum cadaverum sectione demonstrare conatus fui: verum quia viscera omnia sanissima, corpus obesitate, ac torositate conspicuum fuerit, explicatio morbi, mortisque deficit.

## §. VIII. PROBLEMA SEPTIMUM.

**J**Uvenis 25. annorum ad *Fratres Misericordiæ* se contulit, eo quod a contusione ad inguen, testemque dextrum, sibi sexenni facta, dolorem jam, tumoremque ingentem perciperet. Contulerat multum augmento hujus, quod Herniam esse quidam rati, Brachierium admovissent. Ventrem universum durum, ac dolentem, Religiosi invenere. Paucorum spatio dierum miseriis confectus, periit 7. die 1759.

Cadaveris sectioni interfui, sed cum Anatome quid intricati, & monstrosi habere videretur; totam abdominis molem, peritonæo maximam partem involutam, in publicum Pathologiæ Collegium afferri curavi. Clarissimo Professore Anatomes *Gasser*, pluribusque Chirurgis assistentibus, en quid invenimus!

Testis dexter molem capitis biennis Infantis habens, durus, & dum perscinderetur, hinc cartilagineus, illinc steatomatosus, scrotum explebat & inguen, haud tamen ultra suo de funiculo pendulus. Testi quippe, toti quanto, informis massa continuabatur, in inguine se dilatans dextrorsum ac sinistrorsum, ita ut expleret universam pelvim & hypogastrium, utrinque ad ilia, & posterius ad lumborum vertebrae. Assurgens a medio lumborum transibat per medium Mesenterium, altiusque sub Ventriculo progressa, cum degenerascente Pancreate confundebatur, & dextra portione Hepar tangebatur, in sinistro autem latere haud multo altius umbilico assurgens, spatium aliquod concedebat, in quo Ventriculus cum præcipua Intestinorum mole, arcte locaretur: Colo intestino interim a latere tumoris, & Recto sub tumore, decurrentibus.



Itaque tumor supercandendo Rectum, illud suo loco reliquerat; at haud ita Vesicam urinariam. Urethram quippe, elevando Vesicam, ita prolongaverat, ut ipsam Vesicam in sinistro Hypochondrio versus cristam Ilei, supra molem hanc tumidam inveniremus, quo versus & ureterem dextrum, oblique transversim decurrentem, quoque deteximus. Sinistrum ureterem vero, & spermatica vasa, præ summa partium confusione, non vidimus. Testis sinister bonus, nisi quod Vaginalis ejusdem tunica ita incrassata esset, ut herniam carnosam referret.

Quid unicus non efficiat testiculus affectus? Quamque insons diu malum, brevi aliquando summum obtineat atrocitatis gradum? At, quod plus est, horrenda mala Testis minime contusus, sed a causa interna, inflammatione, obstructione, semine retento, depravato, affectus, producit. Cogitabitis forte castratione hæc quacunque de causa orta præcaveri: sed, ut experientia testatur, Testis extirpatio summa mala præcavet, si funiculus spermaticus adhuc sanus sit; extirpatio Testis, funiculo affecto, malignitatem exasperat potius, quam mitigat.

Juvat *Hildanum* legere Cent. 4. N. 64. ubi de Hernia spuria, carnosæ dicta, agit. Recensitis Veterum placitis, credit ipse Herniam carnosam a semine stagnante, & corrupto oriri. 2. In dextro potius quam in sinistro reperiri; saltem se, inter plures casus, semel modo in sinistro vidisse: quemadmodum e contrario Herniam aquosam in sinistro teste frequenter, rarissime in dextro, vidisset. 3. Hujusmodi Hernias ut plurimum in Juvenibus, qui sanguine ac semine abundant, quique in coelibatu vivant, accidere solere. Historias autem horrendas recenset, interque eas unam Sacerdotis, cui dexter non modo testis, sed & vasa spermatica lapideam induissent naturam; ita ut abdomen manu comprimens, eandem profecto duritiem in dextro hypochondrio deprehenderet. „ Malum autem, ait, ad ipsam usque originem Vasorum spermaticorum ascendere, dolor ipse, quem e



„ regione Vasorum spermaticorum ad renem usque de-  
 „ xtrum continuo persentiebat, indicabat. Aderat præ-  
 „ terea Vomitus, & appetitus prostratio, non tamen  
 „ propter Herniam, ut quidam, qui ipsum ante me in-  
 „ viserat, statuit, ( notavimus eundem errorem in no-  
 „ stro homine commissum ) sed ratione tumoris doloro-  
 „ si, & duri, e regione fundi Ventriculi existentis, qui-  
 „ que compresso abdomine tactu facile percipi potuit.

*Ulboorn* in notis ad *Heisteri* Chirurgiam pag. 937.  
 habet plura similia exempla, unumque præ cæteris ho-  
 minis junioris, amissa Juvene uxore, dudum cœlebis,  
 quem similia eorum, quæ *Hildani* Presbytero contige-  
 rant, dudum passum, tandemque mortuum, aperuerat.  
 Invenit a Teste duro, pugnum virilem magno, corpus  
 durum oriri, hinc inde fungosum, & ad lumbos ichore  
 refertum; quod umbilico demum altius, majorem lobum  
 Hepatis trudebat extrorsum. Similia in praxi vidi.

Contusiones, ut vidimus antea, tremendum hunc  
 morbum generant; sed semine retento, corruptoque, ea-  
 dem generari, experientia fidem facit. Pluresque forte  
 existunt, quam quas hucusque recensuimus, causæ. Dum  
 a quarta specie gonorrhææ virulentæ urethra prope ca-  
 put gallinaceum exesa, emunctoria seminis cicatrice coa-  
 luerint, ac sanitas postmodum redierit, ejusmodi mala  
 oriri in proclivi est. Inepti enim, qui semen ejaculent,  
 coacervant illud. Unica his medela est sobrietatem per  
 omnia colere, ut semen testibus paucum conficiatur, quod-  
 que conficitur, in sanguinem redeat, virileque adaugeat ro-  
 bur. Quod quoque unicum his consilium superest, qui vel  
 in Matrimonio semen copiosum emittere soliti, jam uxores  
 notabiliore tempore ad conjugium ineptos habeant; vel qui  
 quondam sive Onania, sive Scortatione, multum profu-  
 derint seminis, jamque aut resipiscant, aut Religiosum,  
 Ecclesiasticumve statum, sint amplexi. Horret animus  
 considerando impune alibi libros tolerari, qui scelestissi-  
 mis consiliis scateant. Lucrantur, inquiunt, hoc modo  
 sa-



sanitatem, non attendentes ad Evangelicam exclamationem Matth. Cap. 16. v. 26. *Quid prodest homini, si mundum universum lucretur; Animæ autem suæ detrimentum patiatur? Aut quam dabit homo commutationem pro Anima sua?* Cura conservandæ sanitatis in omnes incumbit; sed legitimis conservandæ adminiculis, haud vero iis, quæ lex Divina citra ullam exceptionem condemnat.

Quæritur utrum a miranda Testis fabrica, an ab inexplicabili seminis natura fiat, ut prægressis, quas enarravi, internis, externisve causis, & Testis & Funiculus in monstrosam adeo molem mutantur. Si a fabrica Testis, cur etiam totus Funiculus sic fiat, qui non habet similem fabricam? si a semine detento, corrupto, cur Funiculus horrendius degeneret, quam ipse Testis? An forte materia seminis jam in sanguine Arteriæ spermaticæ est, quæ in testem contusum, obstructum, deponi nequeens, sensim ita cellulositatem, arteriis, venisque spermaticis circumfusam, infarciat? Aut quæ alia causa?

## §. IX. PROBLEMA OCTAVUM.

**H**omo 20. annorum contudit dextram tibiam, quæ inde tumens pugni demum molem æquabat, spatium tamen, mirum dictu! 30. annorum indolens. Dolere tunc demum homo cepit, idque sponte; & quinque postea elapsis mensibus febre quotidiana, in tertiam septimanam producta, laboravit. Sub finem hujus febris Chirurgus facta cruciali incisione enucleavit tumorem, optimaque consolidavit cicatrice. Tumorem frustum crudæ carnis retulisse ferunt. In quintum exinde mensem bene habuit; eo vero exacto repullulat malum, ac spatio 6. septimanarum sic augefcit, ut in majore diametro pollicis duos, unum in minore æquaret; altitudine depres-

tior, fungum æmulabatur, cujus pedunculus brevis quidem, at pollicem crassus esset. Cysticus, ut olim, jam non est, & inferius erofus, apertusque, nihil stillat. Quod porro apertus sit, imprudentia contigit Balneatoris, qui homini ruricolæ lapidem infernalem dederat, ut ter de die tumorem inde tangeret. Consumi hinc non videbatur, sed erodi, ac purpurascere. Accessere autem spasmi abdominis, quibus demum respiratio anhelosa successit, maxillaque inferior obriguit.

Hoc misero statu primum in Nosocomium cum uxore venit, moxque coram me emprostotonos fit, summo cum anhelitu, & Tetano maxillæ; qui Tetanus ad mortem usque plus minus duravit. Tristi & ipsi, & Auditoribus, facta prognosi, eum in Nosocomium suscepi.

Anxie admodum in naturam inquisivimus mali horribilis, magis anxie in medelam. Post facilem 30. annorum tolerantiam (quis homini perpetuam immunitatem non esset facile pollicitus?) tumor hic quinque mensium spatio dolens, febrimque generans, enucleatus quidem fuit; at vero in osse, periosteove, quid corrupti mansisse, testari videbatur idem tumor post 5. menses renatus, tantaque malignitate comitatus, ut spasmos, tetanosque crearet. Quæstio erat, utrum ita malignus natura existeret, an vero lapidis infernalis irritamento? At lapis externa modo tetigerat, quod etiam alibi haud ita malum. Ulcera, vulnera, tubercula, ejusdem attactum inculpate ferunt, etiam in locis admodum nervosis; ut v. g. in glande penis. Hæsimus suspensi, saltem a quacumque causa hæc symptomata oriebantur, erant semper formidolosa, ac periculosissima. Tetano Maxillæ impedita deglutitio per se jungebatur; quæ sane prognosin funestiorrem reddidit.

Dixerat *Hippocrates Aphor. 5. - 6.* „ Qui a Tetano corripiuntur, in quatuor diebus pereunt; si vero hos effugerint, sanescunt. „ Mitigat. prognosin hanc *Libr. de Morb. apud Foef. pag. 491.* „ Tertio, aut 5.  
„ aut



„ aut 7. aut 14. die perit, quos si effugerit, convale-  
 „ scit. „ Et magis adhuc libr. de intern. affect. pag.  
 561. de Opistotono agens: „ Hic vero morbus, inquit,  
 „ ut longissime ad dies 40. detinet, quos si effugerit,  
 „ convalescit. „ Hæc quoad prognosin ille.

Diagnosin autem generalem pulcre format Libr. de  
 dieb. Judic. pag. 51. „ Maxillæ velut ligna rigescunt,  
 „ os aperire non potest. Oculi illacrymantur frequenter,  
 „ & contrahuntur, dorsum rigidum est, neque crura,  
 „ neque manus, neque spinam inflectere potest. Cum ve-  
 „ ro lethalis fuerit, potus & edulia, quæ prius devoravit,  
 „ per nares interdum exeunt: In Opistotono ager in reli-  
 „ quis eodem modo afficitur. „ In laudatis textibus ex  
 libr. 3. de morb. & libr. de intern. affect. de hisce sym-  
 ptomatibus & præcipue de impotentia deglutitionis,  
 similia refert. Porro tribus diversis in locis agit libr. de  
 dieb. Judicat. de his nervorum morbis *ab ulcere externo*  
 ortis: & licet post 40. diem adhuc mortem homo effu-  
 gere queat, absolute tamen eum moriturum pronuntiat,  
*si potus, cibus, mucus, per nares exeunt.*

Curam suscepturus Cœus, quemadmodum laudatis  
 mox textibus, in unum collectis patet, dat primo acria  
 quædam devoranda ex Pipere, & Helleboro nigro. An  
 veluti nos acribus spasnum uno in loco excitamus, quo  
 illum sopiamus in alio? Hæc vero cum nocere per se  
 possent, simul pingua jura superpotanda dedit. Estque  
 hæc cura læsæ deglutitioni anterior, quippe post illam  
 impossibilis. 2. Sternutamenta adhibet, scopo forte eodem,  
 quo acres pilulas deglutiendas dederat: haud incon-  
 grue sane; cum hoc modo spasmos nonnunquam, singul-  
 tusque, ipso illo Aph. 6--- 3. notante, solvamus. 3. Par-  
 tes tetano affectas emollientissimis fovebat, ut pro rigi-  
 ditate adipiscerentur mollitiem. Sed 4. emollientibus hi-  
 sce stimulantia addebat, ut fibræ relaxatæ in naturalem  
 contractionem abirent. 5. Corpus interim quantum pote-  
 rat, emollientissimis implebat. 6. Si deglutitio cessaret,

naribus iniici liquorem jubebat, ut, dum rigida maxilla admittere Alimenta, ac Medicamenta, eorumque deglutionem adjuvare, renueret, liquor per nares injectus fauces subiret. Hoc porro ultimum mihi difficultatem parit. Experimentum tentavi in me, & compluribus aliis, sine successu. Patitur homo utcumque, si os apertum est, & lingua obsequiosa; at vero quicumque nostrum simulato maxillæ tetano, ( sine quo experimentum nihil est ) hanc per nares injectionem sive debilius, sive fortius factam sustinuit, fere suffocabatur. 7. Peculiarem curam Tetani habet injectu, affusu, frigida ad corpus aqua; religiose tamen casum nostrum ab hac cura excipiendo. „ Est vero, inquit Aph. 5---21. ubi in Tetano 1. sine ulcere ( noster ulcus habebat ) inveni bene carnosum ( noster quinquagenarius est ) ætate media ( nobis inchoabat Aprilis ) Frigida multæ affusio caloris revocatio, nem facit: calor autem hæc solvit. „ Et Libr. 3. de Morb. adjungit: „ post affusam plurimam frigidam, vestimenta tenuia pura superinjecito, tuncque ignem ne adhibeto.

Multis exemplis Vir magnus didicisse videtur, Tetanos non modo non curari injectu frigida, verum etiam eosdem, si nondum adsint, generari. Ait enim Aph. 5---22. „ Frigidum mordax ulceribus . . . . facit . . . . „ spasmos; tetanos „. Unde & vetat Aph. 5---23. affusiones frigida in ulcere vetusto, in Erysipelate ulcerofo. Ufu quoque cognovisse videtur, Tetanos in remotioribus locis frigida aqua affusione non sanari, nisi affusio illa in ipsum locum fieret, unde Tetani causa; alioqui ulcera sic claudi possent, ut frigida iisdem minime noceret, interea dum ad Tetanoideam plagam frigidam affunderemus. Vel consideravit, ut Doctiss. *Russicus Archiater* in hunc Aphorismum advertit, tetanos tum a nimia humorum copia, rarefactione, ac motu, oriundos, tum a prava materia ulcerum: in his nocere affusam aquam frigidam, cum ulcera prava frigore in pejus ruant, adeoque



tetanos inde jam genitos, insolubiliores reddant; illis vero prodesse, quia, quamvis contractionem automaticam frigida augeat, minuit tamen contractionem vitalem: at vero casum rariorem esse Tetani ab hac causa orti, frequentiore alium ex prava materie. Hinc concludimus dicente illo: „*Est vero ubi in Tetano, &c.*“ id perinde esse, ac si diceret: *Contingit vero nonnunquam in Tetano.* Sicque illud optimi interpretes intellexere. Hinc, quia & anceps hæc cura, & rara est, & tot exigit cautiones, & casum nostrum penitus excludit, eandem haud instituiamus.

Videbantur autem duo maxime hic indicari. Primo causam Tetani in ulcere aggredi. Secundo effectus sopire causæ. Certà utique mors erat, si causa in Tibia non mutaretur; nonnulla spes, ( pauca tamen ob mali progressum ) poterat, causa ablata, concipi. Nervi ob iram, vindictam, zelotypiam, mirifice affecti, ablata causa efficiente, sæpe pacantur; at sæpe minime, quando effectus causæ, ablatae quamvis, tantus fuerit, ut ipse ille nunc sufficiens causa sit perpetuandi motus. Exemplo viri militaris Cap. 2. N. 3. id patuit. Attamen causa manente, effectus perennes erunt; ablata illa, spes est aliqua curationis, dummodo effectus causæ jam non fungantur vice causarum. Igitur auferendum tumorem Tibiæ conclusimus, maxime cum remedia demulcentia & paregorica jam frustra a sapiente Medico adhibita essent. At vero quâ methodo auferendum? Enucleatione? jam tumor minime cysticus adparet. An collum ejus ligando? Sed & collum nimis amplum est, & tempus ampli colli ligaturæ solvendi nimis longum, & dolor inde oriundus, novis convulsionibus, tetanisque creandis, aptus natus. Prudenti igitur cultro auferendus. At vero ingens hemorrhagia, quam ante octiduum ulcere prodiisse narrat, an non contra indicat? Hanc tortili machina arteriæ femorali circumponenda præventuros nos sperabamus. Unde i. Aprilis *D. Leber* tam suspensa manu tumorem

excidit, ut id æger ignoraret, nisi ultimo momento. Ablatus tumor partim carnosam, partim adiposam, partimque cartilagineam materiem, & multa vasa sanguinea iisdem intertexta, referebat. Paregorica & Camphorata Emulsione patiens usus, tetanodes nihilominus mansit, & insequente nocte factus emprostotonus.

Sed mox ab operatione loca tetanoidea externis remediis aggressi sumus. Egregium effectum in juvene, tetanum maxillæ ex Lue venerea habente, videramus a *Paræi* consilio, fimum equinum adplicandi. At tentamen hoc effectu caruit. Inutilia quoque Cataplasmata erant, seu emollientia sola, sive emollientia cum Camphora. Enematibus communibus prægressis, vicissim alia tum nutrientia, tum opiata immissa sunt. Expertus pluries in spasmo, Deglutitionem integro die plane impediente, Enematis, unciiis 5. 6. Lactis, Laudani gr. 3. 4. parati, mirandos effectus, idem tentavi, sed frustra. Incassum quoque pluries injectum in anum oleum. Nec juvere multæ siccæ cucurbitæ ad guttur, & maxillam pluries, ac numerosæ, admotæ. Acria Cataplasmata, Vesicantia ad eundem locum, ut & alibi adhibita, sine effectu constante. Imo tumor intra triduum avellanæ magnitudine repullulavit; qui, consilio habito, denuo ad periosteum, majore tamen quam prius dolore, excindebatur. Febris vere ardens juncta post binos a prima operatione dies fuit, cum pulsu durissimo. Spatio sex dierum durante illa, sanguis quinquies ad notabilem copiam detractus, semper crustam densissimam gessit, ægerque diu, noctuque caloris intolerabilitatem conquestus est; interea dum Thermometrum, bis die octo minutis adhibitum, passim 98. aut 99. gradum, semel modo 100. notaret: ultimis quinque diebus paucæ duntaxat urinæ guttulæ prodierunt: nono die periit.

Anatome notanda hæc dedit. Tribus diebus, minus sex horis, a morte elapsis, nemo nisi summam vim adhibendo, maxillam vel leviter diducere potuit. Idem



antea observaveram in femina, quæ a Tetano maxillæ, rabida ira suscepto, in Nosocomio obierat. An igitur contractio, eaque tam valida, tanto a morte tempore, in tendinibus ac musculis perennare potuit? Totum Palatum fornicatum, Velum pendulum, Uvula, Oesophagus totus, albedinem, non ab adnata crusta, sed ab ipsa sua politissima substantia referebant. Ventriculus nonnihil reservaverat suæ villosæ tunicæ, ut etiam quibusdam in locis intestina; at vero eadem intestina hinc inde magnis inflammata plagis, coloreque purpurea, eandem habuere glabritiem. Pinguetudo immensa in toto interno corpore, atque massa ingens pinguédinosa, Ventriculum duos in saccos comprimendo dividens, ut jam Cap. I. N.4. notavi, licet homo hic nullam habuisset in vomitus præpensionem. Coli Ligamenta tenuissima, unde idem contractum valde in longitudine, amplitudine autem expansissimum. Bilis vesica nigerrimæ bilis duas uncias continebat. Vesica urinaria prorsum vacua; unde patebat, quando urina 5. dierum spatio vix paucula exercebatur, defectum secretionis, sive ischuriam spuriam, ante mortem adfuisse. Ad Mediastinum, ac Pericardium, multa vasa, quæ & magna, & turgida. Paries dextri cordis tenuis admodum, crassa sinistri. Aorta a corde usque ad absolutam suam curvaturam in saccum naturali duplo ampliorem dilatata erat. Polypi crassi in utraque majori arteria; polypus ex arteria in cor pendulus, bulbi instar, exterius flavus, coagulatus, interius autem cavus, ac sanguine purpurascente, omninoque fluido, plenus. Aspera arteria cum pulmonibus bona. Cartilago thyroidea plane ossea. Reliqua viscera, partesque sanissimæ.

Quod jam ad os Tibiæ adtinet, tres supra illud eminentias exiguas, cum periosteo haud cohærentes, sed in cellulositate libere locatas, deprehendimus: os autem Tibiæ ipsum Tophum pollicis lati magnitudine habuit. Osse ferra diviso, bona medulla, bonaque ossis internæ superficies.

Nunquid Lapis infernalis afficiundo nervum in tu-  
more, sic alios in corpore nervos affecit, ut, causa abla-  
ta, nervi, tendinesque, & muscoli, contractionem suam  
perpetuarint? Imo ad expletos fere tres a morte dies in  
maxilla continuarint? Et postremum hoc, quibus demum  
Physiologiæ legibus explicabimus?

## §. X. PROBLEMA NONUM.

**H**Ujus anni 27. Martii Expertissimus & Eruditissi-  
mus Medicus *Guarin* copiam mihi fecit cadaveris  
juvenis 19. ann. qui elapsis exinde 5. septimanis ad No-  
foc. *Fr. Misericordiæ*, cujus vigilantissimus Physicus est,  
delatus, debilis, vix anteaكتورum memor, sui morbi ana-  
mnesim dare non potuit; id unice deplorans, quod præ-  
miseranda rerum omnium egestate in has calamitates in-  
cidisset. In hac debilitate dextro latere doluit, difficulter  
animam duxit, tussim frequentem habuit, pulsumque ce-  
lerem, ac debilem; sitibundus, alvo obstructus. Prudenti  
remediorum usu spatium octidui recreari primo visus, an-  
xietate dein ingenti correptus est, & 12. anxietatis hora  
expiravit.

Aperto abdomine, peritonæum hic lineam, ibi tres,  
quatuorve, crassum, cæterum album, granulosum, tube-  
rosum, ubique. Omentum non inveniebamus. An ideo  
tam crassum peritonæum, quod omentum a nexu suo  
cum colo & ventriculo solutum, in unam informem mem-  
branam cum illo degeneraverit? Quidquam tamen, omen-  
to simile, veluti extensum, atque connatum, cum inte-  
stinis, apparuit nobis; verum minime Omentum fuit,  
cum Marsupii instar æque tegeret intestina ad dorsum,  
quam ad anteriora, arcte cum illis ubique coëuns. Pro-  
be autem & lente producto examine, vidimus clare ex-  
ternam omnium intestinorum tunicam ab intestinis omni-  
bus



bus secessisse, & cum vicini intestini tunica secedente coaluisse. Erat autem tunicæ externæ secessus in toto intestini cuiusque ambitu. Quando enim uno in loco perfcideram hanc extimam tunicam, digito sub illa potui perambulare circum totum intestinum, ipsiusque intestini ex hac vagina educti portionem adtrahens, evaginavi omnia intestina ex sua tunica externa, sine vel minima laceratione. Stupentes omnes hunc mirum casum, Mesenterium dein & Mesocolon contemplabamur: in illis mirabamur nunc laminas utriusque sic abire in vaginam hanc, seu tunicam olim externam intestinorum, ut non nisi una videretur, eademque membrana. Utque superficies tunicæ intestinalis oblita erat innumeris ubique flavis granulis, ita & Mesenterium, ac Mesocolon. Verbo dixerim nullam differentiam inter Mesenterium & Mesocolon ab una parte, & extimam intestinorum tunicam, jam ablatis intestinis adparuisse, præterquam quod laminæ illorum cellulositate unitæ essent, hujus vero a se invicem liberæ. Proinde clare demonstrabatur id, quod Anatome docet, tunicam externam a Mesenterio & Mesocolo intestinis dari; 2. Ligamenta Coli ab hac tunica nasci, manserant enim in illa hæc; evaginato autem colo, levis modo tensio, minorque tantummodo extensilitas, quo in loco affuerant ligamenta, aderat. Quod porro in principio ideam unitæ membranæ, omenti instar, universam anteriorem intestinorum molem, posterioremque regentis apparuerat, id inde natum esse posthac intelleximus, quod tunica hæc externa, pluribus in locis lacera, cum lacera parte vicinæ intestini tunicæ, coivisset, hincque unicam, atque æquabilem membranam repræsentaret. Unde intestina, in parte a Mesenterio aversa, sua hac tunica destituta erant; & prope Mesenterium ab eadem sine cohæsiōe contegebantur.

Intestinorum longitudinem definire difficile, hincque variare in hac definienda videmus Anatomicos. Si a Mesenterio separantur, longiora, brevioraque erunt, prout  
plus

plus minus de Mesenterio adhæserit. Estque in homine uno præ alio differentia quandoque magna. Cæterum vix differret mensura multorum; nisi proprio errore nostro differentiam mensurarum ingentem statueremus. Id ut evitetur, notities requiritur varietatis ulnarum, pedumque apud varias gentes. In pedibus paucior est diversitas, quam ut notabilem differentiam in longis corporibus mensurandis inducat, quemadmodum pag. 55. ostendi. Hinc quando v. g. *Glissonius* tenuibus dat 33. pedes, *Garengeotte* 22., statuendum est, aut *Glissonii* hominem multum ab eo *Garengeotti* differre, aut *Glissonium* Intestina curatius a Mesenterio solvisse. Ubi vero Autores longitudinem ulnis definiunt, accuratius attendendum est. *Hollandicam* v. g. ulnam *Viennensis*  $\frac{1}{4}$ . excedit; *Parisina*  $\frac{1}{2}$ . *Viennensem*. Optimam mensurandi facultatem

evaginata nostra Intestina dabant: elongatiora quidem extrahendo facta, primum ad naturalem amplitudinem aëre inflabantur. Tenuia æquabant 12. ulnis *Viennensibus*, crassa sesquiulnæ: habebant igitur una sumta 31. pedes *Viennenses*. Differentia autem pedis *Viennensis* cum aliis pag. 55. notata fuit.

Si igitur homo sit 5. pedum, & intestina ejus 31. pedes longa sint, habebitur paulo plus quam sextupla longitudo intestinorum, quam quæ est hominis. Porro ipsi homines ratione Intestinorum inter sese differre queunt, idque naturaliter (neque de monstruosa brevitate in Chirurgia *Dionis* descripta, aut de similibus, hic sermo est); adeoque quintuplo, aut sextuplo Intestinorum longitudo major quam corporis, unde desumta sunt, definita a variis Autoribus, haud multum a nostra observatione differt.

Præcipue autem hic quæritur, cujusnam generis hic morbus fuit? quove nomine appellandus? Quantum mihi nota Historia medica est, similem nondum reperi. Qualis-



lisnam Intestinorum maxime crassorum, actio, qua, datis ad id remediis, pluries sese ante mortem evacuaverint? Qua de causa genita hæc universalis intestinorum, ab externa sua tunica, solutio? Cur nulla inde læsio nata, aut affectio observata Intestinorum? Malum enim antiquum fuisse, absoluta omni in loco separatio tunicæ ab intestinis; firma tunicæ externæ, in locis mutui contactus, cohæsiō talis, ut unam modo membranam referret; abunde evicerunt.

## §. XI. PROBLEMA DECIMUM.

**F**emina Lue Venerea affecta magnum corpus intra dilatatissimam Vaginam, ex eadem vix propendens, gessit. Sex septimanis in *Pasmanniano* Nosocomio fuit, alvum bonam (quod præprimis notandum) semper habuit ibidem, morbi autem gravitate circa medium Januarii hujus anni obiit. Uterum, Vaginam, Intestina, expertissimus ibidem Physicus *Collin* mihi ad publicam demonstrationem misit.

Ileum intestinum utero arctissime unitum erat, ope duri tumoris, pugnum virilem magni, in Intestini parte a Mesenterio averfa hærentis, idemque ideo ultra pugni magnitudinem extendentis. Nulla tamen prava symptomata hinc orta fuere; cum Intestini pars, Mesenterio nexa, canale sufficienter amplo transitum Chylo concederet. Fuit hernia intestinalis intra Vaginam, qualem *Garengeotte*, alique notarunt. Igitur femina hæc cum tumore pugni magnitudinis in ipso Intestini Ilei cavo, cum hernia intestinali intra Vaginam, sine ullis lethaliibus alterutrius morbi symptomatibus, longo admodum tempore vixit.

In Hernia ejusmodi, ubi portio intestini ita intercepta est, ut quæ intra abdomen portio sit, libera maneat,

neat, apertamque viam Chylo, aut fecibus conciliet, mortem toties, post omnia Herniæ incarceratæ symptomata, ortam vidimus; idque, ut videtur, a producta aut inflammatione, aut spasmō, a parte constricta ad eam, quæ libera est. Hic pars Ileī intestini pugni magnitudinis tumorem habuit, cum utero intime, lateque concrevit, & ab uteri latere in Vagina pependit. Cur nunquam affecti adeo graviter & monstrose intestini, cur nunquam Herniæ Vaginalis, symptomata apparuerint? Prævideo, qui problematis solutionem tenere se autument; sed rogatos eosdem volo, an ipsi, si multos casus practicos Ileorum & Herniarum viderint, sibi met tali solutione satisfaciant?

## C A P U T V.

### De Calculo Vesicæ Urinariæ, & Lithotomiæ.

§. I. *Quinam aut nullam, aut notabilem, aut integram quietem, in calculi tormentis, ab Aqua Calcis, & Uva Ursi, adipiscantur. An, qui nullam, his dissuadenda sectio, ob degenerem viscorum suorum conditionem? Communi moderatorum methodo instituta sectio, dissuadenda sane; quæ vero methodo Fratris Cosimi, suadenda, eo quod non periculosa, & qui post illam moriuntur, non ab illa pereant, sed quod morbus ipsorum jam letalis existat. Unde data hac prognosi videtur posse tuto institui. Occasio cur in Nosocomio hæc celebris fuerit.* §. II. *Prima sectio cum ambigua admodum prognosi instituta; cujus occasione ipsa Methodus exacte enarratur, cum omnibus cautelis in eadem observandis, ratione patientis, operatoris, adjutorum. Mors patientis, & Anatome. Observata necessaria ex cadavere petita in Methodi laudem. Historia secunda fortunatam sectionem habet. Historia tertia sequitur, ubi in congenito malo, prognosi ambigua formata, sectio optima fuit; sed*  
pu-



puris perenni confectione a degeneratione partium nata, & effluxu, vulnus post se longa tempore apertum reliquit. Historia quarta exhibet sectionem in congenito quoque, ut videtur, malo, quæ post ambiguum prognosin, felicissima fuit. Et quinta historia in connata Lithiasi perfectam sectionem refert. Historia sexta in desperato fere casu ingens a sectione levamen, non perfectam tamen curam, habet. Historia septima, omni ex parte felicissima, licet morbus congenitus videatur. Historia octava Casum refert pueri ante annum communi methodo, hoc ipso anno bis secundum eam Fr. Cosimi, secti, ubi comparatione facta inter symptomata, quæ hic puer a sectione modernorum primum, & nunc ab eadem methodo Fr. Cosimi bis instituta, habuit. Simul hujus præstantia præ illa patet. Historia nona felicem omnino curam refert. Historia decima optimam quoque curationem continet, sed ob quandam in methodo mutationem, quæ communi modernorum sectioni laterali similis erat, symptomatibus comitatam gravioribus. §. III. Ex omnibus antedictis 23. Scholia sequuntur, quæ agunt de variis secandi methodis, deque ea Fr. Cosimi dicta, tum de variis in tota cura observandis, de urina, glutine, pure, calculorum.

§. I. **D**E hoc morbo *Austriæ* Endemio, plebejis tamen, quam nobilioribus familiariore, ut in omnibus hujus Operis Tomis egi, ita ob experimentorum crebritatem de eodem hoc Capite iterum fuisse agere decrevi. Ac primo quidem loco, quæ toties antea dixi, repetam: iteratis experimentis liquido constare 1. Plures numero homines esse, quibus aut Aqua Calcis cum Sapone, aut Uva Ursi, ejusmodi levamen afferant, ut cum præsentē calculo sint adeo sani, & in functionibus suis, præsertim Ouropoietica, adeo valentes, quam si prorsum liberi a calculo essent. 2. Dari nonnullos, quos ad tempus quidem, haud vero constanter, levant. 3. Non paucos quoque reperiri, quibus ne hilum quidem opitulentur. Hos ultimos repetitis experimentis di-

Vidici nonnullas habere partes, Vesicam, puta, aut Ureteres, aut Renes, aut horum plures simul, sic a statu sano degeneres, ut restitui nequeant, hincque remedio dato, vel non dato, antiquas ærumnas continuent. Qua eadem in causa, eosdem Lithotomia fānescere posse nego, quod hæc calculum auferendo, degeneres notabiliter partes non redintegret.

Hinc igitur sectionem dissuadebimus? Profecto si a sectione multi pereant, ut Diaria sectionum luculenter demonstrant, parvum illud solamen, quod nonnulli inde percipiunt, ut vitam paullo minus miseram ad tempus protrahant, mortemque procrastinent, non potest acceleratæ multorum æquiparari perniciiei. At vero si talis sit secandi methodus, ut vix inde, nisi penitus desperati moriantur; si ea sit sectionis fortuna, ut etiam ii, quibus degeneres utcumque hæ partes, vel insigne levamen habeant; vel etiam in integrum restituantur; si denique illud artis emolumentum sit, ut calculum nullo cum vitæ periculo educat; erit sectio fere omnibus commendanda. Quinimo cum longe tutius est calculi cruciatu liberari, ablato, quam remanente calculo, erit hæc præstantissima secandi ars quibuscunque symptomatum curandorum methodis præferenda.

Porro ejusmodi est secandi methodus *Fratri Cosmi*. Quod ne precario asseruisse videar, hujus methodi historiam paucis adornabo.

Aderat hac hyeme cum *Regia Principe Lotharingia* ejusdem Consiliarius & Chirurgus *Cambon*, vir in omnibus fere, quæ perfectum Chirurgum formant, instructissimus, scientia, peritia, dexteritate, probitate. Narrabat mihi se hanc normam secandi primo *Parisiis* sub auspiciis Reverendi Autoris feliciter exercuisse, posteaque alibi frequentius. Exhibebat mihi famosum illum, quem *absconditum* vocant, cultrum Autoris examinandum. Novam autem contradictiones, quas *Cosmus* a parte haud incelebrium in *Arte Magistrorum*, ac si ars ejusdem per-

nicio-



niciosissima foret, perferendas habuerit. Extat in hanc rem liber, cui titulus: *Receuil de Pieces importantes sur l'Operation de la Taille, faite par le Lithotome caché, Paris 1751.* in quo de hac re utrinque disceptatur. Porro experimenta, in vivis facta, eo tempore pauciora extabant, quam ut Autor methodum suam contra vehementes Adversariorum clamores fartam tectam præstaret. Verum curæ, quas fane numerosas egregius *Cambon* feliciter perfecerat, convincebant me de methodi præstantia. Unde humaniter ab ipso petivi, ut suam in Nosocomio nostro dexteritatem vellet exercere; id quod cum lubenter annuisset, operam dedi, ut in urbe, in suburbiis, in vicinioribus pagis, sufficiens Calculosorum numerus colligeretur, quorum historiæ ordine sequuntur. Præsentia sua operationes istas cohonestarunt sæpe celeberrimi in Arte Viri, Magnificus Rector de Fetzner, Ill. Præses L. B. Van Swieten, Spectabilis Decanus Dietmann, omnes Magnifici D. Archiatri, semel quoque SS. MM. Oculista dexterrimus Wincel, ac multi alii Medici & Chirurghi.

## HISTORIA I.

*N. Keller*, biennis infans, stranguriam dudum jam passus, 26. Aug. 1757. ad me adductus est. Cum D. *Leber* illum examinans asperum calculum detexi. Dedi Uvam Ursi a granis 4. de die incipiendo, & augendo sensim ad grana 40., interpositis ob miserandos infantis ejulatus paregoricis: exiguum initio levamen fuit, deinceps vero insigne; ita ut annos 1758. 1759. tolerabilissime transegerit, modo remedium aliquando non negligeret. Contigit autem ut Autumno 1760. quotidiana febre, & anxietate pectoris laborans, spatio 10. dierum in Nosocomio detineretur, eoque tempore Uvam Ursi minime assumens, urinam tamen sanorum more optime, crebriorem tamen & paucioram, redderet; idque post-

F

hac,

hac, parentibus eum repetentibus redditus, integro mensis spatio continuaret. Exinde vero malum remedio haud ultra obedivit. Unde degenerationem partium jam præsentem, & ni caveretur, futuram demum irreparabilem metuens, obtuli hunc puerum, nunc quinquennem, secandum D. *Cambon*, id præfatus, quod metuerem ne forsitan malum jam incurabile esset; quod tamen, cum & tuta adeo & blanda ejus methodus esset, nihil nos periclitaremur, efficiundo, ut minus miser, tardiusque puer moreretur.

Igitur purgatione prægressa, & ventre etiam paucis ante operationem horis enemate eluto, D. *Cambon* operationem fecit 15. Dec. 1760. En autem methodum.

Operator in pulvinari mensæ imposito locat puerum, capite paulum elato, manuum carpis laqueo cifram arabicam 8 referente, cum tibiis molliter ligatis, & femoribus versus abdomen, sed extrorsum, utriusque ab apto famulo detentis; sic ut anus tangat marginem tabellæ. Inducit primo Itinerarium dictum, crena in dorso suo excavatum, & adhuc, pro more, ejusdem apice se facit de calculi præsentia certiores. Versus sinistrum latus tunc inclinat Itinerarium, quasi tuber ossis ischii sinistri quæsiturus. Deinde dat perito Assistenti illud sic firmatum, & dorso suo ad sinistram perinæi latus oblique appressum, manu firma tenendum. Notandum tamen os ischii præter propter tantum dirigere itinerarium: nam non diverso modo in sexu, sed in sexu virili etiam, tuber ischii nunc remotius, nunc propius, abest a media pube, vel coxyge.

Rebus sic præparatis digito quærit locum itinerarii, digitoque supra illud posito, operator facit cultello communi aperturam in elevatiore parte, donec cultello suo tangat nudam itinerarii crenam, & apice cultri in crena firmato, ducit cultrum per integumenta per aliquot lineas, oblique deorsum, quo viam paret sequenti instrumento.

Repo-



Reposito primo cultro, apprehendit cultrum, lithotomum occultum vocatum, qui prius adaptatus est ad angustiores, amplioresve sectionem, prout major, minorve calculus judicatur, aut junior est, adultiorve is, cui operatio fit. Numeri sunt notati in ambitu hexagoni manubrii illius instrumenti, quod in hoc cultro occulto vice vaginæ fungitur. Numeri hi designant, 5. lineas, 7. lineas, 9. lineas, 11. lineas, 15. lineas longitudinis faciendi vulneris. Manubrium Gladioli, in vagina reclusi, tunc adaptatur ad numerum requisitum, & notatum in manubrio instrumenti vaginalis.

Hoc facto, apex cultri lithotomi occulti per factam aperturam applicatur ad crenam itinerarii. Operator cum cultro lithotomo quærit apicem itinerarii, ubi crena ejus repagulum, sive aggerem habet, impedientem ne cultri lithotomi apex, aut exeat ultra, aut elabatur ex crena. Jam igitur habens suum punctum certitudinis, quod in vesica sit, eoque ejus, quo oportet loco, educit itinerarium ex vesica. Dirigit tunc cultrum lithotomum in vulnere, ut gibbum ejus dorsum ad inferiora spectet, & ut anterior cultri, seu potius ejusdem vaginæ, pars, suum punctum fixum ad os pubis habeat. Hæcque omnia ita dirigit, ut simul manubrium circiter horizontaliter ponatur. Et ubi primo totum cultrum ita tenet, ut dorsi acuties recta deorsum vertatur, tunc ad lineæ latitudinem circiter leniter inflectit manubrium superiore sua parte introrsum, versus medium pubis, ut culter scissurus sit in illa obliqua linea, in qua prior sectio viam jam monstrat, quæque sic oblique versus tuber Ischii dirigitur. Firmiter tunc manubrium majus seu vaginæ, tenens, premit manubrium gladioli, qui gladiolus, dum operator instrumentum ad se trahit, exacte tot linearum vulnus facit, quam antea definitum fuerat, scindendo sic ab interioribus extrorsum versus.

Via igitur ampla jam patet. Per illam forceps inducitur, digito in vulnus misso viam monstrante, vel in-

ducto Conductore, & calculus quæritur. A principio operationis, id est, ab inductione itinerarii, tria minuta elapsa erant, quartumque minutum calculi explevisset educatio, ni adeo friabilis is fuisset, ut in grumos faceretur. Hinc grumis quærendis, educendisque, adhuc quatuor minuta præterlabebantur. Cum vix se moveret tota operatione, vix clamaret infans, exemplum dedit insensibilitatis in parte sensibilissima, absque conclusione, quod vesica, muscoli, nervi, cutis, non sentiant. Pro more fomentum olei rosacei ventri imponebatur; sed venter unquam nec tumuit, nec doluit. Nulla facta est vulneris deligatio, ut esset liberum stillicidium urinæ, liber exitus relictorum forsitan ramentorum calculi. Suasi aliquoties fieri injectiones olei lini cum aq. hord. quo ea ramenta certius eximerentur. Emulsa paregorica dedi per plures dies. Suasu quoque Operatoris dedi quavis hora unc. iij. aq. hord. & omni trihorio totidem juris carnis sine pane, post diem tertium panadellam. Hæc in omnibus ægris nostris exacte observavimus, cum optimus Operator sæpe affereret sine multo admodum potu, & tali diluto nutrimento, non raro symptomata prava observari, quæ alioqui non observarentur. Si res pro votis cedat, sensim dantur post 8. diem carnes teneriores, & legumina.

Interim febris continua remittens perpetuo aderat: quæ cum die 10. adhuc continuaret, imo augesceret, communi consilio cortex peruvianus dabatur, cui ob vermium symptomata semen fantonici additum est. Et vermes quidem teretes tres excrevit, febrim autem jugiter habuit. Respiratio nunquam ipsi aut ante operationem, nisi ante tres menses in morbo, aut post operationem, impedita fuit; nec ulla unquam tussis. Verum per urethram non minxit unquam, nisi bis pauxillum, ex quo operatio facta fuit. Febre demum totus consumebatur, & quatuor ultimis vitæ diebus respirationem cum roncho habebat, anxius maxime erat, ita ut quovis momento  
alium



aliud corporis situm quæreret, tandem 60. ab operatione die obiit.

Cum Operatore, Chirurgo nostro, aliisque præsentibus, Anatomen feci. Cicatrix formata vulneris sex septem lineas æquabat; punctulum modo in cicatrice apertum erat, per quod jure fuerat urinæ stillicidium. Patuit tunc evidenter factam esse sectionem per totum vesicæ collum, ita ut superior ejus pars leviter tangeret vesicæ cavum, inferior pars principium urethræ prope collum. Sit mihi fas nunc in supino cadavere secundum situm naturalem loqui, & inferiorem vocare urethram, superiorem vesicam: quamquam paullo ante inverso ordine has partes nominaverim, dum jacente ægro in mensa, femoribus ad abdomen reflexis, operationem explicarem.

Igitur cultellus ordinarius facit sectionem supra crenam itinerarii in principio urethræ, principioque colli vesicæ. Culter lithotomus in hanc aperturam inductus, perscindit collum totum, & in hoc puero, cum culter lithotomus ad vulnus septem modo linearum adaptus esset, portionem duntaxat parvam vesicæ. Porro dum idem culter lithotomus in vesica positus, ab interioribus exteriora versus omnia æquabiliter perscindit, simul æquabilissime transcindit totam Prostata.

In vesica porro ne grumulus quidem calculi supererat. Quia vero impossibile fuit in operatione omne grumosum simul & semel cochleari auferre, fateri oportet hanc methodum, qua post sectionem vulnus sibi dimittatur, ea saltem de causa laudandam esse, quod, libero per vulnus urinæ effluxu, quævis calculi diffractiamenta, imo & alter, si affuerit, calculus, commode, integreque, exeant. Eandemque ob causam repetitas in vesicam injectiones utiles esse.

Obliquitas sectionis, prout exposita est, si in cadavere examinatur, evitat exacte Rectum Intestinum, modo id non turgat. Hinc recte cura habenda ante operationem

rationem, ut illud purgatione, enematibusque, a foecibus & flatibus rite expurgatum, adeoque ut flaccidum sit. Alioqui fatendum est, hac secandi norma Rectum rarissimo casu posse lædi. Cum sæpius ex Nosocomio Civico nobis cadavera compararemus, ut in iisdem hanc methodum exercentes, videremus ejusdem effectus, semel nobis hicce casus contigit. *Franconiana* methodo vesicam supra pubem incidentes, calculum duos pollices in majori, unum in minori diametro habentem, eidem imposuimus, vulnus consuimus. Operationem cultro Lithotomo occulto secundum exactas regulas perfecimus. Erat corpus adulti, & magnus calculus: hinc gladiolum aptavimus ad 15. lineas. At minus foramen fuit, quam ut tantæ molis calculus, una cum forcipe transfiret. Apertura cultello tribus lineis producta, lapis educebatur. Curatissime tunc effectum sectionis per omnes discissas partes examinantes, invenimus Rectum, quod antea evacuatum non esset, perscissum fuisse. Quare Recti Intestini probe evacuandi cura religiosissime semper est observanda. Equidem asseverabat operator id se necdum vidisse unquam, qui hanc operationem tam in mortuis, quam in vivis, octuagesies & quater jam peregisset. Attamen quod nobis in hoc cadavere contigit, contingere pluries potest, si cura evacuandi negligatur.

Iteratis cadaverum experimentis, & tunc, & postea sæpius, didicimus eos, qui in operatione femora dirigant, multum posse ad faciliorem, difficilioremque calculi educationem facere. Si crus sic gubernent, ut genu ducatur multum extrorsum, spatium inter tuber ischii & ossa pubis, angustatur; sin vero genu introrsum magis ducatur, hoc spatium ampliatur. Observatio hæc videtur attentionem in operando mereri.

Vesica urinaria tam parva erat, ut duarum unciarum calculum vix potuisset comprehendere, crassitudinem ceterum trium linearum fere ubique habebat, unde etiam compactissima fuit. Similes calculosorum vesicas prioribus



Tomis plures descripti. Nunquid dudum tam parva ac crassa vesica fuit? aut demum post operationem sic reddita est? Utrique sententiæ militant rationes. Ita eam dudum fuisse, ut negemus, operatio videtur suadere, in qua varia instrumenta vix moveri potuisse apparet, si adeo & contracta, & præ crassitie vix dilatanda vesica fuisset. Attamen cum vesica calculum unciarum duarum fere potuerit continere, parvusque adeo hic calculus fuerit, ut omnia collecta ramenta pondus 71. gran. non excederent, spatium utique ad admittendum Itinerarium, & cultrum Lithotomum, iisque eductis forcipem, qui certe leviter modo intravit, adfuisse videtur. Potuit ergo vesica fuisse tam parva ante operationem; sed reapse tam parvam, contractamque eandem ante operationem jam fuisse, arguunt sequentia. 1. Quod calculi sectio non soleat sic reddere vesicam. 2. Quod vesicas ita contractissimas invenerimus in calculosis non sectis. 3. Quod in morbo ante tres menses in Nosocomio observato, commode quidem puer, sed exigua tamen copia, urinam redderet, 4. Quod injectio post operationem illico facta, copię licet paucissimæ, ex parvo siphunculo, & tunc, & semper, ac tutum exsiliret. Unde si puer in vivis mansisset, habuisset profecto semper id vitium, ut non diu retinuisset urinam, etiamsi externum vulnus probe claudi potuisset. Sed quoque vesica adeo & contracta, & crassa, inepta videtur fuisse ad bonam cicatricem formandam; unde etiam videtur perpetuo fistulosus futurus fuisse, si vixisset.

Ad reliquam Anatomen quod spectat, erant glandulæ mesenterii numerosissimæ, durissimæ. Ingens Paucreas unus scirrhus. Hepar cum multis tuberculis siccum ac durum. Parvis scirrhis Lien plenus. Pulmo dexter non nisi unus scirrhus; sinister in quadam mollitudine innumeros scirrhos gessit. Ad Trachææ dichotomiam glandulæ scirrhosæ castaneæ magnitudinis. Itidem Thy-mus. Exsangue & macilentissimum corpus universum.

Ut ex Anamnesi constitit, tussi ac febre ante operationem non laboravit, nisi quando per paucos dies ante tres menses ægrotaverat. Inter operationem pueri torositatem omnes mirabamur. Ergo spatium 60. dierum, quibus ab operatione vixit, degeneratio hæc videtur probabiliter nata. Utique in sano etiam corpore Febris diuturnior omnia solida, fluidaque pervertendo, letales facit obstructions, scirrhus, &c. An vesicæ vulnus, ob callositatem in integrum incurabile, ab acrimonia exstillantis urinæ alcalinæ continuo irritatum? imo an acris hæc urina ad cellulosa vulneris labia resorpta, hanc non potuerit generare febrim? maxime primo mense, quando magna erant labia vulneris?

## HISTORIA II.

Puer decennis in *Laxemburgo* calculi symptomatibus a quadriennio laboraverat. Præstantissimus *Lauter* loci Medicus, quem optimæ spei virum immatura mors hisce diebus sustulit, Uvam Ursi ipsi dedit. Negligentissime ea ager usus, vix levamen inde percepit. 22. Dec. 1760. D. *Cambon* sua methodo secuit illum. Tria minuta effluxere a principio, usque ad forcipis inductionem. Verum calculus tum levis (pondus enim 52. gran. modo fuit) & echinatus, hirtus innumeris pinnis 2. 3. lineas longis, vix forcipe tenendus, undecim minutorum operationem fecit. Ejulavit, & vociferatus est hicce eo vehementius, quo minus prior. Sed & vociferabatur, jam ad inductionem Itinerarii, ut vix quatuor hominibus esset continendus. Primis quatuor ab operatione horis dolores acerbos conquerebatur, exinde vero semper se doloris cujuscumque expertem esse testabatur. Venter nunquam intumuit, non induruit, non doluit. Tota ejus cura fuit, ut prioris. 25. Dec. nonnihil sanguinis vulnere, urethra, & naribus simul effluxit, at brevi siluit. Optime jugiter habuit, optime dormivit, appetiit, egescit.



fit. Vulnus diu apertum mansit; licet operator a 3. Jan. 1761. suasisset puerum, vulnere manu clauso ad mingendum per urethram adjuvare; deinde finiente Jan. & ineunte Febr. labia vulneris lapide infernali tangi, puerumque ligatis ad se femoribus sedere jussisset, Febr. 6. demum clausum fuit. Toto autem tempore, quo ante & post clausum vulnus minxit, urinam semper pallidam, ac foetentem, sæpe opacam, sæpe simul cum glutine calculosorum onustam, reddidit. Tandem gluten, & foetor urinæ defuit, sed copiam ejus non nisi unc. j. simul emisit. Triduo Diarrhœam passus, usu Rhei cum Myrobalano, & vespertina Theriaca, convaluit. 21. Febr. perfecte sanus ac torosus puer domum rediit, & perfecte etiamnum valet.

## HISTORIA III.

*Ignatius Stigler* 10. ann. ex quo meminit, semper plus minus in mictu doluit. Septem anni nunc sunt, quod Parentes ad auctos dolores ipsi aquam Petroselini longo tempore bibendam dederint, quod primo aliquid, postmodum nihil attulit opis. Exinde in Orphanotrophio susceptus, integroque inibi moratus quinquennio, delatus est ad Nosocomium *S. Marci*, curandus. Vim uvæ ursi frustra ibidem spatio 9. mensium expertus est. Tandem illum a me petitem, ad nostrum Nosocomium optimus *Reichberger* misit, mox ineunte hoc, quo vivimus anno.

Secundum hunc *D. Cambon* proposui, curam licet veritus sive incertam, sive inutilem. Quippe augmentum diuturni mali mortem demum illaturum; hinc methodum ejus blandum posse institui, cum ex ejusdem frequenti experientia mortis periculum non augeatur, nisi forte in rariore casu, quemadmodum ille Historiæ primæ: cæterum inde mortem fere præsentem procrastinari, hominumque tormenta tolli, plurimumve mitigari. Non juvantem autem operationem non methodo, sed degeneribus oportere

tere tribui partibus. Annuit igitur ille, & 7. Jan. 1761. illum spatio quatuor minutorum perfectissime secuit. Suspicionem majoris calculi culter Lithotomus ad vulnus undecim linearum adaptabatur. Verum neque hoc sufficiens, ad 2. 3. lineas inter extractionem calculi ultra dilatatum est. Calculus fuit ponderis unc. 2. & 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. dragm.

Nullus quidem tumor, aut dolor ventris, sed febris continua mox post operationem adfuit; impedita valde deglutitione comitata, quæ demum die 5. critice soluta per Diarrhæam. Octiduo integro bene habuit. Sequuta tunc est febris continua remittens, vespere semper ingravescens, quam demum Cortice oportuit moderari. Post 18. ab operatione diem hæc febris cessavit. Cum vulnus crudissimum maneret, continuavi usum Corticis; ea spe ut, quemadmodum alibi, ita quoque hic, bonam suppurationem in vulnere generaret. At incassum. Nec tamen destiti a Cortice, ne urina putridissima, in plicis labiorum vulneris stagnans, atque resorpta, febrim novam generaret, & ut contra hanc putredinem sanguinem condirem.

Nihilominus, bene valente puero, vulnus haviit semper, & fistulam in perinæo produxit; quæ penitus perfecta mensis dein spatio perfecte curata est. Superest autem semper parva in vulnere apertura, per quam urina perpetuo extillat. Scarificationes, pulveres Sarcotici, lapis infernalis, fasciis femora juncta, quæ auxilia in Hist. 2. juverant, hic frustra fuerunt; tandem vero in-eunte Sept. ulcus claudi cepit, jamque Septimana sexta, qua hæc scribo, clausum manet.

## HISTORIA IV.

Joannes Georgius Sick 14. annorum, a Parentibus rescit, se ab incunabulis minxisse arenas. Ipse quoque ab 8. vel 9. retro annis meminit doloris lumborum, magni.



gnique in mejendo ardoris & doloris. Calculus detectus est. Jan. 12. idem Operator eum spatio septem minutorum calculo secuit. Passim observavimus ad tertium, quartumve minutum forcipem jam in vesica esse, reliquum temporis quærendo, tenendoque calculo, impendi. Calculus parvus, oblongus, asper, granulofus, ponderis granorum 50.

Vix per horam doluit, febre caruit, ventrem nec durum, nec dolentem unquam habuit. Ab ipso die operationis per urethram minxit, primo libram sanguinis, sequentibus diebus sanguinem dilutum, octavo die urinam sine ullo sanguine, cum albo sedimine, & rubra, aut flava arena, nunquam vero mucum calculosorum. Intra 14. dies vulnus clausum fuit. Febr. 7. sanus repetivit domum.

## HISTORIA V.

*Carolus Heigner* 20. annos natus, accessit me 3. Jan. 1761. narrans se, ex quo meminerit, cum ardore & dolore minxisse, frequenter veras habuisse strangurias, ab intensiore motu corporis urinas reddidisse rubras, cæterum pallidas, ac glutinosas. Explorando calculum deteximus. Quamvis in morbo fere congenito vix quid a medicamentis sperarem, animus tamen fuit, quid uva præstaret, explorare. Ad irrita 14. dierum conamina, juvenem in Nosocomium demum recepi. Jan. 19. Operator spatio trium minutorum integram perfecit operationem. Calculus ovalis fuit, planus, ponderis unc.  $1\frac{1}{2}$ . dr.

$1\frac{1}{2}$ . Hæmorrhagia magna successit. Conus ex Agarico formatus vulnere immissus & affixus, opium largiter datum, hæmorrhagiam sensim sic stiterunt, ut intra 24. horas plane sileret, nec ad remotum post 48. horas apparatus rediret. Die 23. Jan. cum dolore expressit vulne-

nere fragmenta duo, quæ in operatione soluta a calculo fuerant. Minxitque per urethram unc. 2. urinæ, gluten tenacissimum, foetidissimumque habentis. Eodem hoc die, & sequentibus, de molesto admodum in inguine dolore conqueritur, quem quidem ante operationem adfuisse, jam vero multo validiorem esse, testatur. Parva in inguine glandula indurata adparuit. Jan. 25. plura ramenta vulnere emisit, veluti calculi externa putamina, cum dolore, & tantilla hæmorrhagia. Postea pectus tussicula cepit quati; sed dato decocto pectorali tussis cessit. Incipit a 29. Jan. libras 2. urinæ per urethram mittere, minus foetidam, minus glutinosam. Prima Febr. tumor ac dolor in inferiore scroti parte, a latere Sectionis. altera die magna inflammatio. Cataplasma adhibetur. 3. Febr. Abscessus maturus adparet. Aperitur. Effluit pus per decem dies. 14. Febr. totum curatum est. Urina copiosa tunc urethra prodiit, vix gluten, nisi diu stetitisset, habens. Vulnus ad 20. ab operatione diem clausum fuit. 21. Febr. sanus abivit, seque postea bene valentem aliquoties exhibuit.

## HISTORIA VI.

*Mathias Kolb* 57. annor. futor, primum adiit me 21. Jul. 1760. Stranguriose minxerat a 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. annis, subinde sanguinem excreverat, albumque sabulosum, ac tenax admodum sedimentum; quibus tenesmi, atque prolapsus intestini adjunxerant se se. Calculum explorando non invenimus. Uva ursi malum tolerabile gessit, usque ad finem Octobris. Ex eo ultra non juvit. Magnum atque scabrum nunc deteximus calculum. Usque ad 7. Jan. 1761. nunc cum levamine, nunc sine eo, varia assumpsit: Uvam ursi in decocto, in pulvere, Emulsa, Mucagines, Opium. Tunc, consilio cujusdam cepit uti semicochleare

Ra-



Raphani hortensis rasi, misti cum oleo-olivarum, quotidie. Triduo hoc usus, convenit me, solamen narraturus. Continueret, suasi. Binorum mensium spatio tolerabiliter inde se habens, demum in priores incidit miseriae, vires amisit, ac facie ex pallido lividus fiebat. Idem hic vir a 22. retro annis cæcas ut vocant hemorrhoidas passus, ab ultimo biennio habuit easdem fluentes, hocque jam tempore a continuis vesicæ tenesmis ferre perpetuas. Conclufi ex omnibus, quod toties Auditoribus de eo monueram, systema urinosum pessime in illo degenerasse a statu sano, & demum lenta morte consumendum videri; unicum, sed anceps admodum, superesse remedium, sectionem. Hanc methodo enarrata, peractam vix quid habere periculi, imo potius dare spem palliandi egregiam, quemadmodum casus docuerat. His sub conditionibus operationem *D. Cambon* proposui. 24. Martii calculum extraxit 4. minutorum spatio, Lithotomi gladiolo ad 15. gradum adaptato. Calculus, circularis, planus, gibbus ab una parte, ab altera leviter excavatus, ruber, granulofus, pondere unc. j. & scrup. ij. Sub operatione hæmorrhagia, intruso cono Agarici mox quidem cessavit, sed bihorio post rediit copiosa. Arteriam intercipere animus erat; at vero invenire eam impossibile fuit. An quod nimis interna? Mictus tum urinæ, tum sanguinis, æque per urethram, quam per vulnus, eo, ac sequenti die animadversus, forte id innueret. Fecimus proinde quod potuimus, & tandem intruso, ac bene affirmato, vulnere cono Agarici, & liberaliter per epicrasim dato opio, hæmorrhagiam brevi stitimus, eamque penitus curatam esse, dum quarto die propter factorem immanem urinæ apparatus solvebatur, læti vidimus. Verum quod dolebamus, jam per vulnus omnis, nulla per urethram urina fluxit. Unde quoque inflammatio, & continua excoriatio scroti, interfeminei, nariumque, quamcumque curam diu, noctuque nos, ægrorumque adhiberent custodes. Hinc nascentibus  
ubi-

ubique gangrænis oportuit continuo mederi. Diathesis ad calculum in hoc homine terribilis! gluten putridissimum ad plicas, angulosque vulneris crudi adhærens, spatio nocturno in veros abiverat lapillos; quemadmodum etiam collectum gluten in charta emporctica in crassam abibat, ac calcaream materiem. Cum demum averruncandæ Gangrænæ ultra non essemus, Corticem peruvianum dedimus, malum superavimus, & diu post curationem continuavimus, cum hoc remedium tam belle ferret, eoque caco-chymiam fædam pulchre superaret. Cum cortice fiebant quoque detergentes in vesicam iniectiones. Labiis vulneris Digestivum, aut Mel rosaceum, cortice peruviano mista, applicabantur. Præter varia autem unguenta ad vicinarum partium Gangrænam præcavendam, plurimum profuit lotio ex aq. Samb. libr. j. & una uncia aceti Lithargyrii. Tandem post continuas curas & sollicitudines nostras vulnus minui cepit, Urina putridissima per urethram reddi, Maji 4. vulnus coire vesicæ, & paucis postea diebus vulnus integrum. Domum rediit 14. Maji. Sæpius posthæc me convenit, corticem repetiturus, quod inde adeo mirifice se refici & roborari perciperet, sanitatem sat bonam testatus, nisi quod crebro cogeretur mingere. Stranguriam postea conquerenti uvam ursi dedi.

Palliatio mali sane tam pulchra est, & fortunata, quam potuisset unquam expectari. Præcipue si consideremus etiam fluentes hæmorrhoidas, Rectique prolapsum, nunc quoque non amplius observari.

## HISTORIA VII.

*Sebastianus Niedermayer*, quintum annum agens, die 28. Martii in Nosocomium illatus est. Narraverunt parentes, hunc suum filium signa in meiendo doloris ab ipsa nativitate dedisse, deinde biennem illum, pisi magnitudine minxisse calculum; exinde duobus circiter annis liberum fuisse a quocunque symptomate, verum jam ab  
anni



anni spatio se tam misere habere, ut urinam redderet uno tempore sanguineam, alio tempore plane glutinosam, ac putridissimam, tandemque a continuis mejendi conatibus, & tenesmis, Intestini Recti pateretur ab octiduo prolapsum. Examine constitit calculum adesse.

Cum optimus *Cambon* abitum meditaretur, petivi, ut liceret Chirurgis nostris, ejusdem sub auspicio, calculum secare. Quod ille, pro eo, quo est, candore, mox mihi annuit. *D. Leber* hunc puerum perfecte secuit. Calculus quidem magnus erat, sed pumicosissimus, intra forcipem grumescens. Collecta fragmenta una cum corpore calculi septem scrup. pondere æquabant.

Puer a prima hora operationis nec doluit, nec ægravavit, optime appetivit, tota die in lecto lusit, urinam brevi per urethram misit, quæ primo glutine multo, eoque foetente, deinde pauco, prodibat. Vulnus 20. die clausum est. Die 25. sanus suis tradebatur parentibus.

## HISTORIA VIII.

*N. Osfeld* anno 1760. Maji 26. in nostro Nosocomio feliciter calculum sectus fuerat a *D. Leber*; prout tota sectionis historia Tomo 5. a pag. 75. & seq. data est. Abundantia muci & puris perpetua urinarum, Nephritica pueri dispositio, me coegerunt, ut 4. mensibus illi, in Nosocomio servato, Uvam Ursi darem. Tandem cum perfecte ab hisce liber Patri redderetur, adhuc monui, eo medicamento uteretur perpetuo. Hinc per omnia sanus vixit usque ad Martium 1761. quando post neglectum medicamenti hujus denuo pati inciperet, peteretque eosdem sibi pulveres dari. Incassum sumsit. Aprilis 10. cathetere eum explorantes, nihil deteximus præ summa vesicæ constrictione: Qua altero die laxata, calculum invenimus. Aprilis 13. *D. Homburg* Chirurgus SS. MM. sub auspiciis *D. Cambon* sectionem egregie fecit. Cicatrix antiqua sponte viam monstrabat. Iterum  
hic

hic diffiliens calculus cum collectis Grumis grana 71. pependit. Puer a fine primi diei optime se habuit, nullum eorum symptomatum passus, quæ in prima Sectione eum perpeffum esse, Tomo V. narravi. Pro more vesicam quotidie eluimus. Cumque jam ab octiduo nihil grumorum ultra exiret, & injectionis materies redeuns puram doceret vesicam, tentare Chirurgus voluit, an sicco plumaceolo, emplastroque desuper, clausum, curatumque demum vulnus, nos non eximeret ab ærumnis, quas in ægro N. 2. N. 3. & maxime N. 6. ob calculosam diathesin antiquam observaveramus. Res pro votis successit. Vulnus 13. die coaluit. Nulla symptomata superfuere.

Notari meretur in priore sectione vulnus ilico clausum fuisse plumaceolo & emplastro, & demum 21. die coaluisse; nunc vero 5. die ab imposito emplastro. Interim Curatus denuo lumborum conqueritur dolorem.

Hinc, quia metus erat, ne brevi novus ex Rene descenderet calculus, dedi Uvam Ursi, sed mense Julio rediit ad nos, præsentis in vesica calculi questurus symptomata. Examine facto calculus in vesica deprehensus est 18. Augusti. Verum aiebat puer, quod nunquam antea, se ab omni prorsum lumborum dolore nunc liberum esse. Quia nunc spes major integræ curæ affulgebat, die Aug. 21. purgante, & 22. enemate alvus ipsi eluta est, & eodem die Chirurgus noster eum methodo eadem calculo liberavit. Trium minutorum spatio omnia perfecisset, sed primo retardabat calculi fragmentum cochleari detectum, secundo alter calculus. Unde decem minuta infumta sunt. Via jam bis aperta proderat inventione sua facili, oberat valde durior cicatrice. Calculus prior rubellus dr. j. & gr. 4. pependit; alter 52. grana.

Per octo horas ab operatione doluit, postea autem nox tranquilla successit. Sequentie die modica febris duntaxat, & quisquam vulneris ardor adfuit, ceterum bene se habuit, & appetitum testatus est. A die tertia nulla amplius febris. Die 5. & 6. multa urina per urethram  
red-



reddita est, quæ glutinis quid perpetuo habebat; tandem vero gluten fere defecit. Die 8. cum omnia in vesica nitida esse injectio testaretur, vulnus emplastro clausum est. Die 12. id consolidatum fuit, & puer domum potuit repetere.

## HISTORIA IX.

*Franciscus Domijanitsch* 9. annos & 4. menses natus, 21. Apr. 1761. allatus est nobis, a biennio stranguriosus, postquam Calculum Pisi magnitudinis minxisset. Calculum eum nunc habere cathetere mox deprehendimus. Cum *D. Cambon* cum *Sua Regia Celsitudine* profectus in *Belgium* esset, *D. Leber* hunc puerum eadem methodo felicissime secuit, spatio 5. minutorum; licet calculum longitudine primo arreptum, dimittere, latitudinique deinde capiendum, quærere deberet. Ponderis fuit unc.  $\frac{1}{2}$ . & gr. 45. Febricitavit puer parumper, sudavitque prima die, noctem optimam habuit, sequenti die poterat sanus dici; vesicam Chirurgus bis die probe eluit, & quarto die plumaceolo sicco, & emplastro, textit; unde factum est, ut octava post sectionem die penitus clausum esset. Pallida quidem toto eo tempore urina fuit, purulentique quidquam sæpe habuit, nunquam vero gluten calculosorum. Intra duas septimanas potuit abire.

## HISTORIA X.

*Simon Senis* annor. 4., totidemque mensium, 27. Aprilis 1761. adducitur. Biennium erat; quod cum dolore mingere cepisset; annus, quod tolerabiliter habuisset. Quippe anno abhinc elapso Mater eum ad ædes *D. Leber* adduxerat, qui calculum explorans, invenit illum in vesicæ sphinctere, principioque hærentem urethræ; catheteris autem apice repulit in vesicam. Matri

propofuit fectionem, fed cum repulfo calculo puer nulla calculi figna fere unquam haberet, rifit Mater poft hac Chirurghi confilium. Jam vero 27. Aprilis eum ad Nofocomium duxit, utpote quem ab octiduo antiquæ vexarent ærumnæ.

Calculo invento, 29. April. fectus eft confueta methodo, ea tantum differentia, ut primo vulnere facto jam non culter occultus adhiberetur, fed prior culter integram perficeret fectionem, perinde atque in communi fectione laterali fit. Calculus granorum 35. fpatio feptem modo minutorum exfectus eft. Aft plus inde, quam a cultro occulto, videtur perpeffus. Dolor, inflatum fcrotum, inflammatumque, febris magna, valida deinde fcroti fuppuratio, eum octiduo vexarunt. Eo vero elapfo cito convaluit, & vulnus tunc linteo carpto, & emplafiro, tegi ceptum, quatruiduo poft ea consolidatum fuit. Pallida quidem, fed vix glutinofa urina. Poft 3. feptimanas abivit.

§. III Qui attenta mente confiderat enarratas hæc undecim fectiones, is legendo *Difertationem Gallicam fupra laudatam*, quæ hinc vituperat, illinc laudat, *Fratriſ Cosmi* methodum, haud ultra, arbitror, hæſitabit, an illam fit laudaturus. Equidem poterat exemplorum raritas ante 10. annos lectores fluctuantes reddere; præſens vero eorundem crebritas, tum egregiæ *Cambon* experientia, tum frequenti noſtri Noſocomii exemplo demonſtrata, omnem hæſitantem animam firmat, & de præſtantia hujus methodi præ omnibus aliis ſecandi modis, abunde convincit. Si enim ſine præjudicio omnes confideremus effectus aliorum methodorum, adeoque etiam *ultima correctæ lateralis*, eoſque cum effectibus hujusce conferamus, vix ultra exiſtendum quempiam credimus, qui hanc non præferat illis, qui hanc non ſemper adhibeat.

1. Enim præparatio brevis eſt. Haud inſumimus menſes ad humores immutandos, ad reparanda ſolida. Hæc namque vitia, manente cauſa, non curantur, imo temporis lapſu pejorantur; cauſa autem ablata, vel ceſſant,



sant, si cura integra est, vel saltem mitigantur, si vita brevi alioquin collapsura, nunc prolongetur. Plethora vix unquam hic venæ sectionem suadet, raro quippe præsens: Remedium purgans, & unum, alterumve enema, totam præparationem faciunt.

2. Breve, quo fit, tempus eam commendat cum maxime. In quacunque methodo remoratur operationem calculi friabilitas; in omni methodo calculum extrahere difficile est, quando oblongioris figuræ ille, juxta longitudinem arripitur; quando nimia levitate vix uno loco consistit; quando figura hirta ac echinea, ut in Hist. 2., vix se finit capi; quando major est, quam ut per factum vulnus educatur; quando ad fundum trianguli, quem forcipes faciunt, dilabens, prehensusque, apices forficum ita a se mutuo dimoveat, ut educi tanta nequeant latitudine; denique quando hæmorrhagia notabilior contigit. Sed hæc ut communia omnibus methodis, nihil contra nostram faciunt. Unde hisce exceptis, certum est hanc methodum Itinerario, Cultello, Lithotomo occulto, Conductore, & Forcipe, 3. 4. 5. minorum spatio passim absolvi. Quin & ipsa infortunia nonnisi duplum exegisse spatium enarratæ convicere historiæ. Certe vel ideo sua se brevitate hæc methodus commendat, & ad illam amplectendam cogit, quia 1. vitæ, commodique, mortaliū arbitri non sumus, sed ministri, & promotores, & conservatores, adeoque conscientia & humanitate constringimur, ad dolores illorum tum mitigandos, tum abbreviandos. 2. Quia quod & gravius & diutius hi dolent, eo graviores febres, eo tetriora symptomata, metuenda habemus. Ita ut si hæc methodus aliis modo par foret, dictas ob causas ceteris esset præferenda.

3. Nec in suis *D. Cambon*, nec nos in nostris, unquam vel minimum ventris dolorem, duritiem, tumorem, invenimus; quod tamen adeo frequens in aliis methodis est, & post inflammationem Vesicæ, Vulneris, Integumentorum, Musculorum, morte haud raro terminatur.

4. Febrim pauci notabilem, aut durabilem, habuere; iique modo, qui non simpliciter calculo, sed degenerare viscerum fabrica laborabant. Ceterum per aliquot horas levissime duntaxat febricitarunt.

5. Bis in hac Methodo hæmorrhagiam habuimus; verum 1. nulla methodus est, maxime lateralis, in qua hæc non contingat aliquando. 2. Levi negotio eandem stitimus: laudandus iterum hic Agaricus.

6. In his, qui simpliciter calculo laborarunt, urina cito, copioseque, per urethram fluxit 1. 2. 3. die, vulnere quamvis aperto.

7. Methodus vulnus apertum servandi præstantissima videtur, ne quid aut calculosi, aut grumosi sanguinis, remaneat in vesica, quod novo calculo basim præstaret. Juvenis Hist. 5. sic per vices calculi veluti putamina vulnere expulit, alioqui permanfura. Et vesica illius qui N. 1. sectus, ac mortuus est, tam nitida a morte reperta est, ut quamvis calculus in illa penitus diffractus fuisset, ne minimum tamen ejusdem superesset.

8. Posse nihilominus vulnus, quando per octiduum vesica quotidie probe eluta est, adeoque ita expurgata, ut heterogenei nihil superesse possit, sicco plumaceolo, & emplastro tegi; tum ut eo citius omnis per urethram urina reddatur, tum ut vulnus maturius coeat, hominesque citius convalescant.

9. Nunquam vidimus cannula opus fuisse, qua vulnere immissa urina transiret. Effluxit quippe illa in nostris jugiter sine cannula. Equidem acris admodum urina, assiduoque his effluens gluten, metum quibusdam incutere callosorum labiorum possunt; sed an continua cannulae frictio idem quoque non faciat? Urina acris hæmorrhagiæ facit formidinem; at vero an mechanica cannulae frictio eidem producendæ non est apta nata? Utique quod in his, quibus totus morbus calculus esset, nec callositas, neque post primum diem animadversa hæmorrhagia fuerit, modo labia vulneris melle rosaceo sæpe inungerentur, cannula in illis opus non esse judicavimus.



10. Ligatura mollis genuum, ne divaricent, in omnibus nostris adhibita, urinæ fluxum, ac ramentorum calculi exitum, nunquam impedivit: ut merito vanus eorum metus sit, qui id ligatis impediri cruribus suspicati sint.

11. Non modo instrumentorum paucitas, temporisque brevitates, tormenta operationis abbreviant, sed etiam eadem reddunt longe mitiora. Culter lithotomus occultus bene inductus, & ad os pubis, ut ad punctum fixum affirmatus, dum uno, eodemque momento incipit, perfringere cervicem vesicæ, vesicæ ipsius partem, prostaticam, musculum transversalem penis, seu transversum Perinæi, pinguedinem, cutem, epidermidem, tam æquabiliter, & haud interrupte, omnia transfrangit, ut totum vulnus duo æquabilissima plana habeat, & nullam fibram trahat, dilaceretve. Præstat sane hac sola de causa omnibus aliis instrumentis, ut ut subtiliter, ingenioseque, a magnis in arte viris, excogitatis. Præstat experimento in hist. 10. instituto, ut ibidem patuit. Quippe effectus docent vulnus (ceteris paribus,) sufficienter ampliatur, citius curari, minus doloris in operatione, minus symptomatum post eandem creare, quam vulnera, quæ quod exiliora sint, magnam extensionem, ac dilacerationem pati debent: id quod in *apparatu magno ac laterali* passim observatur, dum calculus utcunque major est. Et licet in *apparatu parvo*, idque in pueris, calculus facile in Perinæo secatur, dum ille digitis in Intestino Recto impositis ad interfemineum adprimitur; tamen quia nonnunquam asperior calculus (ut v. g. ille Hist. 2.) inæqualem ac dilacerantem Integumentorum ac Vesicæ sectionem facit, unde prava symptomata nasci debent; quia denique blanda, tutaque per sese *Fratri Cosmi Methodus*, hisce exempta incommodis est, erit etiam in pueris præferenda *apparatu parvo*, seu dictæ *Celsi methodo*.

12. Pag. 85. monui rarissimi casus Intestini Recti, Lithotomo occulto transfracti, quo infortunio adversa-

rii hanc methodum criminantur. Verum id nobis in cadavere contingebat, haud elutis primo Intestinis, intrusoque in vesicam supra pubem tantæ molis silice, ut vulnus 15. linearum adhuc dilatandum fuerit. Quotiescunque autem sive in vivis, sive in cadaveribus, cum ista præcautione, hanc operationem fecimus, nunquam id contigit nobis. Ut proinde tot experimentis suffulti audacter pronuntiemus inanem eorum formidinem esse, qui instrumento hoc aut non usi, aut perperam usi, illud veluti Rectum facile perscindens, dum hoc proba elutione flaccescit, criminati sunt.

13. In moderandis in tabula secandorum cruribus, notabilis observatio, quam in cadaveribus didicimus, prodesse potest, prout pag. 86. enarrata habetur. Quod in cadavere, hoc in nobis possumus examinare dum lecto jacentes, femore in ventrem reflexo, varios edimus motus: experimur mox utcumque angustius esse spatium inter pubem & tuber ischii, genu multum extrorsum flexo; spatium vero mox latefcere utcumque, dum genu versus umbilicum ducitur.

14. Positio horizontalis Calculosorum, cum exiguo tantum sub capite pulvinari, dum secantur, semiverticali videtur præferenda; quamvis hæc, præsertim in *apparatu magno*, eligitur, & a pluribus in *sectione laterali*, commendatur. Moles intestinorum *magis* in spinam, *minus* in peritonæi expansionem, quæ vesicam tegit, incumbere videtur: quin & splenis, ventriculi, jecorisque pondus, minus in intestina premit. Hinc eandem positionem in nostris perpetuo servavimus.

15. Errorem fateri dabeo, in quo olim versabar. Tom. 4. Cap. 7. pag. 131. Intestini Recti prolapsus, veluti unam de causis, sectionem procrastinantibus, considerabam, notabam; at vero jam ægrorum frequentia me convicit, etiam graves Intestini prolapsus tenesmis a calculo excitatis deberi, impedimento in sectione non esse;educta autem calculo brevi cessare, & nulla ferme auxilio



lio curari, quo tempore ægri propter sectionem jacent, & blande nutriti, alternoque, aut tertio die enemate expurgati, fœces duras minime coacervant.

16. Nunquam approbare potuimus scrupulosam plurimorum tum Autorum, tum Operatorum timiditatem, qua, calculo olim quidem detecto, jam vero dum itinerarium immittitur, neutiquam percepto, operationem conficere nolunt. Si enim ab una parte frequentem illam experientiam consideremus, qua uno die invenitur, altero non invenitur, calculus; si ab altera parte noscamus eundem semel bene, manifestoque, repertum, non posse aut deliquescere, aut aliorsum aufugere; non est cur totam hanc lugubrem scenam repetere velimus, ægrum minus forsitan dispositum, ad subeundam sectionem, postliminio inventuri. Profecto semel de eo certi, operationem non distulimus, etiamsi illum paulo ante non perciperemus.

Equidem, fateor, contingere nobis posset, ut calculus perceptus quidem olim, sed vel postica parte in uretere detentus (ut casus habet *Tom.3. Cap.4. pag. 137.*) vel ex sacculo privato tantum leviter eminens, suaeque mole majore, sic illo in sacco inclusus, ut extrahi inde non posset; qualis viri militaris calculus, de quo *Tom.3. Cap.4. pag. 137.* sed quia id antea certo sciri nequit, & quia si calculus in operatione percipitur, operatio semper instituitur, hinc observationes illæ extraordinariæ nihil hic immutare possunt. Frequenti exploratione didicimus esse calculos liberos, qui quotiescumque explorantur, eodem fere loco perpetuo detegantur; esse alios pariter liberos, qui nunc altius, nunc depressius locati deprehendantur. Ut postremi hi, ita calculi firmiter adhærentes, in expansiore vesica remotius, in contractiore propius, detegantur, sine ullo signo adhæSIONem testante. Ergo, ut dixi, regula certa id detegendi non adest, & habet hic casus extraordinarius eandem quavis in methodo difficultatem.

17. Urinam Calculosorum pallidam esse passim observavimus. An id ab alcali calculi? Utique urinæ sanæ acida fossilia rubedinem conciliant; sal, aut liquor, alcalinus, pallorem: Dixi *sanæ urinæ*: nam si homo prius quædam medicamenta sumserit, potest color ab affusis ad urinam rebus mire variari. Sed calculo sectione educto, in omnibus nostris urina pallida perpetuo fuit, etiam curato dudum vulnere. An igitur id a glutine, quod in vesica cum calculo copiosum aderat, & adhuc dudum adest? Attamen is, qui (Hist. 1.) a morte examinatus est, & glutinis nihil in vesica habebat, & urinam semper pallidam, foetidamque, reddiderat. Suspiciabitur forte quisquam a Renum calculis urinas nota alcalina imbui: sed ille idem, de quo nunc sermo est, cum nitida vesica nitidos, liberosque a calculo, aut pure, renes habuit.

18. Quod *Tom. V.* de Glutine Calculosorum in calcaream abeunte materiem dixi, id hoc anno constanter novis vidi experimentis confirmatum: imo ut ex Hist. 6. pag. 92. patuit, in labiis vulneris stagnans gluten, maxime circa labiorum commissuram, in lapillos calcareos abiverat. Quid autem proprie illud gluten est? In Charta Emporetica liquefcit, transitque, ut concreta Calx fere sola supersit. Si aëri hoc gluten exponatur in vitro, disparet quoque omne humidum sola calce superstite. Ergo non est de natura mucii, quod colli instar indurefcit. Fors est aliquid, quod ex vesica secretum se unit cum ramentis terrestribus, quæ a solidis abrafa nostris, urina continentur; quodque dein calculo in ambitum adplicatum, putamina illa format, quæ toties calculis humanis, alia aliis incumbencia, circumcreta inveniuntur, quæque etiam toties in sectione calculi ab eodem inter forcipes separantur. An pulveres, qui falso dictum Lithontripticon Stepfenianum ingrediuntur, apti quoque sunt, qui cum humoribus, ipsa in vesica secretis, in laminas calcareas abeant, calculo accrescant, putaminumque in morem ad uncias & libras excernantur, dum interea ipse calculus per-



persistens ut erat, educendus sectione est? vide Tom. 5. Cap. 5. hujus exemplum.

19. Cur dantur Calculosi, quibus vix ullum adpareat in urina gluten? Videtur hic impedita humoris, de quo N. 19. in vesicâ secretio; ita ut abrafa solidorum ramenta partim cum calculo concrecant, partim urinis expellantur. Si qua datur in Physicis adtractio, liquor vesicæ secretus haberet tunc fortem vim hæc ramenta attrahendi, quam calculus quoque tunc per se haberet: absente illo liquore, Calculus solus attraheret, quantum posset.

An omnium Calculosorum Gluten in calcem abit? Tom. 5. non ausus fui id asserere. Hoc anno innumera experimenta mihi constanter hoc phænomenon dedere; uno, alterove excepto, ubi parum admodum ejus adfuit. Hinc hucusque respondeo, in multiplicibus meis experimentis omnium calculosorum mucum plus minus calcis exhibuisse; id tamen contingere posse, ut quis multorum experimentorum occasione gaudens, incideret in nonnullos calculosos, quibus hoc phænomenon forte deesset. Experimenta mea multiplicia observationis frequentiam docent; contrariam forte aliorum observationem non explodunt.

20. Quam est observationum fertilis historia calculi? Cernimus ex omnibus antedictis majores calculos nonnunquam sibi viam per urethrâ pandere, hominemque ad tempus notabile exemptum vivere dolore; minores e contrario in hanc viam nunquam impelli, & perpetuo cruciari. Advertimus exiles admodum calculos tam vehementes, diuturnosque creare dolores, tenesinos, Recti prolapsus, mucum calcareum, urinam & putridissimam & pallidissimam, summamque vitæ intolerabilitatem, quam unquam producere queunt calculi majores.

21. Si calculus, ut in *Hist.* 10. ex collo vesicæ intra eandem repulsus, anno integro ita latuit, ut vix ulla sui signa dederit; si idem anno illo elapso, tormenta calculi resuscitet, jam non iterum in collum pulsus, sed manens

in

in vesica; nonne verisimilitudo crescit problematis, quod *Tom.V.* sub ipsum capitis 5. finem, pag.88. & *seq.* proposui?

22. Dictus *Osfeld* Hist. 8. intra septemdecim menses ter calculo a nobis sectus est, & ultima vice gemino calculo. Absentia doloris ad lumbos, qui olim illi familiaris, integram forsitan salutem promittit; fors fallax hæc spes, novos calculos dabit. Eo in casu historiam renovare poterit Mercatoris, qui narrante *Volkammero* M. N. C. Dec. 2. Obser. 177. jam quater a peritissimo Lithotomo sectus, singulo anno novum calculum secandum afferret. Porro hoc incommodum est cuique Methodo commune. Nos saltem certi sumus, enarrato hoc nostro agendi modo, nihil in vesica resistare posse calculosi; adeoque si novus iterum adsit, eum vel novam plane creaturam esse, vel ex renibus fuisse delapsum. Hinc non mirarer, quod decies & ultra idem homo indigeret sectione. Simile quid sobolfaciens *Aretaus* Lib. 2. Cur. Chron. Cap. 3. „ Calculorum, inquit, procreationem e „ fœcunda sterilem reddere nemo potest: μητερον μὲν „ γὰρ μητρὶν ἄποικον ὀφείλει, ἢ νηφρὸς λίσσονται „ ἀλίσσας. Facilius est enim uterum sterilem efficere, „ quam calculiferos renes ita disponere, ut eosdem haud „ generent ultra. „ Igitur ter, quaterque beatum genus humanum, quod nunc, quotiescumque opus fuerit, adeo facile eo hoste queat liberari!

## C A P U T VI.

### De Cranii Ustione in pertinacioribus capitis vitiis.

§. I. Diversus quidem modus admoventi ferri candentis, tam veterum, quam posteriorum; universorum tamen calculo expers periculo creditus. §. II. Experimentum primum hujus infelicissime in Nosocomio institutum. Mors inopina inde.

Re-



*Respirationis modus juxta communes humani corporis leges vix explicandus. Exemplum inflammati & gangrenosi majorem partem ventriculi, sine febre, sine dolore, & cum bono appetitu. Examen Anatomicum nullas in Cranio, Oculisve, Amauroseos causas detexit. §. III. Alter infauſtiffimus Cauterii Cranii effectus. Historia morbi antecedentis datur, ideo notabilis, quod plurima, & exquisita remedia, ordine adhibita, effectum plene caruerint. Conamina nostra, ad imminens a Cauterio discrimen Trepano averruncandum, enarrantur, & inutilia demonstrantur. Hydrops Ventriculi superioris cerebri. Portentosum infundibulum, ejusque mira egritudo, ut causa inventa Guttae serena. Respirandi modus, aequè parum, quam in priore Historia intelligendus. §. IV. Experimenta multa, in Craniis facta, enarrantur, quae hanc operationem nunquam, nisi cum summo vitae discrimine, institui posse evidenter arguant. §. V. Ex omnibus hisce Ratiocinium medicum, & seria formatur conclusio. §. VI. Quaedam de Trepano in Epilepsia, Cephalea, &c. admovendo.*

§. I. **A**B ipso Hippocrate, in hodiernum usque diem, Cauterii actualis in arte dicti applicatio ad Cranium, ita omnium ore laudatur, ut nesciam ullum esse Artis auxilium, quod plurimorum suffragiis fulciatur. Si enim Zecchium, & qui Zecchii autoritate per-motus fuit, Sennertum, paucissimosque forte alios exceperitis, uno omnes ore hanc operationem commendant.

Haud idem tamen cunctis inurendi modus. Quantum ex Hippocratis Textibus concludere licet, Libr. 2. de morbis, & libr. de locis in hom. Ferrum quidem candens capitis pluribus, imo octo diversis locis, sed ad integumenta duntaxat, admovit: nihilominus vim ustionis ad ossa penetrasse credibile fit, quia quam ustionem juxta nasum, in cantho oculi interno, ita fieri jubet, ut crusta ibidem inuratur, ea sane sine ossis ustione vix peragi posse videtur. Quin & ubi sic loca circa aures inuri præcipit,

cipit, ut desinant a pulsando Arteriæ, profunde satis videtur ussisse.

*Aretæus Cappadox* non explicat libr. 1. de cura Chron. Cap. 4. de *Epileps.* quò velit uri modo, paucis tantum: „ opus est, ait, etiam ignem capiti inferre; proficit enim.

*Cælius Aurelianus* Libr. 1. Chron. Cap. 4. refert, „ *Temisonem* consuluisse cutis capitis usturam, qua testa „ squammulis despumatur.

*Celsus* Libr. 7. Cap. 7. §. 15. in oculorum pituita: „ Quidam atramento duas lineas duxerunt a media aure, „ ad mediam alteram aurem, deinde a naribus ad verticem; tum ubi lineæ committebantur, scalpello inciderunt, & post sanguinem effusum os ibidem adusserunt. „ Nihilominus autem & in temporibus, & inter frontem, atque verticem, eminentibus venis idem ferrum „ candens admoverunt. Frequens curatio est venas in „ temporibus adurere . . . . valentior tamen Medicina „ est . . . . venas incidere, & sanguinem mittere: ubi „ satis fluxit, tenuibus ferramentis adurere. Contra tempora quidem timide, ne subjecti muscoli, qui maxillas tenent, sentiant: inter frontem vero & verticem „ vehementer sic, ut squama ab osse recedat. Efficaciter „ tamen etiamnum est Afrorum curatio, qui verticem „ usque ad os adurunt sic, ut squamam remittat.

Traditionem omnium sæculorum de hujus curæ præstantia collegit nobis *M. A. Severinus*, in suis libris de *efficaci Medicina*, Pyrotechn. Chir. Lib. 2. pag. 1. testimoniis *Pauli Æginetæ*, *Aëtii*, *Actuarii*, *Mesues*, *Rhases*, *Albucasis*, *Arnoldi Villanovani*, *Andræ Cæsalpini*, *Petri Salii*, *Paræi*, *Gualtheri Bruelis*, *Theodorici*, *Fumanelli*, *Rondeletii*, *L. Mercati*, *Lanfranci*, *Jacobi Sylvii*, *Nicolai Pisonis*, *Garioponti*, *Bertrucii Bononiensis*, *Cesaris Machæ*, *Joannis Heurnii*, *Epiphanii Fernandez*, *Fontani*, *J. B. Theodosii*. Ipsusque ille *Severinus* maximus extitit hujus curæ promotor.



Si ordine laudatos omnes hos Scriptores evolvimus; patet nonnullos quidem prope futuras, plerosque vero in ipsis futuris, & maxime in commiffura Sagittalis cum Coronali, candens ferrum imposuisse; plures insuper monuisse, ut ustio deberet ad ipsam penetrare diploën; omnes autem curas admirandas plane & stupendas inde a se se perpetratas gloriari. Ex multis pauca attulisse sufficiat. „ Quod meo quidem experimento, inquit *Severinus*, confirmare possum. Sutura sagittalis, coronalisque „ confinio perusto, *Franciscus ab Angelo, Castrinovenfis*, „ ab ingenti cephalæa liberatus est.

Et *Epiphanius*: „ Mirum est, ait, quam his Cau- „ teriis refrigeretur cerebrum, & pravi, tetricque vapo- „ res dissipentur: & licet primis diebus soleant concitare „ aliquem gradum caloris, tamen majus est emolumentum, quod postmodum inde sequitur, quam pusillum „ aliquod damnum, ex impresso igne. Nos quoque quin- „ que, quandoque septem Cauteria, amentibus admo- „ vemus, qui fuere curati, maxime ubi non viget capi- „ tis tanta caliditas; ob quam quidem in hac muliere „ (cujus historiam dederat) tantum unum fieri curavi- „ mus. Est & e novissimis *Cæsar Macha*, Principum „ subalpinorum Medicus, qui consil. 140. feminam inde „ restitutam testatur, septem jam menses insanientem.

Idem *Fernandez Hist. Medicinal. 47.* „ Testor De- „ um Cauteriis in capite quandoque tribus, quandoque „ quatuor & quinque factis, ad loca futurarum, curasse „ annis elapsis focrum *Magistri Gentilis*, cui jam erat „ memoria abolita, & duos alios stolidos & insanientes „ juvenes.

*J. Heurnius*, primus Med. Pract. Professor, in condita anno 1575. Universitate Lugduno-Batava, ait Chirurgum Ultrajectinum a se curatum Cauterio ab immedicabili cephalæa, in determinata capitis plaga sæviente. Et in *Aphor. 2. Sect. 7.* „ Vir, cui erat caput totum tu- „ berosum, Cauterio id ad os usque aperuimus; quod

„ exc-

„ exesum erat fere usque ad Diploën, abrasimus sensim,  
 „ iterumque aliam partem aperiebamus ad os, ita sensim  
 „ totum fere caput abrasimus. Evasisit.

*Platerus* Libr. I. pag. 61. „ Quo pacto modo natis  
 „ *Florentiæ*, ut fertur, verticem perurentes, Epilepsiam,  
 „ quæ iis in locis infantibus consueta est, solent avertere.  
 „ Quibus de causis, & experientia moti, ferro candenti  
 „ ustionem moliri . . . non inconsultum esse putamus.  
 „ Scilicet ut ante monuerat, „ si pertinacis  
 „ mali causa in capite lateat.

*Hier. Fabr. ab Aquapendente* pro inurendo Fonticulo in futura Coronali, peculiare Cauterium excogitavit; quod apud ipsum, & apud *Sculdetum*, qui hanc methodum quoque laudat, videas.

*Hollerius* in scholio ad suum primum caput de morbo intern. „ Applicatur, inquit, Cauterium actuale in media parte capitis prope futuras. „ *Duretus* in sua in hunc *Hollerii* textum enarratione, etiam candens ferrum commendat.

*Fallopious* de Cauteriis, pag. 340. ipsis quidem in futuris non suadet: „ cæterum, ait, capiti Cauterium tute imponere possumus.

*Riverius* Cap. de Mania pag. 227. „ Denique Cauterium futuræ coronali adplicatum maxime probatur a  
 „ *Gordonio*, ejusque utilitatem confirmat Historia cujusdam Maniaci, cui cum esset vulnus inflictum capiti, cum cranii fractura, quamdiu vulnus apertum, tam diu bene habuit; vulnere curato, reversa est Mania. „  
 Et Cap. de dol. cap. pag. 236. „ Cauterium futuræ coronali admotum, dolorem capitis contumacem aliquando radicitus abstulit. Multo majoris est efficaciam, si temporibus admoveatur, de qua vide *Poterium* Obs. cent. 3. Cap. 8. & Observationes nostras publico communicatas. „ Porro in Obs. cent. 2. N. 93. idem  
 „ *Riverius*. „ Ad puerum epilepticum vocatus, præscribo apozema ex Cephalicis, & Epilepsiæ specificis, cum  
 „ pur-



„ purgantibus ad quatuor doses . Deinde inuritur Cau-  
 „ sticum futuræ coronali . Et his duobus remediis a mor-  
 „ bo liberatus est .

*Lambswerde* in *Tom. 2. Sculteti Obs. 9.* Cephalæam  
 veneream curat cauterio actuali in futura Coronali : &  
*Obs. 11.* Epilepticam puellam curavit cute primum trans-  
 versim secta , actuali cauterio futurarum coronalis & sa-  
 gittalis concursum , *satis profunde* inurendo .

*Nuckius* Operat. & exp. chir. N. 1. „ Facili, in-  
 „ quit, negotio operatio hæc sequenti instituitur modo :  
 „ inuratur loco modo notato ( per fila in medio capite  
 „ se decussantia , ( ut ante ex *Celso* vidimus ) profundum  
 „ satis foramen cauterio quodam actuali .

*Fred. Deckers*, Exercit. pract. pag. 109. Puellæ cæ-  
 cæ historiam refert, cui Chirurgus fonticulum in futura  
 coronali & sagittali inussit, ad primam calvariæ laminam  
 usque urendo, quod cum instabile daret levamen, alius  
 Chirurgus inussit ad diploen usque, unde magna, rotun-  
 da portio separata fuit; separatam hanc portionem figura  
 exhibet autor, habentem diametrum decem linearum:  
 imo cum auxilium esset inconstans, tertium cauterium su-  
 stinuit, & tunc recte vidit. Etiam Guttam serenam, &  
 Epilepsiam, sic curatas se vidisse affirmat.

*Clariss. Viennensis Professor P. de Sorbait*, prax.  
 pag. 286. Cap. de Cataracta & Amaur. „ Setaceum  
 „ quoque multis fuit auxilio: loco cujus in Delicatulis  
 „ ( videtur tamen operatio longe crudelior setaceo ) sub-  
 „ rogari potest. Cauterium, quod non tantum Nuchæ,  
 „ sed etiam futuræ Coronali impositum plurimos juvit.  
 Et pag. 598. 599. „ Cauteria adplicanda sunt . . . in  
 „ capite supra futuram coronalem, longitudine digiti ex-  
 „ tensi supra nasum, contra Phthisim. Cauterium autem  
 „ quo magis est candens, eo minorem affert dolorem .

*Cl. Hoffmannus*, Tom. 4. Part. 4. med. Syst. Rat.  
 pag. 118. Edit. in 4. de Amaurosi: „ Magnum profecto  
 „ præsidium est in cauterio actuali, syncipiti, vel nuchæ  
 „ inusto .

M. G.

*M. G. Purmann*, famosus multos per annos apud *Breslavienses* Chirurgus primarius, in *curiosis observationibus* *Invictis. Imp. Josepho* dicatis historiam puellæ *Breslaviensis* refert, quam invincibili cæterum Epilepsia curavit cauterio actuali, in confinio toties dictarum futurarum; quorum commissuram statuit contra omnes, qui id negent, constanter reperiri in puncto, quo fila, *Celsi* modo ducta, decussant se se. Videturque sæpius eandem operationem peregisse, cum asserat unctionem eo in puncto se semper fecisse.

Quadraginta igitur & ultra Autores tum Medici, tum Chirurghi, eosque inter plurimi sua in arte celebres, & famosi, hanc operationem & suaserunt, & exemplis utilissimam demonstrarunt, nullius unquam infortunii meminere; quidam audacter omnis dixerunt periculi expertem: operationem porro laudavere sic, ut vel integumentis, ac pericranio primum percussis, separatisque, os solum adureretur, idque aut prope futuras, quod quibusdam placuit, aut in ipso futurarum contactu, quod plerisque visum: hancque sic institutam operationem plane innocuam esse plurimi asseverarunt.

Proinde cum nullum existeret sive Medicinæ, sive Chirurgiæ caput, quod gravioribus autoritatibus ac testimoniis fulciretur, piaculum fore credidi in difficilioribus ac incurabilibus casibus idem omittere. Tres porro morbi videbantur mihi præcipue hanc curam poscere, Cephalæa pertinax cum Hemisrania, inemendabilis Epilepsia, Gutta serena. Erantque nobis tales ægri præsentēs, in quibus curam horum morborum hac lege exerceremus. Sed præcipue nos miserebat duorum, quos Gutta serena ad Mercurium, ad Corticem, ad Machinam electricam, ad cujuscunque generis Evacuantia, ad varia Capitis Epithemata, ad Vesicantia, ad Setacea &c. omnino rebellis & pertinax, misere affligebat.

§. II. Igitur 3. Junii proxime elapsi, operationem fecimus in Adolescente 12. annorum, rustico, robusto,  
toto



toto quadrato, quem Amaurosis affligebat, probabiliter nata ex contuso capite, postquam sex mensium spatio in periodicos vomitus, quos cephalæa semper pronunciabat, inciderat. Amaurosis porro ejusmodi erat, ut noctem inter, diemque nihil distingueret, summam tamen, agilemque pupillæ utriusque constrictionem, & dilatationem ad majus, minusve lumen haberet. Unde contra Eru- ditissimi *Halleri* opinionem sensibilitas pupillæ demonstrari videtur; Retinam enim plane inertem fuisse, perfectissi- ma cæcitas evicit.

Quia & sine Integumentorum incisione, & cum eadem, hæc operatio fit, ultimum modum prætulit D. *Leber*; cum eandem didicisset, fortunatoque adplicatam a suo Magistro, dexterrimo, dum viveret, Chirurgo *Laudes*, vidisset; qui idem Magister Discipulos, adstantes- que Chirurgos, serio hortatus erat hanc simplici ustioni semper præferrent, metu convulsionum, quas ustio sine sectione generare statuebat.

Integumentorum hæc separatio, validum dolorem ex- citabat; leviolem, pericranii abrasio; maximum vero, ustio; quam valide urentem ajebat, licet nihil eorum, quæ circum se gerebantur, sciret. Exanimabam, an vagina, intra quam Cauterium, ne labiis percussis noceat, capiti imponitur, a Cauterio candesceret, & ustionis dolor po- tius ab integumentis ustis, quam a perusto cranio gigne- retur; verum vaginam illam ego, adstantesque tangentes, vix calentem deprehendimus.

Dolor primis horis magnus, postea modicus, bonus appetitus, semel modo levis vomitus, qui cæterum ipsi consuetus, observabatur. Utebatur jure carniū, aqua hordei mellita, & emulso leviter paregorico. Altero die optime habuit. Die tertio, fumo aromatico prunis ar- dentibus injecto, ac capiti admoto, apparatus examina- vimus, lintea carpta sanguine imbuta amovimus, insper- soque vulnere pulvere Mastiches, labia suis singula locis adposuimus. Bona hæc, sed contracta ita, ut inustum ossi,

locum exacte liberum & nudum fervarent. Tenaci Emplastro ea ad se mutuo jungebamus; omnia deligabamus sicce, ac raro deligandum locum postmodum esse, *Cæsaris Magati* consilio decernebamus. Nox optima, alvus ab *Enemate* bona. Die 6. Junii, scilicet ab operatione quarto, pulsus sanus, naturalis, bonus appetitus, nullus capitis, nisi ab ejusdem motitatione, dolor. Hora octava vespertina cum illo locutus sum, affirmantemque palam audiui, se nullibi in toto corpore, imo ne in capite quidem, dolere, suumque jus eadem vespera egregie sibi sapuisse. Tandem bonam illi noctem apprecatus, pulsum adhuc tetigi scrupulose, eumque tam bonum inveni, quam unquam sanus homo habere potest. Idem testati mihi sunt Medicinæ & Chirurgiæ Assistentes, qui post me pulsum examinarunt. Interim visus emendationem observare se nullam æger conquerebatur. Solabamur illum ea spe, quam optimæ operationis tolerantia merito dabat. Sed, o spem fallacem! mox a media nocte vomere cepit; quod quia ipsi familiare, custos neglexit primo, verum ronchum in respiratione advertens, Assistentes Nosocomii vocavit. Qui morientem viderunt hora secunda prope finem diei quarti.

Quod me, nosque omnes, nec opinatus casus perculerit, & attonitos reddiderit, nemo dubitabit. Nec reticebo me suspicantem, ne forte vomitus violentia in syncopem lapsus esset, curavisse, ut pectus ipsi valide agigaretur, & bis injecto *Enemate Fumi Tabaci* intestina irritarentur. Sed mortuus erat hac vice non resurrecturus.

Cadaver examinantes, nihil mali externo in cranio deteximus. Labia quippe vulneris bona, suppurantia, se jam cum pericranio unire ceperant in loco ab inustione remotiore. Olla cranii ablata, videbamus cranium adeo leviter igne tactum fuisse, ut facta uesti abrasione, vix quid de ossa periisse videretur substantia.

Igitur uestio non erat aut profunda, aut etiam ad usque diploen producta, quemadmodum Autores jubent, sed vis tangens, adeoque insufficiens. Attamen quis credat!

Du-



Dura mater inustæ plagæ subjecta, jam ab externa sui parte, qua os tangit, suppurari leviter inceperat; Arachnoidæa videbatur ibidem loci cum pia mater corrugata: cerebrum autem integerrimum. Cæterum per universum cranium ambæ Meninges admodum inflammatae.

Igitur, quod hic præprimis notandum, ustio vix leviter externum cranium tetigerat, & nihilominus effectum in omnibus ediderat cerebri membranis. Et quidni? Cranium internum ipsum ad distantiam duarum linearum a loco usto leviter fissum fuit. Tantane vis ignis, effectusque leviori tactu? Quid si ad diploen penetraffet? Præstitit sane nos in urendo meticulosiores fuisse, cum hocce cranium, crassi licet rustici, adeo tenue & transparens esset, ut vix mediam solitæ crassitudinis partem haberet.

Præter hæc nullum in cranio vitium, ne in opticis quidem nervis, cui Guttæ serenæ adscriberemus causam.

Dum vomitus a semianno periodicus fuerat, operæ pretium erat causas indagare. Ventriculus ore superiore suo, initioque Oesophagi, solito multo amplior, ita sanguine omnibus suis in vasis turgens, ut hæc in nonnullis locis duarum, in aliis trium linearum diametrum haberent; purpureus cæterum toto fundo suo, binisque in plagis tam interne, quam externe, gangrænosus; circa Pylorum bonus.

Universi Pulmones lateribus undique, Mediastino, Diaphragmati, Pericardio, Spinæ dorso lateri, Jugulo, quolibet in puncto adeo indissolubiliter accreti erant, ut sine alterutrius destructione impossibile esset eosdem solvere; utque ubique, potissimum vero in toto dextro latere, lacerati pulmonis reliquæ thoracem investirent. Quemadmodum porro Pulmones cum vicinis partibus, ita quoque mutuis inter se se lobis coalescebant.

Quod autem maxime mirabile, Adolescens nunquam in nostro Nosocomio difficilem; aut læsam Respirationem ostendit, neque hujus quidpiam Matris habuit Anamnesis. Unice affirmare possumus sesquihora modo ante mortem Respirationis, pulsusque, vitia adparuisse.

Nec minus mirabilis Ventriculi & obstructi, & perquam inflammati, & gangrænosi, contemplatio, ubi ad mortem fere usque nec signa febris, aut gangrænae in pulsu, nec signa doloris in hoc viscere, nec signa alicujus in ejusdem functione defectus, apparuerunt. Igitur obstructio adeo notabilis, inflammatio adeo sæva, gangræna adeo vehemens, ut penetret totam ventriculi substantiam, citra dolorem, citraque febrem, contingunt? bono cum appetitu formantur? cum integra visceris perficiuntur functione? Neque enim fore crediderim, qui statuatur, omnia hæc sequi horæ spatio nata & perfecta fuisse. Nunquid etiam illasam semper Respirationem facile intelligimus cum universalis adeo, cum indissolubili concretionem Pulmonum? Cordisque expediti motum perennem, cujus pericardium dictis de causis immobile fuisse videatur? Merito videor hunc casum ad *Cap. 4. de Problematibus* referre, adeoque ut *Problema 11. ad pag. 78.* adungere.

Sed ut e bivio in viam; futuros prævideo, qui ex integra hac historia concludant, levem hanc unctionem causam mortis neutiquam extitisse, sed in corpore adeo vitioso mortem aliunde duxisse originem. Hos obsecro velint sequentem perpendere casum.

§. III. Die 4. Junii Cauterium eodem modo juvenculæ 20. annorum admovimus, altera scilicet die ab eodem adplicito Adolescenti. Hæc Gutta serena laboraverat a fine anni 1759. post vomitum spontaneum 14. dierum, postque trimestrem defectum catameniorum. Datis purgantibus, vomitus cessaverat, redierant menses, visusque. Toto anno optime valuit. Sub finem anni 1760. menses deficient, vomitus redit, perit visus. Eo in statu nostrum Nosocomium infertur. Video Amaurosin, quæ cum immobili utraque pupilla, inter diem, noctemque, imo posthac de die album inter, nigrumque, distingueret: contra quam in Adolescente, cui cum mobilissimis a luce pupillis perfectissima cæcitas fuerit. Cum anno elapso purgantibus sanitatem & visionem recuperasset, eadem ipsi, sed



sed jam incassum, præscripsi. Cumque demum purgantibus opio interposito vomitum superassem, menses & visus deficere pergebant. Amaurosis jam his vomitum diuturnum, eumque violentum; vomitus jam bis retardatos insequeretur menses: unde in mensium defectum, si non omnis, saltem aliqua causa vomitus videretur refundenda. Quare postquam appetitus bonus cessante vomitu rediisset, methodica ad menses revocandos cura exactissime; eaque non juvante, quævis empyrica, prudenter adhibita fuit. Cum demum nihil juvaret, nisi quod semel, iterumque leve quoddam initium mensium videretur conspici, tandem quod *Tract. de Hemorrhoidibus* pag. 73. ex *Anglicis Observ.* laudavi auxilium, Machinæ tortilis ad arterias crurales admotæ, post Aloëticum purgans, Balneaque Vaporis; hoc, inquam, auxilium ad tres varias usque vires adhibui, circa id tempus, quo menses, ni turbatus naturæ ordo fuisset, redire debuissent. Sed & hoc frustra fuit. Diu demum post menses redire, sed irregulariter semper; vomitus non nisi raro rediit, passim adhuc bonus Appetitus, bona digestio, egestio commoda, virium, torositatisque incrementum. Ast vero omnia hæc cum perseverante Amaurosi, & continuo repetentibus capitis, atque oculorum, doloribus.

Videbatur ex hisce concludi oportere, quod visus olim rediisset ad Catameniorum restitutionem, quia necdum quid notabiliter aut læsi, aut impacti, obstructique, in Encephalo erat; jam vero ex vomituum tum repetitione, tum diuturnitate, vitium topicum in cranio foret, propter quod Gutta serena ad restitutos menses perennasset: quodque proinde occasio opportuna adesset ejus curam Cauterio tentandi, id quod tutum, quod securum, quod nunquam noxium, sæpe vero efficacissimum, hucusque credideramus.

Altera ergo die, ut monui, qua in puero, operationem eodem modo in hac puella fecimus. Symptomata dolorum ad varias operationis partes, confuse primo;

sedatis vero doloribus, eodem se percepisse modo, quo Adolescens narraverat, declaravit. Appetitu gaudentem eodem, quo puerum, modo sustentavimus. Prima nocte vix dormivit, & dolorem in utroque cervicis latere conquesta est; altera die melius: tertia die bene se habuit, excepta febricula; quarta die pejus. Sanguinem tunc missimus, qui pessime phlogisticus. Jamque vox deficere incepit, & caput hebes fieri.

Igitur inopina morte pueri perculsi, mortem puellæ tristes quoque prævidimus. De *Trepano* interea cogitatum. Ne vero illud frustra periclitaremur, plura crania primum cauterio inussimus, trepanumque adhibuimus; & primo quidem ipso unctionis loco. Sed mox stylus *Trepani* in adusto fundo vacillabat, deinde plus adhuc stylus *Trepani* maris; ita ut vestigium sufficiens haud potuerit imprimi, quo *Trepanum* femina dictum tuto ageret. Quapropter idem eo tentavimus loco, qui ad unctionem proximus, ut circulus *Trepani* eam una tangeret, eoque modo ad affectum in *Cranio* locum quoque deveniremus. Etenim tam proxime ad ustam plagam *Trepanum* adhibendum esse suadebat hac ipsa hora facta pueri *Anatome*, quæ ambas meningas ibidem affectas ostendebat. Verum & hoc impossibile. Dum enim in pertenui *Cranio* (quod ad tutius experimentum eligebamus) corona *Trepani* partem *Cranii* non ustam vix tetigerat, profundius jam adustam partem penetrabat; & bis, ter adhuc, licet prudentissime, suspensissimeque, modiolum agitando, ossis festuæ, ab unctione fragiliores, in cerebri membranas infigebantur, interea dum diu adhuc perterebranda ea esset portio ossis, quæ adusta non fuerat, ut totum frustulum eximi posset: unde conclusimus evidens mortis periculum periculosissima & incertissima operatione averti non oportere. Medio die quinto periit, cum leviori faciei convulsione.

In externo *cranio* omnia ut in bono vulnere. Ossa *cranii* resecta unctionem non modo multum non penetrasse,



se, sed crassum hoc cranium vix attigisse patebat; parte enim adusta, abrafa, vix de ossis substantia quidquam ablatum apparebat. Nihilominus sub hoc crasso, vixque ab igne tacto cranio, dura mater suppurata inventa est, ac totum sinistrum cerebri hemisphærium, in quo ( ut mox patebit ) ustio erat, magna copia puris inter utramque meningam scatebat. Et, ut in priore, in utroque cerebri latere utraque Meninx vehementer inflammata erat. Aër autem copiosus, ubique se movens, separatim a sanguine in harum membranarum vasis sanguineis, potissimum in hemisphærio sinistro, miro sane spectaculo, inventus est. Ventriculus superior in sinistro latere Hydropicus tria plena cochlearia lymphæ gessit, dexter solitam copiam. Cerebrum pone locum ustionis flavum, & solito mollius, ac fere liquidum.

Notabile autem maxime Infundibulum. 1. Maximum fuit, octo, vel novem linearum diametrum habens. 2. Repletum fuit materia grisea, quæ partim plutacea, partim calcaria fuit. 3. Concretum erat cum pia matre Opticos involvente. 4. Insidebat, premebatque ipsum Opticorum coalitum; non quidem ita, ut Optici nervi post coalitum marcescerent, sed saltem sic, ut videretur illorum actio interturbata fuisse, puellaque cæca fuisse mansura, etiam si male haud successisset operatio.

Pulmones, ut in puero præcedente, ubique, ne minima quidem plaga excepta, indissolubiliter cum omnibus in Thorace partibus, mutuisque inter se lobis, connati erant. Oesophagus, & Orificium superioris ventriculi, duplo, quam solent, ampliores; Pylorus tam arctus, ut calamum scriptorium haud admitteret, in crastinam autem demonstrationem reservatus, hac constrictione, an spasmo evanido? caruit. Ex præcedentibus quippe patuit spasmos a morte non raro superesse.

§. IV. Hic ita enarratis, seria & tranquilla mente examen doctrinæ de adurendo cranio instituendum est. Collato lugubri utroque hoc casu, cum allata 40. & ul-

tra Doctorum doctrina, dico 1. minime verum esse, quod operatio hæc quovis periculo vacet. Et periculosissimam esse, & utrisque nostris letalem fuisse, Historia utraque palam facit.

2. Cauterium in nostris levissime modo crania tetigit, lethum induxit; quid non sequatur, necesse est, si uratur profundius?

3. Si cauterium jussu Autorum tam profunde adactum fuisset, ut probabiliter ad Diploen penetrasset, ipsum cerebrum immediate adustum fuisset; nam eximiæ tenuitatis cranium fuit. An non ea de causa plures, hac ita instituta operatione, perierint cito, necesse est?

Sed 4. Etiam levissimo cauterii attactu validissima, nocentissimaque ustio fit. In primo nostro casu levior, gravior longe in secundo, suppuratio inventa est, in utrisque universi capitis inflammatio, tum & aëris perceptibilis intra vasa sanguinea collectio magna, varia, in omni loco membranarum, ut ignis in liquoribus aërem, antea non ut talem, jam vero ut aërem existentem, bullisque manifestantem se se, gignere solet. Hoc experti nos a leviuscula adustione, quid illi a penetrantiori experti non fuerint?

5. Crania quævis, gravissima æque quam tenuissima, suspenso tacta cauterio, intus ardent sic, ut digitus suppositus uratur, & ni retraxeris, ejusdem solvatur cuticula. Hoc experimentum pluries in publico Collegio iteravi, ut plusquam 20. homines digitum supponentes, ilico eundem retrahere deberent. Eum in finem sumsi varias veteres calvas, tenuiores, crassiores, interque eandem unam, cujus Bregmatum crassities lineas quatuor æquabat. Vix per tres minuti horæ secundas candens ferrum os tetigerat, quin chirurgus digitum, eo tempore admotum, in bullas elevatum doleret. Ergo dura mater, & reliquæ subjectæ partes, plus minus adurantur, necesse est. Igiturne adeo mirum fuit, quod ambo nostri ad ultionem vix tenuem ossis superficiem consumentem,

se



se aduri lamentarentur, licet nec ignem videre possent, nec ejusdem adplicandi moniti essent?

6. Omnes postmodum experimentorum occasiones captantes, in quovis recenter oblato cranio varia exploravimus. Ubi vix tangit cauterium os, jam ab interna parte bullæ nascuntur fervidæ, veluti quid ebulliret. Ergo in quacumque etiam levissima adustione ingens fervor ad interiora percipiatur, oportet.

7. Et maximus, & perniciosissimus ille caloris gradus est, qui ab ebulliente oleo, quod fervente aqua fere triplo calidius est, gignitur. Varium experimentum id nos docuit. In homine recenter mortuo quatuor diversis in plagis cranium cauterio leviter tetigimus. Inversa tunc olla cranii flava macula in his ipsis quatuor locis inusta erat. Inuissimus idem alio loco  $\frac{1}{3}$  minuti, id est 20. se-

cundarum spatio: vix os externum ustum erat, quin interiora bullis flavis, foetidisque, excoquerentur, & digitus suppositus valide exureretur.

8. Si ad Diploen inurere usque, ut plures Autores jubent, oportet, indigebat ferrum candens tribus, imo pluribus horæ minutis, pro diversa craniorum crassitudine; prout in recentioribus craniis deprehendebamus, loca adusta postmodum abradendo. At vero in vivis ab ustione in uno cranio unius minuti, sesqui minuti in altero, transsudans fervidum oleum ussit jam, corrugavitque omnes meningas, & albam cætera cerebri medullam in flavam convertit. Monitos autem eos velim, qui hac mea experimenta repetituri sint, ut sumant consuetum Artificum Cauterium, ut *Aquapendens*, *Paræus*, *Hildanus*, *Sculdetus* &c. describunt; alioqui nollem de experimenti effectû respondere, si v. g. clavo, vel alio ferro candefacto, vel si non penitus ignito, cranium inurerent.

9. Inconstantius quoque nihil decursu futurarum. Sumimus plura vetera, plura deinde ad singulas oblatas occasiones crania recentia, & numerosa inter illa depre-

hen-

hendimus, in quibus futura coronalis pollice inferior ad frontem, vel superior versus futuram Lambdoidem inveniebatur. Intra hoc pollicis spatium futuræ coronales inter se se  $\frac{1}{4}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{3}{4}$ . altitudinis differunt. Neque constanti

lege sagittalis futura in medio est. In puero mortuo os parietale sinistrum longe amplius dextro. Unde cum ipsi in media linea uestio facta esset, invenimus illam  $\frac{1}{4}$ . pol-

licis a futura sagittali distantem. Nonnullis futuræ omnes, vel quædam desunt, imperfecteve adsunt. In puella mortua totum os frontis, & parietale dextrum, nonnisi unicum solidum os fuit, sine vel minimo futuræ vestigio. Quare quod plurimi disertis verbis sic rem constanter se habere affirmant, operationemque oportere semper in ipso decussantium se se filorum puncto fieri, ut in futurarum commissuram cadat, inania verba sunt, experientiæ contraria. Equidem posse quemquam in decem ac plures incidere calvas, quarum ejusmodi commissura sit futurarum, inficias haud ivero; sed concadere demum mihi debebit, quo plures Calvarias examinaverit, eo numerosiores inter illas se invenire dissimilitudines.

10. Fateri oportet laudatorum Scriptorum hinc inde unum reperiri, qui operationem quidem commendans, eandem tamen remotius a futuris esse velit; ita quippe *Fallopious*: vel alium æque meticulosum, qui futuras quidem, sed non confinium ipsum binarum futurarum, suaserit aduri. Sed priori satisfacimus in puero, in quo uestio ab utroque futura multum distabat: alteri casu auscultavimus in puella, ubi uestio fuit pollice altius futura coronali. Et nihilominus utrisque hisce meticulosis casu satisfaciētes, ægros utrosque morte amisimus.

§. V. Candide ergo omnibus sic expositis, quid demum consequitur? 1. Veterum, recentiorumque complures haud ea, quæ viderint, expertique fuerint, verum ea duntaxat, quæ alibi audiverint, legerintve, scripsisse;

Ar-



Artem proinde istos non experientia, sed onerosis auxisse voluminibus.

2. Fuisse dubio procul, qui forte semel operationem viderint, eamque ( sive quod inflammatio Meningum resoluta fuerit, sive quod meticulousior Artifex aut non penitus candefecerit ferrum, aut cranium vix tetigerit, ) letiferam non fuisse; imo, quod fonticulus inde excitatus morbum levaverit, profuisse observaverint: pessime vero ex rariore observatione generalissimas regulas posteris tradidisse.

3. Qui vero pluries hanc cranii adustionem perfecerrint, & non nisi faustissimam descripserint eandem, hos suos paucos fortunatos casus enarrasse modo, plures reticuisse infastos. Eundem quippe ignem, qui nobis est, ipsis fuisse; eadem ipsis, quæ nobis, crania: effectus proinde ejusdem ignis, in consimilia crania, fuisse consimiles. Cum igitur demonstratum sit a mitiore, quam jufferint illi, inustione mortem contigisse, quid non sæpius illos letiferi observasse necesse est, qui adusserint altius?

4. Hos præprimis culpandos esse, fraudisque notandos, eo quod infortunia sua celaverint, suppresserint, conticuerint. Dum enim nihil nisi fausta cecinerint, alios ad imitandum audaces suo reddidere exemplo, eodemque, ut nos, sero imprudentis imitationis poenitentes.

5. Solam proinde, ac genuinam Artis promovendæ eam esse normam, qua solius amore veritatis, qua unico opitulandi studio, summo cum candore, & Christiana simplicitate, sic facta enarrentur, ut non minus infasta, quam fausta, innotescant. Quo demum efficitur id, ut, qui hos Autores consulant, maturius & secum, & cum aliis, deliberent, incertamque forment Prognosim, antequam necessitas forsitan cogeret ad similes operationes, curasve, confugere.

6. Quam triste est mores Circumforaneorum & Agyrtarum lucripetos, vaniloquos, ambitiosos, adeo multis  
Medi-

Medicorum atque Chirurgorum inhaerere animis, ut id, quod haud verbis modo, sed etiam factis vilipendunt, detestanturque, nunnunquam tamen nimio systematis ardore excæcati, turpissime imitentur! Profecto non possumus sufficienter nobis invigilare, ne proprio præoccupati amore, aut vana illecti gloriola & coævis imponamus, & posteris. Ad pondus Sanctuarii omnes in Medicina & Chirurgia appendendæ sunt observationes, priusquam in lucem prodeant, ut ars inde capiat augmentum. Etenim dicente veridico *Hippocrate*: „ Vita brevis, ars longa, „ occasio celeris, experimentum periculosum, iudicium „ difficile. „ Hinc utimur vere demonstratis aliorum, ut tempori parcamus, hisque instructi, ad ulteriora invenienda, & demonstranda annitamur. Et hisce nostris suffulti Nepotes nova adjicient. At vero si non artis amore, sed potius turpis lucri, immeritæ famæ; detestabilis in bonos invidiæ, studio ducimur; si Peregrinatorum complurium similes, mirandarum rerum magis, quam verarum, cupimus scriptores esse; turpiter incautos decipimus in detrimentum Artis, in damnum, perniciemque mortalium, cautos vero animabimus, ut malam nostram fidem orbi patefaciant; quod antequam iteratis experimentis effecerint, millenos errores ii committent, qui nobis, ut candidis veritatis præconibus, fidem adhibuerint.

§. VI. Igiturne hæc operatio ex arte proscribenda? Et in desperatis, aut difficillimis morbis, quorum causa probabiliter in capite hæret, an nihil ultra tentandum est?

Ad primum respondeo, quia operatio multo levius instituta in nostris binis ægris, quam Autores jubent, mortem utrique intulit; quia experimenta in cadaveribus, & in separatis craniis evicere, nunquam sine ingenti discrimine vitæ eam institui posse; merito concludi posse, ac debere id, quod sit ex Arte proscribenda. Etenim rarior operationis hujus felicitas plurimorum interitum non compensat.

Ad



Ad alterum dico *Trepanon* in hisce superesse casibus. Est equidem & illud, quod ultro fatendum est, anceps sæpe auxilium; eo quod *Cephalearum*, *Epilepsiarumque* causas, nonnisi conjecturemus in capite præsentem esse, vel in ea, quam suspicamur, capitis plaga. Attamen incertitudinis facta prognosi, si ægri velint extrema tentari, novimus per certa experimenta *Trepanon*, erudita manu adplicatum, per se letale nunquam esse; etiamsi prima terebratione irrita, altera vice, pluribusve, ad aliam cranii plagam adplicetur. Hinc quia non sola Autorum fide, sed quotidiana, in contusis, ac vulneratis, experientia discimus non esse per se periculosum *Trepanum*, sponte admittimus, quæ *Ballonius Paradig. N. 19.* quæ *Hollerius Libro Observ. quæ Duretus in Annotatione in suam enarrationem in Cap. 2. Holl. de morbis internis pag. 27.* quæ *Rhodius Cent. 1. Observ. 69.* quæ *P. Forestus, Libr. 9. Cap. 2. in Scholio, alique, tum docuerunt; tum exemplis confirmarunt.* Quare perperam *Willisus de An. Brut. Lib. 2. Cap. 2. pag. 75. Edit. in fol.* ait: „Laudari aperturam capitis a multis, sed a nemi-  
 „ne, quod sciam, tentatam. Ingentem *Harvæum Nobili*  
 „feminæ ob invincibilem *Cephalexam* proposuisse, & spem  
 „exinde fecisse, sed neminem facere operationem voluif-  
 „se. „Utique ex allatis Scriptoribus patet sæpius fuisse eandem summo cum effectu institutam.

## C A P U T VII.

De Peculiari quorundam Medicamentorum  
 virtute.

---

§. I. Ratio cur hoc anno minora numero experimenta circa  
*Aquam Calcis, & Uvam Ursinam*, describantur. §. II.  
*Examen an Ononis profit calculosis? Anatome. Eadem quæ-*  
 stio

stio de Raphano hortensi. §. III. Laus Verbenæ: eaque occasione enarratio diræ cephalææ, ad quam curandam frustra Artis fere omnis exhausta suppellex. §. IV. Præstantia Foliorum Aurantiorum in Pulvere, & in Decocto. Admonitio de Prudentia, quæ in Viribus Medicamentorum detegendis, determinandis, limitandisque, necessario adhibenda sit. §. V. De communibus dictis Anti-Epileptics.

§. I. **D**E Aquæ Calcis, & Uvæ Ursi viribus, minus hoc anno dicendum habeo, 1. quia hominum calculo Laborantium numerus longe minor ad Nosocomium accessit. 2. Quia ad facilem secandi methodum demonstrandam, & amplificandam, plures eorum, quibus ceteroqui alterutrum horum dedissem, calculo secari curavi. 3. Quoniam in his morbis etiam aliorum simplicium vires explorare animus fuit. Cæterum plures eorum, quorum, his remediis curatorum, historiam tomis præcedentibus dedi, denuo videre contigit, & perfecte sanos, omnibusque calculi symptomatibus liberos esse, constitit. Inutilia quoque hæc remedia esse, in quibus degeneres admodum systematis ouropæi partes erant, novis constitit observatis; attamen educto calculo iisdem levamen hinc multum sæpe contingere.

§. II. Casu historiam notabilem didici effectus *Ononidis*, dictæ C. B. P. *Restæ Bovis*; quam Autores Medico-Botanici ab omni tempore in variis obstructionibus, & calculo, laudarunt. Senator ille, (quem antea Cap. 3. §. 2. Hydrøpe pectoris extinctum consideravimus, longis ab annis calculi martyr, & plures minores aliquando excernens, demum a Peregrino Patre *Franciscano* id consilii accepit, ut pugillum herbæ *Ononidis*, cum semilibra aquæ paxillum coctum, quovis mane biberet; ac primo quidem spatio longiore; deinde, levamine insigni inde percepto, repeteret quater in anno idem remedium, spatio 14. dierum. Consilio parens, levamen primo incredibile habuit, deinde liber ab omni calculi sympto-

ma-



mate, per aliquot ante mortem annos, sic fuit, ac si eodem laborasset nunquam; nisi semel, iterumque, repetitionem remedii aut neglectu, aut studio, procrastinando.

Inspiciendi hujus cadaveris facultatem, ut Cap. 3. jam monui, omni modo quærebam. 1. Ob dubia quæpiam, quæ in Hydrope pectoris ejus occurrebant, ut Cap. 3. §. 2. monui. 2. Ob vires indagandas *Ononidis*, utrum nempe egisset modo, ut Uva Ursi, symptomata auferendo, an vero tollendo ipsam Diathesin. 3. An, quia cessantibus calculi doloribus, pulmo ægrotare cepit, calculosa Diathesis pulmonem obsideret, ibidemque primo Asthma, deinde Hydropem pectoris, creavisset. Eximius Medicus Aulicus Nobilis a *Hentschel*, qui tanta cum laude inclytæ Facultatis Decanatu integro triennio functus est, & quocum aliquoties super hoc morbo in consilium vocatus fueram, venam incidendi procuravit.

Ad prima dubia circa Hydropem pectoris respondi cap. 3. pag. 43.

Quoad alterum, nihil aut calculosi, aut degeneris, in toto systemate urinario invenimus; id modo notabamus, quod Ren dexter quadruplo major, cum naturali uretere, sinister Ren quadruplo minor mole esset. Ad tertium dubium quod spectat, pulmones flaccidi quidem, lividique erant; at vero quacumque in plaga examinati, nihil gerebant calculosi, aut calcarei; neque unquam in vita quid simile sputis reddiderat.

An ergo *Ononis* Diathesin calculosam, expulsis jam antea, qui aderant, calculis, penitus emendavit? sustulit? Nunquid repullulantem eandem Diathesin ad remedii neglectum, idem mox suppressit? Multiplico experimenta, sed nondum certi quidquam determinare possum.

*Raphani Hortensis* succum cum oleo sumtum pag. 92. vidimus bimestre tempus tolerabile reddidisse calculoso. Erit & hoc in aliis tentandum.

§. III. Laudanda hic *Verbena* venit, seu *Verbenaga* dicta, *Verbena communis flore ceruleo*, *Verbena recta* C. B. P. 246.

Ga-

*Galenus* de comp. med. sec. loc. Libr. 2. Cap. 2.  
 „ Omnium porro maxime discutit, & perfecte roborat,  
 „ *Verbena Recta* περιζερῶν. ὁ ὀρθός maxime viridis,  
 „ imo & arida, cum Radicibus, & simul cum serpillio  
 „ oleo incocto . . . . quin & ipsam per se *Verbenacam*,  
 „ si oleo incoxeris, caputque inde rigaveris, omni capi-  
 „ tis dolori antiquo, ex frigidityte, aut ex crassis hu-  
 „ moribus oborto, medeberis.

*Archigenes* inter περιάπτα hanc herbam recensuit,  
 quod & posteriores; *Galenus* vero improbavit id. „ Li-  
 „ berat, ait, a capitis dolore, dicit *Archigenes*, *Verba-*  
 „ *naca herba*, quam aliqui *sacram* vocant, tum coronæ  
 „ modo circumposita, tum illita ex Rosaceo & aceto:  
 „ hoc auxilium oportebat eum non nunc inter Amule-  
 „ ta, sed prius inter medicamenta referre; siquidem re-  
 „ vera ei confidit, per longam experientiam cognito &  
 „ probato.

*Dioscorides* Libr. 4. Cap. 50. 51. *Herbam sacram*, quam  
*Amuleti* vice adhibent, aliam *Verbanacam*, sive περιστε-  
 ρῶν intelligit, non illam *Rectam*.

Cæterum *Dodonæus* *Verbenam* sive *Verbenacam Re-*  
*ctam* statuit illam esse, quæ capiti applicata, ejusdem  
 medeatur doloribus.

*Platerus* Libr. 2. Cap. 3. pag. 243. edit. in 4. eodem  
 modo, quo *Dodonæus*, loquitur.

*Forestus* L. 9. in Schol. ad Obs. 52. „ Famulus qui-  
 „ dam capite supra modum dolebat. Cum nulla reme-  
 „ dia juvarent, tandem ad collum *Verbenam* viridem ali-  
 „ quo modo tritam, ut ab adstantibus non cognoscere-  
 „ tur, appendebam, idque nocte, dormienti, & inscio,  
 „ antequam malum invaderet: & adstantibus mandabam,  
 „ ne æger, a somno solutus, herbam collo suspensam di-  
 „ moveret: qua hujus herbæ solius suspensione, miraculi  
 „ instar hic æger curatus est. *Verbena* a collo suspensa  
 „ amoveri non debet, nisi exsiccata tandem per se cadat.



Et in prax. Chyamiatr. Joan. Hartmannus. „ In  
 „ omni dolore capitis tanquam Arcanum appropriatum,  
 „ Aqua *Verbena* destillata commendatur, sæpe assumpta  
 „ ad unc. iv. cum gtt. iv. Spir. Vitriol. juvat etiam *Ver-*  
 „ *vena* tota contusa, & capiti imposta.

J. B. Montagnanus Consil. 20. *Verbenam* quoque inter cephalica laudat. Cum hæc de *Verbena* invenissem, adplicui eandem juvenulæ, cujus casus paulo altius repetendus est, ut medicamenti hujus pateat efficacia.

Hæc femina 25. annos nata, venit ad me 2. Julii 1760. præ diuturno & intolerabili capitis dolore petitura consilium. Mater narrabat, hanc suam filiam ex brachio ancillæ cecidisse, capite in terram alliso; natum inde apostema, & copiosum pus auribus effluxisse. Deinde sexto vitæ anno variolis eam decubuisse adeo malignis, ut tota fere cutis capillata capitis suppurando secesserit. Non recte memoria suggerit matri, utrum lapsui memorato, an remedio ignoto, quo cito caput infantis suppurans post variolas exsiccaverit, causam, originemque cephalææ tribuere debeat; cum infantes minus soleant conqueri, & an tunc aliquando puella conquereretur, penitus oblita sit. Cæterum, post variolas meminit mater, post suum decimum annum meminit juvenula, dolores capitis frequentes, dirosque adfuisse, verum usque ad 19. ætatis annum eosdem tantum unico sævisse die, nocte siluisse, diebusque insequentibus pluribus, numero incertis; eodemque annorum spatio frequentissimos vomitus ac narium hæmorrhagias, capitis doloribus junctas fuisse, eadem forsitan de causa brevioribus, rarioribus. Ab anno vero ætatis 19. graviores capitis dolores, diuturnioresque sævisse, cum longe rariore vomitu ac hæmorrhagia. Ab elapso biennio incepisse vomitus fieri violentos, æruginosos, quos emetico, ac purgantibus & tunc sustulerit, & semianno deinde, cum redissent. Modus porro doloris sic se habebat nunc: Cephalæa totum quidem caput obsidebat; sinistro vero in latere vehementius; cum auditu gra-



vi, & tinnitu auris sinistrae, cum colli dolentis, pulsantisque, Emprostotono, quando erecta est capite, haud ita quando decumbit. Tussim quoque siccam conquerebatur, cor palpitans, insomnes præ doloribus noctes, in quartum & quintum diem retardantem alvum; menses a 19. anno ætatis regulares quidem passim, spatiumque 6. 7. 8. dierum fluentes, at paucos eosdem, pallidosque; cæterum non dolentes fere; quamvis caput sub idem tempus gravius doleret. Post ultimos æruginosos vomitus a mense Novemb. 1759. ad Apr. 1760. lecto hæsit, acerbitate dolorum, affixa. Paulo ante, quam ad me accederet, dolores vehementer post venæ sectionem increverant.

Hac Anamnesi sic adornata, & tempore meo elapso, dedi ipsi purgans, quo præ alvo obstructissima egebat, & jussi posthac rediret, ut adæquatam, si fieri posset, indicationem formarem.

Non rediit porro, nisi quatuor elapsis integris postliminio mensibus, eo quod præ doloris perseverantia domo exire haud potuisset. Hinc eam de salute desperandam blande erexi, in Nosocomio servavi, ejusque occasione Dissertationem coram Medicinæ Studiosis feci, in qua a nata Medicina, in nostra usque tempora, hujus morbi causas, Symptomata, Diagnosin, Prognosin, & Curationem, expiscatus, prosequutusque sum; & circa quam ab ipso Januario usque ad Ferias majores iidem Domini Studiosi hebdomadali Disputatione inter se se disceptarunt.

Applicatis quibuscumque causis morbi, quas Anatomæ unquam, observatioque detexit, ad casum datum, conclusimus, Cephalæam protopathicam esse, eandemque vel ex Encephali suppuratione post lapsum, vel ex maturiore capitis post cutem capillatam suppurando ablatam exsiccatione, trahere originem. Equidem in Ventriculum nonnulla, fateor, suspicio cadebat, quia toties vomitus contigerat, isque post emetica Cephalæam sæpius



sedasse visus erat; verum contra, ventriculus insons ab Encephalo affecto in consensum rapitur, docentibus id manifesto capitis contusionibus, & vulneribus. Præterquam quod haud raro contingat, ut causa in capite hærente proritetur ventriculus in vomitus bilis flavæ, porraceæ, isatodis, aruginosæ, (quemadmodum etiam nostra ægra aliquoties vomitu reddiderat,) a qua, inter plicas residua, ventriculus posthac leviter expurgandus sit, ni velimus eum ægrotare.

Prognosin ambiguum feci, ob morbi diuturnitatem, atque altius irradicatam ejus causam. Quum tamen Artis industria ejusmodi desperatas fere Cephalæas aut egregie mitigatas, aut etiam penitus curatas fuisse constabat, varia auxilia vario ordine admovi.

Ac primo quidem arridebat Setaceum ad Nucham, quo quandam revulsionem procuraremus; eundemque in finem data sunt purgantia Hydragoga bis in septimana, dum interea Spir. Frumenti cum sublimato, & larga Bardanæ decocta cum lacte, ad humores veteres emendandos, novosque regenerandos, perpetuo darentur. Primis 20. diebus, nihil inde, postmodum vero tantopere lucrata est, ut primo integro, dein binis, ternis, pluribusve diebus, Cephalæa vacaret, ac tandem integris 5. septimanis prorsum libera, ac sanissima esset. Petivit dimitti, & remedia sibi dari, quibus domi continuatis, corpus contra recidivam muniret. Jussa igitur eadem continuare, & bonam setacei curam habere, 24. Jan. 1761. dimissa est.

Domi sana, horum usu, sex septimanis vixit, sed dein in Cephalæam diram remittentem quidem, sed nunquam intermittentem, relapsa, ad 3. Martii denuo intra Nosocomium recepta est. Cum antiquis remediis minus feliciter continuantes, cetera Artis auxilia ordine admovimus.

Ac primo quidem Hirudines plures ad tempora, frontemque adhiberi curavi, quæ cruoris quidem sufficientem copiam, iterato ad 4. usque diem in pleno Auditorio



experimento, eduxere, haud juvarunt tamen. Unde 2. Cucurbitas tum siccas, tum scarificatas, adposui, fronti, vertici, temporibus; idque ad tres vices, cum debita cruoris evacuatione. Nihil inde opis. Igitur 3. auxilium a Vena jugulari secta expetivimus. Etiam hinc spe frustratus 4. caput rasum emolliente Cataplasmate totum fovi quatrIduo; quod practici jubent eo consilio, ut ajunt, ut apertis futurarum poris via panderetur, qua prava de Encephalo exhalarent. Arteriotomen non feci, quia ea & per Hirudines, & scarificatas Cucurbitas, sufficienter facta erat. Quinto Empl. de Meliloto cum  $\frac{1}{4}$  Emplast.

Vesic. mistum universo capiti octiduo spatio admotum est; quo inde madente, ac stillante, pauxillum principio, nihil levaminis postliminio, percepit. Sexto *Bartholini* consilii memor, qui in *Anglia* didicerat antiquas Cephalæas curari, datis quotidie aliquot guttis liquoris, qui adulta hyeme de vulnerata radice arboris *Juglandis* exstillans, appensa excipitur lagena, etiam hunc succum Puellæ non ad guttulas, sed ad duas de die uncias spatio 14. dierum, dedi.

Nihil ergo tot, tantisque proficiens, tandem *Verbenam* adhibui. Hæc 13. Aprilis sicca appensa collo est, & a 25. Aprilis recens collecta; tum & aqua ejusdem stillatitia ad unc. IV. de die cum gtt. IV. Spir. Vitrioli, data est. Subitum sane inde levamen habuit, subitoque integram doloris absentiam, sine ulla vel unius diei recidiva, spatio primum duorum mensium. Tumque ipsi, indicanti mihi, quod semper ad sinistrum oculum punctum dolens superesset, quem olim Spir. Frumenti cum sublimato sublatum meminisset, internum Verbenæ usum detraxi, spiritumque hunc substitui. Continuavit domi suæ Spiritum, & Verbenæ Amuletum, ad diem 6. Julii, quo Cephalæa rediit, dira adjuncta Cardialgia, & vomitu frequenti, cum brachiorum introtorsione inter vomendum. Purgantibus, scuto stomachico, paregorico,

per-



nervinis roborantibus, & Verbena capiti adpenſa, integre convaluit ſub finem Julii, & bene hucusque habet.

§. IV. *Aurantiorum folia* usum in Medicina pulcrum habent. Eximius Medicus, vetus meus, candidissimusque amicus, *Haganus Poliater, Abr. Westerhoff*, plusquam elapso abhinc anno, coactus fuerat splendorum personarum hortatu, remedium quoddam arcanum suscipere, ea onerosa lege, ut quid esset, id, nisi consentiente Autore, nemini patefaceret. Cum Amicorum omnia communia sint, mihi aliquam ejusdem copiam fecit, ut data opportunitate in morbis convulsivis, in quibus non semper, sed sæpe, mirifice prodest, nocet vero nunquam, ut expertus testabatur, vim ejusdem explorarem. Offerebat se se mense Januario currentis anni apta occasio. Puella 18. ann. quam Materna AUGUSTISSIMÆ liberalitas, ut multos alios centenos pueros, puellasque, clam alit, convulsiones patiebatur adeo miras, adeo horrendas, ut rarissimi sane exempli essent, utque nullum genus convulsionum notum sit, quod hic non adesset: nulla pars corporis libera mansit, & nova atque insueta Symptomata scenam hanc terribilem fere quotidie mutabant: projectumque in altum corpus fuit sic, ac si fortissimi viri illud in sublime projicerent. Spatio 3. septimanarum quidquid Artis, quidquid experientiæ esset, indefessa opera adplicaverat Veteranus Medicus, expertissimus Practicus, Dominus *ab Hentschel*, sed frustra. Cum AUGUSTISSIMÆ mandato optimo huic viro jungerer, totamque pene Artem exhaustam frustra cernerem, subit ilico Arcani memoria. Collegæ narro innocuum per se, at stupendum quandoque medicamentum. Annuit. Damus. Quid plura? Scrupuli unius dosi cum posu Chocodæ mista primo die, quæ 12. horis integris perseveraverant convulsiones, trihorio finiuntur; altero die semihora, tertio vix umbra levis malorum, prætereaque nihil; cito autem vires redire, corpori sua, mentique alacritas. Scrupulum tamen pulveris quotidie dedi ad 14. diem usque. Exinde semper sana fuit.



Industria ac dexteritate sua celebris, Ocularius *Wincel*, dum hac hyeme suam cataractas extrahendi artem, tanta cum laude *Viennæ* exerceret, agebat Arcanum illud *Hogani* nonnisi folia *Aurantiorum* continere, & decocti quidem forma ad Chocoladam componendam adhiberi; at vero pulverem e foliis hîsce paratum quoque simili potui admisceri posse, ac prodesse. Cum id tot rationibus asseveraret, curavit Ill. D. *Præses* magnam copiam foliorum ubique colligi, & ad omnia Nosocomia, Orphanotrophia, Gerotrophia, Ptochotrophia mitti, ad experimenta capienda. Dedi pulverem desperato Epileptico ultra mensis spatio, sed incassum. Itidem puellæ, choreæ *S. Viti* reliquiis adhuc laboranti, pulverem hunc frustra longo tempore dedi; posthac vero, cum *Hagani* pulveris decem superstites scrupulos eidem decem diebus dedissem, penitus convaleuit. An ergo in *Hagano* pulvere quid admistum aliud? Nunquid ex tot *Aurantiorum* speciebus determinatam speciem *Haganus* habet, quæ veluti præ reliquis *Aurantiis* specifica esset? An vero, si idem sit, hic contigit, quod sæpe, ut principio vix quid Medicina præstet, in fine autem juvet egregie? Usus docebit.

Decoctum illud, unde Chocolada paratur, distante nobis egregio *Wincel*, sic & fit, & datur. Fol. 30. 36. *Aurantiorum* cum libra aquæ coquantur ad  $\frac{1}{2}$ . consumptionem, potumque Chocoladam inde formatum egri bibunt, repetendo post 4. aut 5. dies idem. Præparata autem corpora volunt, triduo usu aquæ mellitæ, & dein purgantē: altera tunc die post purgans exhibent hoc medicamentum. Alii descripti decocti tertiam partem tribus subsequētibz diebus dant cum Chocolada, quam sine adjunctis calidis esse jubent. Suadentque illi in lecto hunc potum sumere, & bihorio deinde quiescere. Porro & ternos hos potus matutinos, & prævias purgationes, toties esse repetendas, quoties id exigit pertinacia morbi.

Opti-



Optimus Medicus, integerrimus Amicus, Senator & Poliater *Haganus C. H. Velfe*, communicavit mecum hanc Decocti formam. ℞. Fol. Aurantior. N. 120. ( id est circiter unc. j. & dr. vj. ) in Aq. pluv. unc. xx. decoque spatio 2. vel 3. horarum, vase clauso; colato adde vini rubr. unc. x. Sacchar cononid. q. s. ad gratiam. Sumat æger bis, ter, quater, prout necessitas jubet, unc. iij. iv. quotidie, aut solas, aut mistas cum levi Choccolada. Testatur idem hocce remedium mire reficere, & roborare ægros; egregie aliquando *Colicam Pictorum* mitigare; Colicæ hujus sedare vomitus; & quæ Purgantia, atque Opiata hactenus operata non essent, ope decocti nunc operari. In Hystericis Convulsionibus necdum multa experimenta se habere, reticere se tamen non posse. Notabilem casum biennis Infantis, fatui, ut videbatur, futuri: qui anni ab illinc spatio levioribus Convulsionibus quotidie vexatus; a semianno clamoribus convulsivis, nonnunquam Epilepsiæ, quandoque Catalepticos, contortus symptomatibus; sumserat ter die quid hujus Decocti spatio 20. dierum citra levamen notabile, posthac vero eo cum effectû, ut elapso demum mense ne umbram quidem morbi amplius haberet; hilarisque idem, atque ingenuus, adpareret.

Profecto hujus efficaciam decocti mirificam, & ego expertus fui in viro quinquagenario, qui post hemiplegiam in horridas faciei convulsiones 20. 30. una die repetentes inciderat. Junxeratque se se ea memoriæ lates, ut noscens, qui accederent, omnes, noscens omnia, quæ videret, tangeretque, tamen nomina indere propria ipsis non posset, passimque per omnia balbutiret: & quamvis gallice, aut italice, interrogatus, si quid utcumque intelligibile responderet, id germanice duntaxat, præter omnem sane morem, fuit. Unc. ij. quovis bihorio decocti datæ, sensim notabiliter mutarunt, tandem spatio sex dierum integre sustulerunt hunc morbum, cum omnibus suis stupendis symptomatibus, omnesque restituerunt functiones.



Puella 16. annorum febre scarlatina correpta mense Septembri anno 1760., dein convulsione 7. Octobr. latere dextro paralytica facta est, & perfecte aphona. Cum nihil consueta Artis auxilia juvarent, misit eam Ill. Præses ad meam Machinam electream. Pauxillum quidem spatio 6. mensium lucrabatur, ut articulare voces quasdam potuerit, ut etiam paralyssis minueretur; verum pauca illa emendatio cum non augeretur, dedi tria decocta Aurantiorum, posteaque pulveres, interea dum ad Machinam diligenter quotidie accederet. Mensis spatio sic pergens, lucratur voce incredibiliter; ut nunc spes sit ejusdem restituendæ, & paralyseos penitus curandæ. Observatio hæc incitavit me, ut cunctis, quibus vim electrinam nunc adplico, simul pulveres fol. aurant. darem, visurus an plura exempla colligere queam felicioris successus vis electrinæ ope horum.

In Epilepticis nec decocto, nec pulvere foliorum, aliquid hucusque profeci; data tamen occasione repetam experimentum, cum audio id aliis succedere. In tremore post terrorem superstite videbar primo victor morbi futurus, deinceps vero minime, tandem vero iterum multum. Vidi a laudatissimo Physico Nosocomii civici *Schreibers* homini, choream *S. Viti* ab annis pessime habenti, idem ultra mensis spatium dari, cum aliqua duntaxat emendatione in principio, ita ut levior illa emendatio non augeretur, licet idem decoctum longo temporis spatio continuaretur: fatendum est tamen inceptam illam emendationem constanter permanere.

Porro indigebit remedium istud, ut & *Verbena*, pluraque alia, maturiore ac diuturniore examine, priusquam quid certi circa idem concludatur. Nunquam enim in similibus tentandis, evulgandisque sufficienter cauti esse possumus. Coævis scribimus, & posteris. Hi, institutis iidem experimentis, aut eadem, quæ nos; aut aliter, quam nos; aut nihil omnino, quod nos; videbunt. Si nos rite, casteque, & prudenter, nostra notaverimus, tam fausta, quam



quam adversa, quam inutilia, quam imperfecta; profecto dum Coartanei, serique Nepotes, eadem prudentia experimenta nostra repetiverint, idem, quod nos, semper adnotabunt.

Hoc demum modo Canones formabuntur practici, qui limitent morbos, gradusque morborum, in quibus profit, non profit, noceatve, medicamentum. Sin vero aut perfunctorie, aut nimis glorianter, aut immeritæ cupidine famæ, experimenta evulgaverimus, consequetur necessario id, ut nos, & præsens ætas, & posteritas, jure condemnent. Remedium sustulisse morbum videri potest, nec forte sustulit: ut si alia simul data fuerint, quæ emendare morbum potuerint; aut si periodici morbi sint, ut plures Cardialgiæ, Cephalææ, Hemicrania, Arthritides, Rheumatismi, &c. qui vel sponte, vel mutatis aëre, vitæ genere, alimentis, vel naturæ opera, aut mitigentur, aut fileant, aut penitus sæpe superentur. Securos quoque nos esse oportet, quod ægri summa ac curatione remedium adhibuerint; quodque non clam alia aut prætulerint, aut intermiscuerint saltem, & tamen ne forte irascamur, neve illi careant nostra amicitia, gratia, patrocínio, tribuant nobis gloriam curæ. Hæc ut mihi contingere, contingunt & cæteris.

Hinc monitos Lectores meos volo, ut quæ observata communico, ea novis dignentur experimentis urgere, sique forsitan violasse hinc inde prudentiæ regulas videar, ut id publico meo etiam expresso nomine, palam faciant. Erit profecto unde gratias illis perpetuas agam. DEO vivimus, & proximo; vivimus veritati, non patri fallaciæ & mendacii, diabolo.

§. V. Quæ Priscis Anti-Epileptica dicta, *Pæonias*, *Valeriana Sylvestris*, *Viscus quercinum*, pluribus experimentis etiam hoc anno factis, vere Anti-Epileptica esse novi, docui, demonstravi; at vero aut modicæ, aut nullius omnino efficaciam esse, in multis, imo forte crebrioribus in casibus, quoque expertus dolui. Hi tamen

casus non derogant illis, modo suos intra limites singuli  
coerceantur. *Valeriane Sylvestris* in *Fabio* efficacia effecit  
forsitan, ut debito celebrior illa inclaresceret; utque fal-  
lax sæpius, vilesceret multis. Mansit tamen, æternum-  
que *Anti-Epileptica Planta* manebit, suis determinatis in-  
officiis. Suspicio simile quid fore de *Aurantiorum* foliis.



ANTONII DE HAEN

S. C. R. A. MAIESTATIS CONSILIARII ET ARCHIATRI  
NEC NON MEDICINÆ IN HAC ALMA ET ANTIQ.  
UNIVERSITATE PROFESSORIS PRIMARIJ,  
SOCIETATIS MAARLEMENSIS SOCIJ,

PARS SEPTIMA

RATIONIS MEDENDI

IN NOSOCOMIO PRACTICO,

*Quod in gratiam, & emolumentum  
Medicinæ Studiosorum*

C O N D I D I T

MARIA THERESIA,

AUGUSTISSIMA ROMANORUM

I M P E R A T R I X,

HUNG. BOHEM. &c. REGINA &c. &c.



L U C Æ M D C C L X V.

---

Ex Typographia Jacobi Justi,  
S U P E R I O R U M P E R M I S S U.

# ANTHONY DE HAEN

THE ... OF ...  
... ...  
... ...

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..



... ..

... ..



2

SACRÆ CESARÆE, REGIÆ, APOSTOLICE, MAJESTATI,  
AUGUSTISSIMÆ ROMANORUM  
IMPERATRICI,  
HUNGARIÆ, BOHEMIÆ, DALMATIÆ, CROATIÆ,  
SCLAVONIÆ, &c. &c.  
REGINÆ,  
ARCHIDUCI AUSTRIÆ, &c. &c.  
MARIÆ THERESIÆ,  
DOMINÆ SUÆ CLEMENTISSIMÆ,

ANTONIUS DE HAEN.

**P**Ro innumeris beneficiis, quibus MAJESTATI TUÆ placuit me in nonum jam annum, potissimumque hoc ultimo elapso, gratiosissime cumulare, cum, quod rependam, non  
ha-

*habeam, id, quod præter memetipsum TIBI dicatum totum, habeo, gratus rependo, deponendo ad pedes Throni TUI septimum annui laboris Tomum; qui, quantos ad excolendam, ditandamque, cum Medicinam, tum Chirurgiam, animos adhibuerim, addiscendique utramque Medicinæ studiosis copiam longe uberrimam fecerim, sponte patefacturus est. TUA ejusdem, AUGUSTISSIMA IMPERATRIX, approbatio efficiet, ut in posterum eandem adhuc, si tamen id possibile sit, merear auctiorem.*

Dabam 9. Novembriſ  
1762.

ELEN.



# ELENCHUS CAPITUM.

## C A P. I.

De Aneuryfmate externo Spurio.

## C A P. II.

De Aneuryfmate vero.

## C A P. III.

De Hydrope Cyftico, & de Hydatibus.

## C A P. IV.

De Intestino in Inguine perforato, ex-  
crementisque inde foras expulſis.

## C A P. V.

Varia.

CAP.







## C A P U T I.

### De Aneurysmate externo Spurio.

§. I. *Aneurysma spurium in Brachio, a Missione sanguinis natum, Compressione curatum. Biga observationum adjungitur, quæ quantumvis per se simplices, & cuique obviæ censerî possint, ob frequentem nihilominus earundem in Clinicis neglectum, nova commendatione indigent.* §. II. *Aneurysmatis Spurii Trunci ipsius Arteriæ Femoralis, inflictæ vulnere nati, Interceptio. Gangrænæ, & Sphaceli, assiduo, diuturno, copioso, ac, ni fallor, citra Exemplum hucusque interne, externeque dato, Cortice Peruviano, felicissima curatio.* §. III. *Apologia Corticis adversus ejusdem detractatores, audaciorisque nostræ eundem exhibendi dōsis.* §. IV. *In Urinam plurimo curæ tempore a nostro vulnerato redditam, quedam observationes, ea intentione collectæ, ut constaret, an in Diagnosi ac Prognosi quid lucis afferrent, nec ne?* §. V. *Disquisitio num Fungi Agarici ad arteriæ vulnus non modo lamellatim facta adplicatio, verum etiam ejusdem pulveris per totum vulnus conspersio, laudanda sit?*

§. I. **P**ericulosissimi hujus, frequentisque Chirurgici morbi, plura exempla dedi in hujus Operis *Tom. IV. cap. 2. Tom. V. cap. 6. & Tom. VI. cap. 4.* Fausta-que simul & infausta nostra conamina communicavi. Septimum hunc Tomum ab eodem argumento, quod Annus Academicus nova eidem argumenta suppeditavit, auspabor.

Anno 1761. Nov. 10. Instrumento resiliente Balneator Pictori 25. annorum, pectoris ardorem & raucedinem conquerenti, venam tudit; mirante ægro, quod momento temporis tria vasa replerentur, vimque proficientis cruoris Chirurgus ægre retunderet. Tumens porro præ validiore compressione brachium, spiritu quoque fricare ille jussit, effecitque inde ut artum, a tribus retro septimanis immobilem, fauciatus iterum flectere, artemque pictoriam, quamvis non expedite, tamen exercere posset. Quem interea Balneator solabatur integræ spe curæ, quidquid supererat impedimenti a Lympha duntaxat, quæ ad Venæ, Cutisque vulnus afflueret, oriri ratus.

At vero contrarium expertus est homo infelix, tumore intra 7. aut 8. septimanarum spatium, ovum gallinaceum mole referente. De eventu sollicitus, adiit 5. Jan. hujus, quem vivimus, anni, Exp. D. Reutter, Chirurgiæ Doctorem, Virum curis, experientiaque clarum; qui postquam in decimum diem Machinam comprimentem externam frustra adplicuisset, hominem demum meis curis commendavit.

Origo mali, ac progrediendi modus, Aneurysma spurium esse declarabant. Carebat tamen pulsatione, nec non motu illo tremulo, de quo Tomo IV. egi: verum nos, ab effuso cruore, eodemque coagulato, per brachii cellulositatem, pulsum perceptionem, tremulumque motum, suffocari conjecimus.

Die Jan. 16. dexterrimus Chirurgiæ Professor Leber, operationem peregit; præsentibus Magnifico Domino Archiatro, & inclytæ Facultatis Medicæ Vice-Præside Kestler, egre-



*De Aneurysmate extern.*

egregio Medico, & sollertissimo Nosocomii Civici Physico, *Schreibers*, Chirurgo S. S. M. M. *ab Hombourg*, Chirurgiæ Doctore *Reutter*, Aulico Chirurgo *Fischer*, Doctissimo, ac plurimæ spei Chirurgo, *Scherer*, aliisque pluribus Medicinæ, Chirurgiæque cultoribus.

Dilatato fursum, deorsumque vulnere, globosum corpus apparuit, ambiguum utrum tendo Bicipitis brachii esset, an membrana fortis, quam validior brachii compressio ex membrana cellulosa formasset? Non esse tendinem, sed compressione natam membranam, plura mox evincebant. 1. Tendo si fuisset, oportuisset illum a cohæsione sua naturali cum cute, ope cellulositatis genita, solvere: verum stylus libere intrabat fursum, deorsumque. 2. Amotis integumentis debuisset brachium extentum quoque tendinis extenti rigiditatem ostendere; verum id neutiquam. 3. Amotis integumentis figura rotunda erat, hemisphærii, extrorsum versi, instar, atque ad superiorem partem subito declivis; ut evidenter adpareret de tendinea expansione nihil superesse. 4. Si tendo fuisset cruori coagulato superextensus, tumore utique, dum brachium extendebamus, comprimere debuisset; at vero tumor æque globosus esse perseveravit. 5. Facta levi tumoris incisione, & vulnere dilatato in longitudine, necessum fuisset, ut porrecto in longitudinem brachio apertura clauderetur; verum ea mansit æque aperta. 6. Educto cruore, nulla tensio partis aderat, dum arteriam vulneratam quærentes, brachium vario modo extendebamus: porro si Aponeurosi inclusisset tumorem, aperturam longitudinalem a nobis factam, extento brachio, claudere debuisset.

Igitur tumor ipse cum sua membrana exacte sic se habuit, quemadmodum *Rat. Med. Tom. IV. pag. 29. & seq.* exposui. Nempe sanguis arteriosus in cellulositatem illam, quæ Arteriam, Venam, Nervumque, laxè colligit, effusus, eandem dilatat, extendit, expandit, in crassiorē compingit membranam; eoque facilius, quo Chirurgus tum diutius, tum fortius, brachium compresserit. Scili-

cet vis cruoris, arteriæ vulnere pulsi, locum foramini proximum ampliat, cellulositatem removendo, & cavum quoddam format, quod ideo hemisphærium refert, quia cellulositas in extremo circulo tumoris ad arteriam arcte adpressa & agglutinata, coivit cum eadem. Saccus proinde sic producitur clausus. Si vis sanguinis non solvat hanc in ambitu cohæsiorem, durum trumbum formare cogitur, arteriæ foramen ita demum obturantem, ut effluere queat nihil. Atque ita sola compressio externa, citra ullam loci aperturam factam, perfecte Aneurisma curat, ut *Tom. IV. pag. 29. & seq. exemplis demonstravi*. Sin vero profilientis de vulnere sanguinis vis tanta est, ut sacci cellulosi, per ambitum cum arteria accreti, plagam forte debiliorem solvat, aut laceret, sanguis effunditur per adiposam membranam, inter, sub, supraque musculos, cutem elevat, citoque ita putrescit sæpe, ut brachium, imo aliquando totus homo, sphacelo pereat. Unde cita operatione tunc opus esse intelligitur. Ita femina *Tom. IV. pag. 27.*, ut & *Tom. V. Cap. 6.* sic etiam pictor noster.

Igitur incisa globosæ hujus massæ membrana, prodiit sanguis congrumatus, isque haud de sacco duntaxat, verum ex lacerato ambitu sacci versus brachium superius & inferius olim effusus.

Eluto vulnere, & laxata tortili machina, videbamus videre Arteriam mox supra bifurcationem sauciatam, & quidem ab interno suo latere. Utique Resiliante Chirurgorum instrumento vas sic vulnerari potest.

Videbamus, inquam, videre: nam cum arteria & ante bifurcationem suam, & post eandem, emittat ramos plures, decipere nos posset ramus oriundus ex Arteria cubitæa, si ille forte adpareret solito amplior. Hinc in Aneurysmate cum plurimo sanguine effuso, ubi longiore incisione opus, accuratius rem hanc definimus, minus accurate in incisione breviori; ut in casu præsentis: quatuor enim pondere uncias eductus non superabat cruor. Fatendum tamen est a magnitudine arteriarum, trunco quo-



quodam prodeuntium, conjecturam probabiliorem sapius reddi.

Laterale arteriæ vulnus suspensos tenuit animos, utrum Agarico, & Compressione artificiosa, in vasis latus forte minus premente, hac comprimendi methodo uteremur: an vero tutius Interceptione? Attamen mira Agarici virtus, qui etiam in pulverem versus adplicari ubique possit, atque cum vase veluti conglutinetur, vota Adstantium in consuetam compressionem nostram vertit: ea tamen lege, ut filo munitæ acus perpetuo ad manus forent, ad arteriæ interceptionem, minus prosperante compressione, faciendam.

Chirurgus igitur parva, eademque rite complanata Agarici lamella, vulneri imposita, me suadente, vicina per ambitum loca ejusdem pulvere contexit, nec non etiam vulneris ambitum omnis; siquidem alias ea vasa, quæ ex Arteria, vulneri superiore, nascuntur, hæmorrhagia haud raro turbant, labefactantque apparatus. Postmodum stratum, ut ajunt, super stratum, ampliores sensim Agarici lamellas imposuit, donec, quæ imposita duodecima erat, debitam monstraret altitudinem, quam deinde plumaceolis siccis, compressisque admotis, idonea ligatura firmabat.

Manus frigerat sub operatione: at vero illa post operationem mox fota calido vino & aqua, intra horam calere cepit. Bihorio elapso testabatur æger admodum leve sibi toto in brachio esse, doloremque perquam tolerabilem. Caluit bene manus, pulsusque percipi in carpo ceptus. Nemo sane horum, quos in nosocomio similes curavi, tolerabilius ab hac operatione habuit; nunquam inquietus, vix unquam febricitans, noctibus gavisus tranquillis, adpetitu pollens, contentum perpetuo & tranquillum testatus animum.

Ad 5. diem, (hyems quippe erat,) prima deligatio facta est. Sanguis ex ambitu vulneris transfudans, apparatus parumper maculaverat, & etiamnum, amotis plu-

maceolis, effluebat aliquantillum: Agaricus vero suo fixus in loco inventus est. Hinc vulnus, ut prius, deligavimus. Excoriatio tamen cum exulceratione nata a tortili machina, solvere hanc, prospicere illi, aliamque machinam admoveere, suadebat. Quo in opere læti deprehendebamus, quod ablato per aliquot minuta toto hoc vinculo, vulneri ita inhæreret Agaricus, ut nihil de vulnere effluxisse apparatus doceret.

Die ab operatione octavo altera, die undecima tertia deligatio facta, Fungi optimam adhæSIONem, laxata etiam machina tortili, ostendit.

Die 15. incipiente, nempe 30. Jan. in quarta deligatione totus cecidit Agarici acervus, laxataque machina nihil de vulnere exiit. Novas tamen lamellas eidem, majoris securitatis gratia, imposuimus.

Biduo exinde elapso novus excidit de vulnere Agaricus. Vulnus optimum undecumque. Agaricus alius impositus. Laxata machina tortili ne gutta sanguinis effluxisse visa. Exin quovis die deligatio. Agarico iam tertium elapso, novum non substituimus; inchoantem undique incarnationem, ita dictam, impediturum rati. Ineunte Martio optima Cicatrix. Martio circiter medio domum sanus repetiit, serio monitus, ne integro biennio hoc brachium ad gravius aliquod onus tollendum, laboreve validiores perferendos, adhiberet; prætereaque quovis 14. die me conveniret examinandi causa. Redeuntem sæpius in sanitate perseverantem deprehendimus.

Observationem practicam hic oportet geminam adjungere. 1. Licet, qui hanc operationem subierint, longiore tempore lecto affixi, alvum vix egerant, non est tamen, quod nos sollicitos reddat; eo quod solo jure carniæ cum optimo pane nutriti vix sibi coacervent fæces. Fracto crure citra detrimentum homines mensis, & ultra, spatio, alvo inculpate carent. Imo præstat raram habere eandem, ne frequentiore corporis ad egerendum motu solvatur apparatus, artusque flectatur. Utique noster homo,



mo, ad 13. diem usque, nec natura ad alvum sollicitatus, nec per artem admotus fuit. Cum autem ad 13. diem nonnulla desidendi conamina adverteret, supposito-rio immisso posuit alvum siccam, copiosam; non in excipulum, fellamve perforatam, sed in supposita linetamina, ne motu facto deligatio brachii quid pateretur. Alteram alvum septimo postea die, supposito-rio iterum adiutus, reddidit; ex quo vero plenius nutriebatur, sponte & quotidie.

Altera observatio practica circa cautelam versatur, quæ in ægris; diuturniore tempore lecto affixis, excoriationem, gangranam, & sphacelum averruncet; cautelam, quam hinc inde observo in ægrorum damna haud satis adhiberi. Toto octennio, & quod plus est, ex quo ægrorum publicam gessi in Nosocomio curam, nulla unquam visa est partium excoriatio; eo quod diutius decumbentibus, sive Acuto morbo, sive Chronico, sive Vulnere detentis, tota corporis, qua incumbunt, parabis die, unguento molli lavetur; composito ex albomine binorum ovorum, quod primo bene conquassatum, dein modico igni, quo leviter incalescat, impositum, continuo-que motum, sensim, ac guttatim fere, cum unciis vj. spir. vini commiscetur. Prudentes ægrorum nostrorum Custodes norunt etiam his, qui citra piaculum verti in latere nequeant, postica corporis innocue inungere.

§. II. Ordine secundus, qui sequitur æger, multam suppeditat tum medicam, doctrinam, tum chirurgicam: ac præterea docet quantumcumque veteranos practicos discendi occasionem quotidie nancisci.

Juvenis 24. annorum, procerus, robustus, braxator, anno 1761. Nov. 15. in femoris sinistri media, eadem-que interiore plaga, vulnus accipit valde profundum quidem, sed angustum admodum, plurimum sanguinis principio fundens, intra octiduum autem sponte coalescens. Deinde ambitus cicatriculæ tumere cepit; posthoc autem otum femur, quin & integrum crus œdematosum; fri-

gidumque redditum fuit; ut 27. post acceptum vulnus die, ad nos delatus, exhibuit. Horrebamus collapsam hominis, pallidamque faciem, febrim cum debili pulsu, tussiculam continuam, pectoris anxitudinem. Adornando anamnesin, intelleximus Chirurgiam bis venam tudisse, ut sanguinis arteriosi impetum compesceret; Aneurysma pronuntiasse; verum nec per se, nec per alios, quod saltem debuisset, si aptus ipse non esset, requisita auxilia adhibuisse. Cum vel forti suæ, adeoque certæ mortis, homo miserrime emaciatus ac debilitatus, committendus esset, vel anceps auxilium ilico tentandum, operationem sequenti die, scilicet 12. Dec. sequenti modo instituimus.

Admoto primum tortili instrumento, vulnus per longitudinem sursum, deorsumque dilatatum est, eoque eductæ ferme quinque libræ grumosi cruoris. Ipsa Cru-  
ralis (Femoralis dicenda potius) Arteria perfossa deprehendebatur; id quod profiliens, laxata machina, sanguis demonstrabat evidenter. Cum vulnus quatuor & ultra pollicum profunditatem haberet, dilatandum sursum ac deorsum ultra fuit, ut in fundo operaremur; tumque tandem arteriam ipsam massa partim fibrosa, partim callosa, informi, digitum hinc inde crassa, circumvolutam, ac connatam, deprehendimus. Si locus compressioni, priore in homine institutæ, aptus fuisset, minus de hoc alieno corpore solliciti fuisset, utpote illi ejus loco, unde cruor exsiliret, admoturi Agaricum, vimque compressionis maximam; jam vero ad ingentem adeo Arteriam, ad profundissimam adeo plagam, tantæque magnitudinis vulnus, veriti ut firmus, ut in latera haud vacillans, vix figeretur Agaricus, compressionem solitam periclitari, ausi non fuimus, sed interceptionem prætulimus.

Equidem, fateor, Cl. Vir. L. Heisterus, curam felicem sola comprimendi methodo perfecit arteriæ femoralis; at vero ille hominem mox a vulnere suscepto, hominem cætera sanum ac vegetum; nos autem semimortuum,



tuum, a 27. retro diebus neglectum, in quo nil liceret periclitari, sed omnium tutissimum illico adhibendum foret, in cura suscepimus. Vid. *Disput. Chirurg.* ab eximio *Hall. coll. Tom. 5. N. 132.*

Tentata igitur Interceptio fuit. Sed in eadem facienda jubet Ars Nervum separare, ne comprehensus ille atque constrictus, convulsiones, tetanos, mortemque producat. Id vero hic visum impossibile, eum neque circumcretam massam, supra descriptam, ab arteria solve-re, neque in eadem massa confusa, callosa, informi, tota, nervum invenire possemus. Cum tamen necessaria omnino interceptio visa esset, tria nos utcumque consolabantur. Ac 1. quidem quod Nervus, si arteriæ propinquus, unaque cum illa in massa informi involutus, cum arteria ligaretur, minus ob eandem hanc massam a filo constringeretur, ideoque tantas haud generaret convulsiones. 2. Quod Nervus subito cum Arteria ligatus haud in singulis operationibus convulsiones faceret; experientia illorum, qui Nervum nunquam separant, id confirman-te. 3. Cum aliquando Nervos majores, digiti, imo pollicis, latitudine ab arteria femorali in cadaveribus deprehendissemus remotos, spes blandiebatur fore, ut hic quoque remotior locaretur. Vid. *Disp. Chir. Hall. Tom. 5. N. 140.*, in qua cautela hæc a *Dionis*, aliisque adeo inculcata, minus necessaria esse judicatur. Saltem hic adhiberi non poterat.

Elato igitur probe vulnere Cl. Chir. Professor acu longissima, atque incurva, filis pluribus bene ceratis instructa, arteriam subiit, tenaculo acum, post arteriam positam, indeque leviter emergentem, ad se adduxit, atque ita arteriam, interposito spleniolo, ne ligando præscinderetur, intercept, constrixit. Laxata machina tortili, vulnus vasis egregie clausum esse apparuit, sanguine non nisi lateralibus de vasis saltu profluente; unde vulnus linteo carpto oppletum, factaque ligatura est.

His

His peractis multorum animos dubitatio subiit, an ligata arteria tanta, crus inevitabili gangræna haud periret, adeoque & homo totus? Et num propterea amputatio, cujus apparatus omnis ad manum erat, non esset instituenda? Sed ab eadem omnino dehortabar validas, ni fallor, ob causas. Primo, quod hujus Arteriæ interceptionem *primi* non tentaremus. Secundo, quod Anatomæ abunde nos convincat pluribus in locis, ligatâ Arteria superioribus, laterales arterias dari, quæ *anastomizando*, cum arteriis lateralibus, infra ligatam arteriam oriundis, ita sensim cum illis dilatantur, ut defectum intercepti trunci suppleant abunde, quamadmodum sola contemplatio Tab. 23. *Eustachii* docet. Tandem, quod in agro hoc amputatio non nisi summo in femore institui posset, ubi passim letalis; eoque magis hic, quod quatuor septimanarum spatium res neglecta vires agri, sanguinemque, dilapidasset; ut haud inanis ille metus esset ne inevitabili inter amputandum hæmorrhagia, nostris sub manibus expiraret. Amputationem autem rebar, si reparatis viribus propter enarratam causam adhuc indicaretur, tutius deinceps posse institui.

Sed alter scrupulus mentes aliorum invasit, scilicet ne sanguis, qui inter operandum multus effluxerat, adeoque in tam magno vulnere, inter musculos, dudum ante a se mutuo disjunctos, copiosus hærebat, nec propter hominis, sub operatione fere deficientis languorem, eximi vix poterat, ne, inquam, ille putrefactionem summam excitaret, resorptusque mortem; dum non nisi pluribus posthac diebus prima deligatio fieret: adeoque prudentiæ esse, ut quiete aliquot horarum concessa, vulnus circumspicte aperiretur, & grumofus educeretur cruor. Nimis forte facilis, concessi. Verum enormis adeo hæmorrhagia aderat, ut veriti, ne, non modo ex lateralibus vasis discissis, sed etiam forte ex vasis lateralibus integris, communicantibus anastomosi cum trunco sub ejusdem ligatura, de vulnere arteriæ efflueret, (neque enim liga-

tu-



turam, nisi supra ejusdem vulnus unicam, fecerant,) ut, inquam, binas Agarici lamellas vulneratæ arteriæ adplicuerimus, linteo cārpto cuncta repleverimus, & firmissima ligatura muniverimus universam plagam.

Facile hanc historiam, quippe ad rem ipsam nihil facientem, omisisse potuissem, ni nonnullæ rationes candidam ejusdem relationem postulassent. 1. Ut pateat in morbis Indicantia & Contra-indicantia nonnunquam ita urgere utrinque, ut, ultra sequaris, plane ambigas. 2. Ut mature examinemus an illorum methodus, qui tam infra, quam supra vulnus, arteriam intercipiunt, præ simplici ligatura non præstet: ne id, quod nostro in casu verebatur, aliis in casibus re vera contingens, operationem redderet infelicem; cum vel hinc, vel tam fortè e contrario arteriæ constrictione, ut gangræna inferiorum sequeretur, homo periret?

Atque hæc de ipsa operatione dicta sunt. Emulsio-  
nis Libræ 4. cum unc. ij. Syr. Diac. dabantur spatio 24. horarum, intermedioque tempore sæpius juris carnis paucillum. Integro hoc die pectoris anxietas, tussis, sitis, parvus, idemque frequens pulsus, agrypnia, observabantur; & ut pridie operationis, ita jam, prodiit urina jumentosa, nisi quod exactis 24. horis nonnihil deponeret incrassamenti.

Cruri porro universo, oedematoso eidem, ac frigido, mox ab operatione calidum fomentum circumdedimus, compositum ex Scordio, Absinthio, Alliaria, Abrotano, Floribus Chamom. & Samb. aqua, vinoque incoctis, quavis hora, &, si opus, quavis dimidia hora renovandum: cum autem ad frigidiorē partem fomenta mox frigeant, calefactum eidem ex Lana Stragulum circumvolvimus. Effectum hinc, ut femur, ac pes, modice calerent perpetuo.

Dec. 13. Sudor mane, plenior paulo cum pulsu. Jus, & Emulsio, ut die prima. Aqua hordei sitim sedavit. Jus ipsi placuit præprimis. Lingua humida & alba.

ba. Urina post meridiem naturalis. Post sudorem pulsus melior, anxietas tolerabilior. Nunquid secundum egregium *La Motte* post puerperium, nunquid post magnas cruoris evacuationes, sudor laudandus? Laudandusque veluti indicium retusi ad apertas arterias impetus sanguinis, ejusdemque ad Cutem derivati?

Dec. 14. ab hora post mediam noctem tertia, ad decimam, breves habuit, bonosque somnos. Pes probe calet, etiamsi fomentum ad horam renovetur duntaxat, ubi heri vix suffecerat ejusdem ad mediam horam renovatio. Pauca febris, exigua anxietas, pulsus non parvus, appetitus. Foetor ad vulneris adparatum multus, cui forte symbolam contulit sanguis, qui brevi post deligationem transsudando universum maculaverat adparatum.

Dec. 15. somni mediæ horæ, iique frequentes, adfuere, dummodo Machina tortilis pauxillum relaxaretur. Appetitus. Deligatio prima, aut si mavis altera, facta est; ea tamen cautione, ut & lintea carpta versus arteriam, & Agaricus, loco linquerentur suo. Planta pedis, quod fomento esset corrugata, magno gaudio nostro dolebat.

Dec. 16. in deligatione ob foetorem iterata, pus comparuit. Somni meliores. Pedis naturalis calor.

Dec. 17. foetor immanis matutinam suavitatem, vespertinamque deligationem. Vespere quid sanguinis prodiit, binæque cecidere Agarici lamellæ. Fluor autem cruoris lentus erat, isque omni vulneris in ambitu. Qui porro, sive venosus, sive etiam arteriosus, sufficienter docuit ab instrumento tortili haud ita comprimi arteriam, quin transitus sanguini concederetur. Docuit præterea anastomoses a longo forte tempore, ( dum & copioso, eoque coagulato cruore, & valido Balneatoris apparatu, compressa arteria esset, ) fieri ceptas, officio jam fungi suo: vel si quis id eo tempore necdum concedere vellet, saltem sanguinem ad femur advehi per alias arterias, quam quæ ab intercepta, interceptæve ramis: *Eustach. Alb.*



*Alb.* Tab. 24. Lit. A. D. E. Dolor cum in pede, tum in vulnere; in vulnere autem nunc magis. Hac vespera primam alvum reddidit sponte. Nocte utcumque dormivit.

Decembris 18. deligatio utraque quid sanguinis ostendit, per lintea carpta transsudantis, nonnihilque puris. Vix ultra febrilis pulsus, ac cætera bonus. Hucusque Urinæ, unica ea 13. Dec. excepta, vel jumentosæ redditæ, vel, quæ limpidæ redditæ, hæ tum rubicundiores fuere, tum cito factæ jumentosæ. Sedimen porro posuere tarde, imo sæpe altero modo die.

Dec. 19. omnia ut heri, sed fordidius vulnus.

Dec. 20. universa vulneris facies gangrænosa. Unde ad externum Corticis Peruviani usum, internumque deventum est. Assumit quotidie Extr. Cort. unciam mediam, mistam cum unc. iv. Aq. Samb. & unc. ij. Mellis. Fomentum parabatur ex unc. iv. pulv. Cort. bihorio cum aqua coctis, ita ut superessent modo Libræ duæ. Hinc involvebatur femur universum, interea dum crus & pes solito tegerentur fomento. Decoctum idem corticis, cui inditum tantillum spiritus thereb., vulneri imponebatur plumaceolis exceptum. Sensim hinc omne gangrænosum, factis hinc inde scarificationibus levioribus, separabatur, partim emendabatur, mutabaturque in sanum.

Urinas ad usque nonum diem descripsi: ab illo vero die hæ minus jumentosæ prodire, citiusque deponentes, omnes vero naturali rubicundiores. Neque febrilis pulsus ab 8. vel 9. die observatus amplius est. Emulsio cum cortice, de nocte potissimum, semper assumta est. Spiritum thereb. nunc parciorem Fomento, nunc copiosorem addidimus, prout major, minorve esset gangrænæ metus, aut prout nonnulla vulneris vascula plus minus sanguinis funderent. Resistit enim potenter hic spiritus putredini, & oscula vasorum constringit. Cum dosis corticis extracti sufficere non videbatur, cumque alias experientia nos docuerat ejusmodi dari hominum, morborumque

que naturas, quibus ille in decocto, quam in extracto aut pulvere, efficacior esset, curavi ejusdem triti uncias ij. bihorio cum aqua coqui, atque colati liquidi libris duabus uncias mellis tres admisceri, singuloque absumi nycthemeri spatio.

Atque sic sat prospere peracta res est ad usque 26. Decembris. Hoc vero die æger denuo conquestus est anxietates, prostratum penitus appetitum, vehementem a cortice horrorem. Vulnus quod purum esset, corticis usui 24. horis superfedi. Inde nunc minui anxietates, reddique sibi appetitum testabatur æger. Monitus autem, convictus immo de corticis peruviani necessitate, denuo assumpsit illum, vique se cogens, eidem assumendo assuevit tandem.

28. Dec. moderatio hucusque tussis, atque notabilem tenacis glutinis copiam quotidie ejiciens, nunc laboriosior fiebat, acriorque. Lenivit autem eandem oleosus, idemque paregoricus, linctus. Digitos pedis belle movit.

1762. Jan. 2. & 3. urinæ naturales; at vero Jan. 4. 5. 6. 7. eadem quæ priores, pag. 19. descriptæ. Ab 8. Jan. rubicundiores cum crasso, eodemque subalbido, citoque adparente, sedimento; cum tenuioribus per universam urinam furfuribus ad superficiem usque dispersis, cumque pellicula in superficie, ad certos luminis adspectus varios referente colores, & pingui quidem adparente, sed examine instituto, pingui non reperta. Microscopio enim pellicula hæc exhibebat nihil, nisi opacam hinc inde, informemque massam, nullibi pellucidam, nulla spicula salina gerentem. Combusta vero in carbonem mutabatur, qui microscopio conspectus longa gerebat, eademque alba, atque splendentia corpuscula: hæc examine chemico ulterius explorare me tunc neglexisse, est quod nunc doleam. Singulo biduo, triduoque, alvus commode soluta est.

Pus interim ad singulam duodecimam deligationis horam bonam quidem, at vero superans vulneris rationem.



gem. Tandem 11. Jan. comperiimus, ad variam partium pressionem pus foetidum, & a profundiore plaga ea, in qua filum hærebat, & ab inferiore vulneris angulo, in cavum vulnus effluere; specillo interim magnam utriusque hujus loci altitudinem non monstrante. Posthac pressum internum, externumque femur vulneris cavum pure replevit, quod sanguine mistum perquam foetebat. Neque id mirabamur valdopere: etenim ingens effusi, ejusdemque congrumati sanguinis, copia, longiore ante operationem tempore, varios inter musculos sibi sinus foderat; unde a semiconsumpta cellulositate, ipsoque corrupto cruore, pus hoc saniosum, ac foetidum, oriri necessum fuit.

Notandum est urinas mox descriptas, cum puris primo copiosioris, deinde saniosi, in vulnus affluxu, una comparuisse. An ab ejusdem portione intra sanguinem resorpta?

His igitur ita visis, vulnus perluimus, & in omnes ejusdem sinus, anfractusque, injecimus decoctum saturatum corticis spiritu therebinthinæ mistum.

Jan. 15. & 16. pure & modico, & vix foetido, in vulnus affluente, urinae vix ultra id crassum sedimen habuere, vix in superficie pellem, vix præternaturalem ultra colorem.

Necdum ligatae filum arteriae vacillat, licet jam sit dies ab operatione peracta quintus & trigessimus. Egre-gius *Monroe* Tom. 2. *Act. Edimb.* narrat in Arteriae Brachialis interceptione, post elapsos demum binos cum dimidio menses, filum cecidisse: in nostro igitur homine, considerato crasso illo, quod involvit Arteriam, corpore, tarditatem solutionis fili non mirabamur.

Feliciter aliquantisper progressi, 8. Febr. iterum vidimus, quid in vulnere subnasci gangraenosi, indiesque idem augeri, nec non vagam oriri febriculam, cum horrore ingenti. Paciens percepit horrorem febrilem de ipso vulneris suboriri cavo, inde ad dorsum, universum-  
que

que tandem corpus invadere; durare autem illum uno tempore per bihōrium, per horam alio, nonnunquam media hora, vel & horæ quadrante, aut & minus. Longiores principio horrores insequutus calor est; horrores vero illi, qui multo breviores, nec cavo de vulnere oriuntur, nec excipientem sese habuere calorem.

Cortex igitur hucusque quamvis maxime indicatus, scopo non satisfaciebat tamen; dosi proinde, eadem indicatione non manente duntaxat, sed multum aucta, augendus erat. Dedimus quotidie decoctum 3. unciarum, triduoque post unc. 4. idque, ut patebit, tempore longissimo.

Urinas durante gangræna denuo tum crassas vidimus, sive jumentosas, tum oleosa rectas, crassaque pelle, tum tandem crassum sedimen ponentes.

Ad 16. Febr. liquefacto omni gangrænoso, vulnus adparuit triplo amplius. In eoque sinum versus locum susceptionis amplioremprehendentes, & exacte ibidem omnia perquirentes, ansam fili deteximus laxam circum arteriam, mobilemque, ac proinde inutilem; imo mole & irritatione noxiam. Docebatque amplitudo ansæ consumtum jam esse, quod arteriæ circumceretum fuerat, corpus informe; nec non arteriam ipsam dudum in ligamentum conversam esse, cum alioqui hæmorrhagiæ exortæ fuissent: confirmabat idem defectus eo in loco pulsationis, confirmabat etiam Machinæ tortilis citra vel minimam sanguinis guttulam integra relaxatio. Filum igitur hoc crassum, quippe octuplex, pure putrido turgens, ob idque noxium, abscidimus.

Ab hoc die observata multa emendatio est. Febr. 17. vagi horrores cessarunt, gangrænæque victa sic, ut ad 21. Februar. vix superesset quidquam. Cessante gangræna, Urinæ per aliquot horas jumentosæ, brevi crassum deposuere, ac farinaceum sedimen, cum pellicula leviori, vixque pingui visa: a 25. vero Febr. colore naturalibus vix ultra sedimen ponebant. Purum jam vulnus, super-



superstite tamen sinu, quo in loco filum hæserat; cujus in fundum stylus ad  $\frac{2}{3}$  pollicis intrabat: cæterum bonus appetitus, somnus, alvus. Æger in lecto sæpius sedet.

28. Febr. vespertina septima horruit valde, ac de super incaluit; Martii 1. ad 8. matutinam pariter. In vulnere tamen eousque nil observabamus sinistri. Hora nona febris cum horrore modico. Siccus vespere vulnus, novusque horror. Vulneris majores de nocte dolores. Martii 2. bis & horruit, & caluit. Crassa est urina, & cum pellis variegato, ut olim, colore.

Die demum 3. Martii gangræna iterum in vulnere visa. Die 4. magis, & quidem sic, ut undique stigmata nigra conspicerentur, ut fundus versus arteriam totus esset, profundeque, sphacelatus, & ut sanies foetida cavum repletet universum. Inutilisne hinc cortex? An copiosior dandus? Utique ejusdem indicatio, si unquam, si ullibi, hic saltem maxima. Igitur cum dec. Cort. unc. iv. quotidie evacuando unciam pulveris ejusdem commiscui; sextoque exin die uncias pulveris duas. Etiam digestivo plurimum spiritus Therebinthinæ adjectum est.

Mirabamur toto Octiduo hoc urinas, non ut olim, sed naturales præter propter prodire. Copiosiorne corticis hic quid contulit usus?

Interim superandæ gangrænæ non eramus. Doctiss. *Schreibers* narrabat egregios in bello se vidisse effectus in similibus a Theriaca Andromachi, cum æquali copia spiritus therebintinæ mista. Quo remedio non, nisi in principio, satisfaciente, imposuit. Cl. Chirurgiæ Professor Unguentum de styrace cum  $\frac{1}{4}$  ung. ægyptiaci. Juvante

neque illo, imo sequente deligatione cuncta sphacelata exhibente, suasi corticem peruv. primum toti inspergere vulnere, deinde cum digestivo eundem misceri; hinc tri-  
dui spatio elapso mirum quam purum vulnus adpa-  
reret.

Oportet autem exacte nihil non notare. Cum æger a vulneris inundatione doleret, solatio ipsi magno fuit pus, vel saniem, siphonis ope educi. Gangræna igitur toties redeunte, subdubitare cepimus an fuctio siphonis, auferendo toties, ac valide, athmosphæræ compressionem, has carnes fungiosiores non redderet, adeoque in gangrænam proniores? Imo, quandoquidem adversis in rebus undecumque petatur nocumentorum suspicio, etiam ab injectione ad vulneris depurationem, siphone facienda, abstinendum esse decrevimus, ne aër cum injecta materie ad nudas has, fungosasque ac semimortuas carnes vi repetita adpressus, noceret iisdem. Saltem ex quo ad 22. Martii plumaceolæ mollissimæ vulnus expurgarunt, similesque injectiones materia madentes cuncta perluere, gangræna fisti, pedetentimque minui visa est, amplius non reditura.

Quo toto porro tempore cum eadem hucusque pugnaveramus, urinæ fere naturales fuere, unico eo ab earum sanorum discrepantes, quod nubeculam paululo crassiorum, ac veluti farina crassiuscula refertam, gererent: ex quo vero malum superari ceptum, urinæ tum parciore fuere, tum fusco-rubra, tum etiam per integras 12. horas aliquoties jumentosæ, idque crassiore, partim oroboidæo, partim furfureo, cum sedimento. Horrores autem cum, vel absque, insequente calore, quales ante anteriores gangrænas, æger ante hanc postremam, eamque vehementem, perpeffus non est. An quod plus nunc assumerit Corticis?

Hac igitur methodo Corticem tum assumendi, tum adplicandi, citra vel minimam adversitatem, Aprilem, Majumque mensem, transegit æger. Majo finiente vulnus penitus clausum fuit, vires auctæ, cruris immanis tumor sensim concidit, ejusdemque sic est restitutus usus, ut binis primo scipionibus, postmodum unico, demum sine ullius ope, ambulare disceret. Cum vero toto flaccesceret corpore, ac crure penitus non detumesceret,

Cor-



Corticis usum sensim quidem parciorem, integrum autem non detraxi, nisi Augusto mense finiente; crure interea probe fricto, & genu curvi immobilitate unguentis molissimis, frictionibusque, emendata.

Sumtum, quos Nosocomium pro homine, septem cum dimidio mensium spatio, profudit, rationem ineuntes, comperiimus eum assumsisse in Extracto uncias Corticis 7. in pulvere Libras  $6\frac{1}{2}$  in Decoctis Libras

$34\frac{1}{2}$ . præter Libras 11. in fomentis. Ita ut solvere debuerimus, pro Libris Corticis 52. & 7. unc. Extracti ejusdem, Aureos præterpropter quadraginta.

Rariora exempla, arbitror, sunt dati, adplicitique, enormi hac quantitate, Corticis; unde expediet super eodem paucis differere: sepositis tamen, & intactis perpetuo iis observationibus, quas a *Revelatione* habemus, in tot SS. Scripturarum locis docente, DEUM, quas sive nutritias vires, sive medicatas, creatis inseverit rebus, sæpe easdem illis auferre, & e contrario ipsas illas vires hisce infundere, quæ prius inde destituerentur. Hisce, inquam, sepositis, sic ratiocinor: Corticem peruvianum, ut anti-gangrænosum, practici multis ab annis, quidquid contra mustitarent nonnulli, salutarunt. Haud raro tamen aut vis morbi superior, aut alia causa quæcumque, omnem ejusdem elusit efficaciam. Sed hoc etiam quævis cum Specifica habent, tum Methodica remedia. Hinc faustorum eventuum inquirendæ nobis sunt, infauorumque causæ.

Harum prima in ipso remedio invenitur, quod circumscriptum limitibus est, quos ultra, citraque progredi nefas.

Secundo, in corpore assumentis latere illa potest. Ut ab una parte Alimenta, instituto CREATORIS, corpora nutriunt, longosque sustentant in annos; utque ab altera parte ejusmodi homines dari advertimus, qui sive

a morbo noto, sive a nulla nobis manifesta causa, minime inde nutriantur, imo debita cum alimentorum copia decrescant; contabescantque, & pereant; ita Medicamenta sæpius quidem organa corporis assumentis apta inveniunt, a quibus per quoscumque corporis anfractus, per genus humorum omne, adeoque per locos quoscumque, ubi latet origo mali, circumferantur, viresque sic suas exercent; attamen diffiteri non possumus selectissima Medicamina aliquando ejusmodi adplicari corporibus, quorum organicæ partes prorsum ineptæ sint, quæ illud circumducant, præparent, subigant, causisque admoveant morbosus. Itaque iners hac lege cum sit, ut in nutritione inepta alimenta considerabamus, morbus pergit, donec vita in auras fatiscat.

Tertio erit & aliunde derivanda causa. Potest ad agendum quam optimum cum Alimentum, tum Medicamentum esse; potest etiam ad circumferendum, ad subigendum, ad adplicandum, corpus assumentis validum esse; dum interea nec illo corpus reficiatur, neque hoc tollatur morbus. Cuius id manifestum puto. Quicumque Medici Legis Hippocraticæ de nutriendis ægris ignari, diætam tenuissimam a primordiis, perque omnem decursum Acutorum, observant, neque fere mutant reconvalescentibus, hi neque morbum integre debellant, nec firmam revocant sanitatem: nocentque eo magis, quo pleniore diætâ homo usus in sanitate fuerat.

Ut hic alimenta, ita sæpe se medicamenta habent. Bona hæc quidem, & selecta, haud magis emendabunt morbum, debito parcius si exhibueris, quam alimenta parcius data non restituunt vires reconvalescentium: tum quod ad morbi magnitudinem, ac violentiam, exhibendi auxilii justa requiritur proportio, tum quod medicamentorum multorum ea sæpe natura sit, ut parcius data plus noceant, quam prosint. Nonne purgans pharmaceum, perparce datum, sæpe torminum, atque anxietatum autor, cum alvo clausa? Et restrictius exhibita Nepenthe,



the, an non sæpe insomnia pro somnis, pro dolorum lenimine anxietates, caloresque conciliet? Nunquid, *Sydenhamo* autore, præstat quibusdam sanguinem non, quam haud sufficienter, misisse?

Tandem quarto, inertiae sive alimenti, sive medellæ, ea merito causa est, quod, viribus illa mutandi dudum dilapidatis, exhibeantur, provecto scilicet sic morbo, ut homo certa & inevitabili lege in mortem tendat.

Porro si quatuor has considerationes ad energiam Medicamentorum adplicuerimus, &, de quo potissimum agitur, ad Corticem peruvianum, mox manifestam, cur sæpe hic nil operetur, rationem capiemus. Ponatur ille, ubi non indicetur, datus, frustra expectabitur ab eo morbi sanatio. Detur rite indicatus, sed inepto ad cooperandum corpori, sed ægro irreparabiliter exhausto, neque vires exferet suas. Dederis optima cum indicatione corpori aptissimo, haud id, quod intenderis, obtinebis, apta ni dederis dosi. At vero aptam quam demum vocabimus dosin? Qui rite indicatum Corticem noverit, rite inventurus dosin ejusdem est, prudenter augendo, donec cernat agentem. Neque pondus hic quidquam, aut mensura, determinat, sed morbi levamen. Nunquid tandem observationem alia quæcumque medicamenta non demonstrent? Corpora dantur, quæ alvo purgare difficillimum; ne dicam impossibile: purgans sextuplo fortius solito, sed forma liquida, sed per epicrasin datum donec operetur, optatum ferit scopum. Admirandus per omnia *Sydenham* inanem excussit nobis de Opio formidinem, tum universis in morbis, tum in Variolis. An non aucta vehementer opii dosi letalem alioqui Ileum solutum vidimus, *Ration. Medend. Tom. III. cap. I.*? Quindecim forte anni sunt, cum feminæ, intolerabilibus uterini canceri doloribus desperabundæ ac furibundæ, unicum possem ab opio afferre solamen. Granis paucioribus delusus, ascendendi sensim, donec septuaginta ac duobus granis spatio 24. hor. datis, sedamen dolorum, virium resectio-

nem, citra vel minimum tamen somnum, aliquot horarum spatio, cernerem.

Quæ si ita se habent, nonne audacioris dosis Corticis adornata Apologia est? Effectusque egregius, ab interno ejusdem, externoque usu observatus, an hanc non approbet, non tueatur, non laudet audaciam? Nunquid etiam tum hoc notabile exemplum, tum complura alia, non demonstrent inanem eorum metum prorsum ridiculum esse, qui vel a mediocri Corticis usu meticulosi, vel cum purgantibus illum sociant, vel purgantia exhibeant post eundem; quibus demum innocui remedii imaginariam malignitatem, obstructionum genitricem, se eliminare arbitrentur?

Novi equidem, audioque, optimos hos viros ad experientiam provocare, qua a peruviano Cortice Lienis, Hepatis, Mesenterii, &c. obstructiones, & cum maxime Hydropem ac Scorbutum, innuente jam dudum Sydenhamo, productos fuisse, evincere conentur. Sed pace horum, quos veneror, Virorum, parumper subdubitare fas sit, an experientia decantata illa rite capta, adeoque an valida sit? Quid enim? Febres intermittentes, dimissæ sibi, generant obstructiones Viscerum, & Icterus, & Cachexiam, & Scorbutum, & Hydropa: quique letalis per se morbus non est, hoc demum modo homini letalis fit. Fiunt porro hæc Febre penitus sibi, etiam citra ullam medicinam, dimissa; omnium sæculorum experientiam, id testantem, magno Boerhaavio colligente & describente *Cap. de Febr. in gen. & de Febr. Interm.*

Si proinde ejusmodi esse queat febrium sibi dimissarum funestus effectus, quò demum jure effectus dicatur Corticis? Opponentes quidem expecto auctoritatem Sydenhami, Boerhavii, Illusterrimique nostri Præsidis B. van Zwieten; uno id ore affirmantium; fateorque lubens tres hosce Celeberrimos Autores ita scripsisse; verum simul reperio ita mitigatam a posteriore priorum binorum sententiam fuisse, ut deesse non potuerit quin *Comm. Tom.*



III. pag. 599. hæc scriberet : „ Antea - - - notatum  
 „ fuit quod post has ( intermittentes ) Febres, imprimis  
 „ si diuturnæ & validæ fuerint, humores crassi & acres  
 „ reddantur, simulque solidæ partes corporis debiliten-  
 „ tur; unde ob laxa vasa, & liquida crassa, atque acria  
 „ simul, Febres intermittentes aliquando terminarentur  
 „ in Scorbutum, & alios morbos Chronicos. Ubi autem  
 „ *pertinacibus talibus Febribus curandis adhibetur Cortex*  
 „ *Peruvianus, tunc mutationes humorum & solidarum*  
 „ *partium corporis, per ipsam Febrim prægressam factæ,*  
 „ *male adscribuntur usui Corticis Peruviani.*

Et quantum ad nostros ægros, qui per octo annos in nosocomio nostro copiosissimo nisi Cortice fuerint, nondum ulla Chronica inde mala notare potuimus: neque in Viro, quo de agitur, nulla scorbuti signa nobis aut oculi exhibent, aut gingivæ, aut artus; imo cachecticum habitum, inchoantemque hydropem, largo Corticis usu sublatum esse læti conspiciamus. Ut proinde rariores videantur, qui id innuant, arguantve, casus.

Imo si vera promere datur, Chronica mala inde orta experti in Nosocomio fuimus, quod vel meticulosiores Medici, vel præparci, aut egeni ægri, Corticem nec sat magna dosi, nec sufficiente post morbum devictum tempore, assumerent. Unde nos neutiquam contenti quod ægri quovis 14. die a curata Febre dosin Corticis sumerent, semper binarum, trium, pluriumque septimanarum spatio continuavimus ejusdem usum, donec integram restitutam cerneremus, stabilemque sanitatem.

Interim vix possibile creditu, quantum detrimenti humano generi afferat præjudicata hæc opinio. Utique centenos ægros perdit quotannis. Neque juvat quidquam aliorum experimentis convinci, siquidem præjudicium, alta mente repositum, contraria experimenta admittit quidem, laudatque, non sequitur tamen. Clarorum Virorum Epistolas possideo, qui ad lecta mea opuscula me laudibus accumulantes, curam Februm malignarum abun-

Antiore Cortice peractam, vehementer quidem admirabantur, atque laudabant, at vero nunquam imitatu-  
 sese profitebantur, eo quod Hydropem, aliaque infortu-  
 nia, a Corticis liberaliore exhibitione observasse se autu-  
 marent. Feminam a frequentiore abortu, atque enormi-  
 bus Hæmorrhagiis ferme enectam, frequentiore Corticis  
 usu reviviscentem salutaveram; at vero brevi in veteres  
 ærumnas relapsam dolui, postquam cum medentium,  
 tum matronarum turba, lamentabili voce perniciosos diu-  
 turnioris Corticis peruviani effectus enarrarent, auribus-  
 que ejusdem tandiu obstreperent, ut tandem ipsis infelix  
 auscultaret.

Verum demus tandem id contingere nonnunquam,  
 quod magni in Arte viri tantopere formidarint, ego ve-  
 ro necdum potuerim observare. An ergo, quod Scorbu-  
 tus, quod Hydrops, quod Obstructiones, liberaliori Cor-  
 ticis dosi nascantur nonnunquam, eo demum adigere nos  
 debeat, ut miseros Mortales, aut sine Cortice, aut sine  
 eodem copiosissimo, certissime perituros, cumque eodem  
 largissimo servandos, iniquæ ipsorum sorti dimittamus  
 potius, quam ut concedamus illos in vitam Cortice re-  
 vocatos discrimen subire Scorbuti, Hydropis, aliufve cu-  
 juscumque morbi chronici? Profecto aut nihil in Medi-  
 cis intelligo, aut sententia hæc mea veris ac genuinis  
 Artis præceptis innititur, qua statuo vitali indicatione  
 merito nos urgeri, ut vitam servemus præprimis, pro-  
 specturi postliminio symptomatibus pravis, hic, ut cre-  
 ditur, inevitabilibus, mox ubi vel levissima eorundem  
 primordia advertemus.

Atque hæc de Cortice dicta sunt. Verbo nunc  
 urinas commemorem, quarum varia phænomena in uni-  
 verso morbi decursu exacte, sæpiusque de die, in char-  
 tas conjeci. Crassas eas, inque crassitudine perseverantes,  
 & pridie operationis, & spatio 10. dierum post illam,  
 conspeximus. Dein a principio dati, dosi moderata, Cor-  
 ticis, minus jumentosas, citiusque deponentes, qualvis  
 autem naturali urina tinctiores.

Ja-



Januarii 2. & 3. rebus bene satis se habentibus urinæ fere naturales; quatuor vero deinde subsequis diebus, prioribus iterum similes. Demum vero ab 8. Jan. rubicundiores cum crasso, subalbido, eoque cito apparente, sedimento, cum furfuribus tenuioribus, ad superficiem usque dispersis, cumque pellicula pingui, eademque crassa, in superficie, ad varios luminis adspectus rubellis, flavis, purpureis, viridibus, donata coloribus. Quo porro tempore ejusmodi urina erat, pus ratione vulneris copiosius fuit, simulque quod in sinibus delitescibat, foetidum. Januarii 14. & 15. pure modico iterum, vixque foetido, urina pariter vix ultra sedimen habuit, vix pelliculam, vix alium a naturali colorem. Gangræna posthac adparente cum Febribus horrificis, crassæ iterum urinæ, jumentosæ, eadem, qua antea, pelle tectæ, crassum, postquam diutius stetissent, deponentes sedimen: Gangræna devicta, jumentosæ quidem, at brevi subsidentes, pelle tenuiore vix tectæ, tandem fere naturales. Febre vaga horriffica magnam gangrænam 28. Febr. denunciante, urinæ crassæ iterum ac returbatæ, fursureæ, pelle eadem, qua olim, tectæ. Sub hac gangræna, quacum diu incassum luctabamur, aucta multum Corticis dosi, mirabamur urinas prope naturales esse, exceptis toto hoc 3. septimanarum tempore binis tantummodo vicibus. Prope naturales eas ideo voco, quia eo solo a naturalibus differabant, quod nubeculam paulo crassiore, in eaque pauxillum crassioris gererent farinæ.

Sphacelo stante, imminente, superato, urinæ tum parciore fuerunt, tum fusco-rubræ, per semidiem nonnunquam turbatæ, cum sedimine partim fursureo, partim oroboideo. Tandem post superatum morbum coeunte sensim vulnere, varietatem multam exhibuerunt, aliquando penitus naturales, alio tempore fere naturales, haud raro etiam cum oroboideo, crassoque sedimento.

Doctrina implicata satis de urinis nunc forsitan hinc illustraretur, hujus excursionis causa est. Sed quam ob-

scura sæpe, quam abdita, quam inexplicabilis illa! Ordinem servabant urinæ aliquem, ad explicationem aptum, usque ad posterioris gangrænæ finem; nullum vero observarunt postea. Corticis ope videbantur in prioribus gangrænis in melius mutata; post gangrænam ultimam, Corticis dosi eadem data, miras continuo exhibuere varietates. Et cur urinæ hic toties turbata ac jumentosa? In Acutis adparentes notant pertinacem fere cruditatem cum inchoante, sed inani ad coctionem nisu; hic vero gangrænam, imo sphacelum: „ pellicula, qualis hic, „ notant in morbis Acutis abundantiam terræ & salis „ hebetioris in sanguine, hinc scorbuti, calculique præ- „ saga; hi morbi post curam observati non sunt, & pel- „ lis hæc comitata perpetuo gangrænam fuit. Habuimus sæpius urinas fere rubras, cum sedimine aut ruffo, aut furfuraceo, aut orobo tosto, tritoque simili, aut squamoso: designat illa „ 1. antegressum esse motum attritus „ vehementem. 2. Vasa laxa. 3. Cruorem acrem, salinum, solutum, nutritioni ineptum. 4. Febres intermittentes valido paroxysmo defunctas. 5. In oris septentrionalibus his scorbutum. Præstat 1. longitudinem morbi. 2. Vasculorum attritionem, debilitationem, destructionem. 3. Sudores, urinas, salivam, diarrhœas, colliquativas. 4. Atrophiam. 5. Hydropes quoscumque. Ita magnus *Boerhaave* in incomparabili capite de *Urinis*. Attamen urinæ ejusmodi neque in Diagnosi, neque in Prognosi, horum vix quidquam habuere, quin contraria potius. Quid enim attritui valido magis contrarium languore perpetuo?

Non ea porro mente hæc scribo, ut doctrinæ de urinis detraham quidquam. Magnifacio quippe eandem, & in Nosocomio, ad Diagnosin atque Prognosin instruendam, oportunam judico, doceoque. Nihilominus hanc ipsam doctrinam necdum esse ad perfectionem deductam, tum me præsens casus, tum aliæ multæ observationes, convincunt. Interim hæc nos, quo certiores illam reddamus, potenter excitulant.

Su-



Super Fungo Agarici quæstionem proponendo, hoc Caput terminabo. *Rat. Med. Tom. IV. pag. 32.* & in præsentis Capitis casu priore, enarravi nos & Agarici lamellas vulnere folius Arteriæ, & pulverem ejusdem toti quanto vulnere admovisse; hosque tres homines, SUMMO NUMINE AUSPICANTE, integræ reddidisse sanitati. At vero cum idem fecerimus in homine, de quo *Tom. IV. Capit. IV.* & in femina, de qua *Tom. VI. pag. 51.* eosque morte amiserimus ambos; quæritur, Laudandane sit Agarici pulveris inspersio, an vituperanda?

Respondeo 1. Hominem *Tom. IV. Capit. IV.* hæmorrhagia haud compescenda post crus amputatum periisse, mortis proinde causam citra Agaricum manifestam esse.

2. Feminæ, de qua *Tom. VI. pag. 51.* adeo esse miram historiam, adeo quasvis Physiologiæ regulas excedentem, ut plane inexplicabilis cunctis suis in partibus adpareat, utque hinc examen Agarici pulveris faciat nihil.

3. Tres nostras fortunatas curas id manifesto docuisse, quod aut vulnere, aut vulneratis, sinistri nihil inde contigerit: imo in duobus viris, toto curæ tempore, sanitatem ejusmodi adfuisse, ut, nisi oculis contuiti, vix credere potuissemus.

4. Neque me capere, cur noceret, rationem. Ignoramus forte veram ejusdem agendi rationem: sed sive agat vulnus arteriæ constringendo; sive cruorem de vulnere profluentem mox condensando, solidumque in trumbum, qui vasis aperturam indissolubiliter consolidet, coagmentetque, cogendo; sive denique utroque modo; utique alios ab his effectus in aperta reliquorum vulneris vasorum oscula, inque illum, qui vel in his vasis continetur, vel ex vasis profluit, sanguinem, non producer. Hoc si verum, tunc hæmorrhagiam impediet cunctorum in toto vulnere vasorum; quæ alioquin vasa ipsa, quoadiu Machina tortilis aliquem admittit, quem admittere

debet, circulum sanguinis, fundere cruorem possunt, effuso cruore Agaricum ab arteriæ vulnere solvere, generare in vulnere putredinem, purisque impedire generationem. Unde jure concludere videor hanc pulveris insperfectionem omnibus de causis utilem, necessariamque esse.

At vero resorbeaturne Agaricus? Resorptusque sitne sanguini, ceterisque Venenum humoribus?

Qualitatem venenatam Agaricum, qua Agaricum, possidere, necdum demonstratum est: nihilominus mechanice id forte verum erit, quod tenuis ejusdem pulvis, qua pulvis, resorptus, cum humoribus circumductus, minimisque vasis impulsus, generare obstructions possit, easdemque in Corticis cerebri, cerebellique vasis perniciosas & letales. Quæritur proinde num resorbetur? Minime, neque etiam resorberi videtur posse. Constringendo enim, coagulandoque, prohibet toto vulneris in ambitu resorptionem; id quod cum ceteris tum adstringentibus, tum coagulantibus, commune habet. Quid enim? An pulveres ad hæmorrhagias sive compescendas, sive averruncandas; pulveres, inquam, rebus compositis ejusmodi, quæ tam qualitate propria, quam mechanica rigiditate, venena sunt, vulneribus inculpate non insperguntur? Vitriola puta, Alumen, Aeruginem Aeris? An decoctum Colcotharis Vitrioli, quod quamvis colatum, millenas in se continet venenatas particulas, tuto non applicatur crudis tum vulneribus, tum ulceribus? Et spiritum Therebinthinæ, præsentaneum, si humoribus nostris admisceatur, venenum, nonne citra metum resorptionis adplicamus audacter? Quantumne emolumenti vulnera & ulcera ab unguento ægyptiaco non capiunt, quod ejusmodi tamen continet, quæ mista humoribus, veneno sint? Unde in femoris gangræna ac Sphacelo, prout in hac ipsa morbi historia patuit, sine ullo resorptionis metu tum spiritum Therebinthinæ, tum unguentum ægyptiacum, Chirurgi adplicuerunt.



## C A P U T II.

## De Aneurysmate vero.

§. I. Resumitur Historia mulieris data Tom. V. pag. 194, eo quod nunc Cadavere suo præteriti nostri erroris nos convicerit. Conjectura super causis, quæ Aneurysmatis veri ideam nobis olim creaverant, & Confirmatio repetita toties difficultatis dijudicandorum Aneurysmatum. §. II. Aneurysma spatio 40. annorum citra noxam, citraque incrementum, gestatum. §. III. Aneurysmatis veri, nec non Asthmatis, ceterorumque Chronicorum pectoris morborum, Apoplexiæ præterea, ac variarum capitis ægritudinum, causas sufficientes, easdemque superabundantes, in se homo, dum viveret, gessit, citra effectum, inde physice expectandum. §. IV. Alia Historia priori perquam similis. §. V. Degressio occasione hac facta, circa causam morborum petendam, aut non petendam, a pulmonum cum vicinis sibi partibus coalitu.

§. I. **D**E Aneurysmate interno novas, quas adjiciam, observationes habeo. Femina binæ, de quibus Tom. V. & VI. eadem methodo, quam ibidem descripsi, vitam miseram pergunt tolerabiliter agere, licet in una Aneurysma supra claviculam jam extet binorum pollicum diametro, quod ipsum forte non nisi continuatio sit illius, quod dudum intra pectus gessit. Verum ea femina, cujus ampla historia data est Tomo V. pag. 94. §. 2. post abcessum in externo pectore apertum aneurysmatica visa nobis, sic quidem ut internum pectoris aneurysma nunc inter cartilagineas costarum extrorsum verti crederetur, hæc, inquam, femina, cum morte sua ve-

## Caput II.

ram mali naturam exhibuerit nobis, Lectorum poscit attentionem.

Miseranda hæc femina, postquam ea contigerant, quæ relata *Tomo V.*, vitam perpetuo ærumnosam duxit, tum Aneurysmatis, tum pulmonis partim obstructi, partimque nonnihil suppurati, symptomatibus; sic nihilominus, ut alio, atque alio tempore tolerabiliora hæcce, vehementiorave, essent. Qui in pectore apertus a nobis tumor fuerat, vehementerque pulsans in fundo suo tuberculum exhibuerat, ad finem Octobris 1760. haud pulsavit amplius; at vero ejusdem viciniae toto in ambitu pulsatio talis, ut viderentur inde attolli costæ. Ineunte Decembri ne vestigium quidem tumoris superfuit, at vero toto scrobis cordis in ambitu perennis pulsatio; quo autem loco infederat tumor, perpetuo observabatur Lymphæ stillicidium, consolidationem aperturæ prohibens; nec exsiccatum, nisi cum Hydrops intercus ante mortem medio præterpropter anno, corpore inferiore oboriretur. Sputa pauca ejecit mucosa, aut purulenta, aut sanguine tincta, purum imo sanguinem nonnunquam. Quæ aberat nunquam anxietas, sic demum crevit, ut tribus ultimis vitæ mensibus sedere erecta dies debuerit noctesque, idque in sedili duntaxat, pendulis perpetuo cruribus, ob idque etiam in dies tumidioribus. Decimo quarto die ante mortem, crura sponte aperta copioso sero fluxere, nec sine ingenti labore, saturatoque Corticis Peruviani fomento, præservari a Sphacelo potuere. Animi deliquia leviora a dimidio ante mortem anno pati ceperat; pulsationes autem consueto in loco per totum id tempus nullas, sed internas tam validas, ut haud ipsa tantummodo, verum & adstantes easdem oculis, auribusque perciperent. Ita demum 23. Febr. 1762. vita miserrima functa est.

In Cadaveris lustratione prima nostra sollicitudo erat illius plagæ in thorace examinandæ, quam olim abscessum, postmodum Aneurysma, idque evanidum tandem,



arbitrati eramus. Rimati hunc locum, & supra costas, & post illas, intraque easdem, Aneurysmatis, aliufve tumoris vestigium, frustra quæсивimus. Unde ad alia conversi, Pericardium universum tenue quidem vidimus, at versus basin Cordis præ tenuitate omnino pellucidum. Cor totum tactu durum, ac dextrum quidem cum duritie depressum, sinistrum autem rotundius. Auricula dextra cum sinu distentissima erat a polyposo corpore, quod ultra duos in diametro pollices habens, constansque idem externa alba, neutiquam vasculosa, membrana, interne copioso coagulato sanguine, tandem utroque suo latere quædam veluti ligamentâ crassâ, albâque emittebat, quibuscum sese columnis, plicisque auriculæ, ut & inter columnas, affigebat. Erant porro columnæ ac plicæ auriculæ hujus eadem proportionem quoad molem auctæ, quam moles totius auctæ auriculæ esset. Polyposo hoc corpore in sinum dextrum maxime extenso sinus hic amplissimus ita replebatur, ut sanguis non nisi furtim post polypum in cor dextrum potuerit illabi. Arteria pulmonalis longum habuit, fortemque polypum, accretum uni Mitralium valvularum. Cor dextrum consuetæ quidem in pariete crassitudinis fuit, columnas musculosas autem tum numerosas valde, tum crassas adeo, durasque, ut nulla earum carnem, veram omnes cartilaginem, referrent. Adeo ampla hujus cavitas, ut junctos meos tres digitos commode caperet. Lævus vero Ventriculus & durus erat, & digitum pariete crassus, angustus autem ita, ut indicem digitum meum vix locaret, paucissimis demum columnis instructus, hisque non liberis, sed ipso cum pariete intime nexis. Liberi in thorace pulmones, excepta levi cum jugulo, & utrinque cum Diaphragmate cohæsione, pleni utrique plurimis, iisdemque duris, ac sanioso pure refertis, tuberculis. Tuberculorumque diversa moles; sic, ut majora semicochleare puris continerent. In Abdomine nihil inventum, quod ad morbum referri posset. Coli enim ac Ventriculi forma, & decursus præ-

ter-

ternaturales hujus subsellii non sunt, sed ad alia reservandi.

Sub Anatome, postque eandem, alii alios intuebamur, hæsitabundi quærebatumus num olim decepti essemus? Et si decepti, quamnam ob causam? Equidem Aneurysma verum adesse posse, idemque manifesto depressum esse, posteaque prorsum evanuisse, notabili exemplo in *Tomo IV. Cap.2. pag. 18. & seq.* constitit. Verumtamen id ipsum Aneurysma a costis quidem, quas inter se penetraverat olim, remotius, & ad costas superiores nunc proximius, nihilominus a morte inveniebatur, loco mutatum duntaxat; hic vero nullum Aneurysmatis tota in Vicinia vestigium. Undenam ergo perceptio manifestissima pulsantis tumoris? Eaque integro percepta biennio? Deinde tumor cur evanidus? Et cui causæ adscribunda est totius circa scrobem cordis plagæ pulsatio? Quid, quod internæ pulsationis violentia tanta fuerit, ut visu, audituque etiam ab Adstantibus perciperetur?

Tuberculorum pulmonis signa, ordine priora, Historia morbi notavit, & signa Aneurysmatis illis posteriora. Igitur a natis, sensimque crescentibus, hisce tuberculis, capimus facile cordi dextro nasci demum resistantiam, augerique, quo suum sanguinem difficilius transmittere potuerit per pulmonem. Utique subito hujus resistantiæ incremento cor brevi suffocatum, enectaque femina fuisset; sed malorum lento adeo, ut vix advertatur, incremento, Vitalia assuescere, ex tot exemplis in variis *Rat. Med.* Tomis allatis conclusimus, ut hic faciles idem admittamus. Cor igitur dextrum tota fabrica sua, cum sinu atque auricula extensum, columnis crassioribus, durioribus, numerosioribusque instructum; cor sinistrum, forte quod minus sanguinis a pulmone recipe-ret, angustum, liberis columnis musculosis destitutum, in parietibus vehementer incrassatum, rigidumque, nec ultra fere contractile; cor, inquam, hoc non nisi vitiosissimas



simas actiones edere debuit, & basi sua, auricula, sinu-  
que vario tempore variis impleri, deplerique modis.  
Adeone inepte suspicaremur hoc mirabile cor degenera-  
scentes suas, extentasque partes, certo quodam tempore  
ad costas ac latera sterni admovisse; alioque tempore  
ab illis removisse, quemadmodum *Tomo IV. pag. 9. &*  
*seqq.* totum Aneurysma & costas admovebat sese, & re-  
movebat?

Hæc porro si probabilia videantur, ponatur tandem,  
quo tempore hoc cor cum suis tumidis appendicibus hæ-  
rebat costis proximius, ponatur, inquam, a communi  
quacumque alia causa tumorum, natus hoc eodem loco  
tumor quisquam, qui primo durus, dein pro parte pu-  
rulentus, effusoque pure fundum adhuc durum, suppu-  
rari necdum aptum, habens; numquid ille a pulsu ve-  
hementi Cartilaginum costarum etiam pulsare non debu-  
erit? & si sub illo tumore veluti centrum pulsationis  
hujus degenerascentis, costisque admoti cordis fuit, an  
similitudo cum vero Aneurysmate magna non fuerit?

Interim jure merito videor jam toties monuisse  
quam incerta sæpe, erroneave sit vera Aneurysmatum  
Diagnos! Quamque ridiculum sit in hisce incertitudini-  
bus, & errorum discrimine, Medicorum ac Chirurgo-  
rum chorum inter sese mutuo altercari; dum sæpe Ana-  
tome neminem rem acu tetigisse, manifestat! Juvat pro-  
inde nosse varios Naturæ errores, ut sæpius, quid esse  
dato in casu possit, quam quid sit, sententiam super eo  
rogati, respondere queamus. Quæ sequuntur proxime,  
hoc meum monitum confirmabunt.

§. II. Quantumvis periculo plena res Aneurysma,  
inculpate potest 30. 40. annorum spatio Aneurysma ex-  
ternum geri. Femina quadragenaria habet a quo tem-  
pore meminit, & ut putat, a nativitate, parvum Aneu-  
rysma ad superiorem, eamque lateralem cartilaginis Thy-  
roidæ partem dextram, pisi magnitudine, nec majus  
unquam, nec minus; nunc magis conspicuum, quod ex

biennio, cum primum me adiret, a diuturniore lactatione vehementer emacruerit. Videtur Aneurysma Carotidis externæ rami primi; quem *Winslow* anteriorem, sive internum Carotidis externæ ramum, vocat.

§. III. Dantur in corpore humano causæ Aneurysmatum validæ, imo Aneurysmata ipsa interna valida, citra sui indicia, alios potius morbos, quam hæc, mentita.

Homo ille, qui *Tom. IV. cap. ult.* foliis Aurantiorum a terrificis suis convulsionibus liberatus, ac sanescere inde visus erat, perfectam non recuperavit sanitatem, aut saltem non constantem, ex quo ejus historiam dedi. Cum sanitatem anni abhinc spatio recuperasse videbatur, servavit semper pulsus, qui ipsi a triennio perpetuus fuerat, tum naturali omnium hominum pulsu, tum suo ipsius pristino, celeriore, fortiore; & quotiescumque per diem explorabatur, semper miram exhibentem in ipsa illa celeritate, ac fortitudine varietatem, imo remissiones quandoque & duritiem. Hic, inquam, pulsus, ipsi a triennio ante morbum familiaris, eundem a morbo perpetuo concommitatus est. Deinde quæ a biennio eum vexaverat molesta tussis, a morbo rediit, sputa educens aut serosa, aut glutinosa, nunquam vero, nisi sub vitæ finem, idque tum raro, tum parce, purulenta. Hæc igitur bina, quorum alterum a triennio, alterum a biennio, affuerat, sanus nunc iterum visus æger, pati denovo cepit.

Resolventia, attenuantia, humectantia, emollientia, cujusvis generis longe tempore ipsi præscripta sunt, nonnihilque profuerunt: at vero sive morbus arte superior, sive negligentia in assumendo, sive notabiles in usu *VI. rer.* non nat. excessus, emendationem nec notabilem ægro produxerunt, nec constantem.

Sensim symptomata accessere, quæ vias dictas primas affectas esse innuerent. Flatuum quippe incredibile prorsum



sum quantam vim maxime ore, nonnunquam etiam ano, redderet. Vix unquam simile vidi. Equidem ipsi id fuerat ab adolescentia familiare, ut si quis ipsi, scienti quantumvis, ac videnti, manum, brachiumve rudius attingebat, copiosos mox ore dimitteret flatus; ita ut miris nervorum affectionibus obnoxius jam tum haberetur: at vero nunc citra ejusmodi causas, flatus aut erupere, aut si non erumperent, continuo anxietates in ventre, vel ad præcordia, ipsosve colicos generarunt dolores; evanida mox iterum symptomata, dum frequentes, fortes, ac sonori, ructus, flatusque, explodebantur.

Docebant hæc, inquam, primarum viarum affectionem. Verum a quibusnam affectis partibus? Sane totius abdominis externe tacti naturalis mollitudo, optima alvus, bilis præsentia laudabilis, appetitus egregius, summa viarum primarum, dum flatus non urgerent, libertas, atque integritas; notabile viarum primarum vitium non admittebant.

Historia morbi, præcedenti tomo relata, verosimile id ponebat, quod convulsionum sedes in capite esset. Dolor siquidem capitis supra oculum fixus, vertigo, tinnitus aurium, sæpius longe ante convulsiones, interque easdem percepti, id insinuabant: at vero ne illis viæ primæ symbolam conferrent, flatus post singulam convulsionem emissi, eandemque terminantes haud levem dabant suspicionem.

Quin & aliud quid confusionem formandæ diagnoseos peperit. Febris ante natas convulsiones. Tomo VI. descriptas, quatuor mensium spatio ægrum tenuerat. Eodemque tempore pulsus de die fortis, ac frequens, sæpiusque durus, observabatur ad vesperras debilis, ac celer; cum frigore non horrifico, trihorii, aut quadrihorii spatio, durante: Ægro interim nec sitiente vespere, nec lectum petente, imo ex-eunte, spectaculis se recreante, hominumque domi, fo-

risque, frequentante societatem. Convulsionibus porro curatis, continuatoque post easdem curatas Aurantiorum foliorum ultra mensem decocto, exulavit penitus hæc Febris, nec nisi ultimo vitæ mense post quartam pomeridianam frigore ac calore conspicua, 10. 12. horarum spatio ægrum vexavit: sed de iis, quæ prope mortem contingere, mox acturus, ea, quæ diu antea observata, modo prosequar.

Igitur dum tussis pluribus fiebat horis, dum incommodo flatus non erant, dum Febris vel penitus aberat, vel vespere vexabat duntaxat, dum denique frequens, ac fortis, sæpeque durus pulsus, in ceteris hominibus febrilis vocandus, homini perseverabat; nemo sane, qui multi affuere, Medicorum toto ejus in corpore accusare, aut culpæ quidquam potuit. Caput serenum; Respiratio, etiam valido in motu, fortis, constans, profunda; validus appetitus; naturalis, debitoque tempore reddita alvus; lingua perpetuo pura; molle abdomen; videbantur iterum omnem viarum primarum affectarum, affectorum primario Thoracis viscerum, suspicionem abegere.

Hæc cum sic se haberent, frequenter convocata Medicorum consilia non nisi palliative, ut vocant, agendum esse concluderunt; notabile quid latere sese constanter fassi. Remedia igitur hoc scopo data, etiam posthac sumpta, quam olim, accuratius, nunquam emendationem generare constantem. Quæ glutini ac tussi dicata, nullius erant frugis. Quæ ad flatus dissipandos laudamus, apta, multa, ac varia, & efficacissima, usu passim cassa fuere. Ipseque Peruvianus Cortex imminuit quidem, sed non sustulit Febrem; isque alias & debiliore pulsus animator, & frequentioris moderator, nullam unquam in consueto ægri pulsu mutationem produxit. Egregius *Boerhave* censebat in ejusmodi pulsu Acre adesse, quod moveret validius, & crassum, quod minora vasa obstrueret.

Acri-



Acrimoniae singularis species nullis unquam signis determinanda fuit, sed suspicionem ejusdem latentis nonnulli tum juvenilis vitae, tum virilis, formabant errores: Verum nec Mercurius, nec saturata Sarsæ parillæ decocta, quidquam profuerunt.

Atque ita ad vitae terminum properabatur. Crurum tumor sensim ad genua, femoraque conscendens, prioribus se junxit ærumnis. Sponte sæpe sua, Medicorum hortatu nonnunquam, Sedlicensibus aquis abundanter se purgantibus, depellere has aquas, sed frustra, annisus est. Demum ultimo vitae mense anxietates, interno in pectore dolores, respiratio nonnihil debilis, appetitus prostratus, explosio flatuum continua; dolor brachiorum vagus, ac tumor; tussis per semihoram & ultra continuans, cum sputis aut serosis, aut mucosis, aut, quod rarius tamen, purulentis; decumbendi impossibilitas, insomnia, vitam fere intolerabilem reddiderunt, metumque, ne forsitan Hydrops pectoris, aut tetrius quid in thorace generaretur, incusserunt. Gravis per ultimum octiduum Peripneumonia densum ac phlogisticum sanguinem iterato pertusa vena ostendit. Tandem anxietatibus auctis, jamque perpetuis, expiravit.

Invenimus in Cadavere cranium crassum cum copiosa diploe; sinum longitudinalem vacuum fere; in cranio, supra orbitam dextram, plagam denarii magnitudine cariostam, cui meninges accretæ, ipsumque eodem in loco cerebrum leviter inde mutatum. Sub pia Matre toto quidem in cerebro, sed in sinistro hemisphærio plus, effusum serum. Piæ Matris vasa turgidiora sanguine, in hemisphærio dextro. Ventriculi superiores fere vacui; plexus choroidæi exsanguis, ac veluti repleti muco. Aeris nonnihil cum paucis admodum cruore in Arteria Cervicali *Willisii*. Et quos in ventriculo quarto plexus choroidæos solemus invenire, horum hic ne reliquias quidem. Nervos opticos ante coalitum quidem æquales, post eundem vero ita inæquales reperiimus, ut sinister

ab ipso coalitu, ad usque orbitam, crassitudine dextrum longe superaret. In thorace nullus hydrops, neque pus; pulmones obscure rubri, hinc inde lividi, flaccidi ita, ut hinc inde inter attactum diffluerent fere, at vero nihil omnino purulenti. Asperæ arteriæ annuli cartilaginei plane ossei erant; ossei & illi Bronchiorum: horum priores ad Bronchiorum initia, divisionesque, sua ossea extremitate, sed interna Bronchiorum membrana tecta, intra cavum aereum, idque pluribus in locis, utrinque prominebant. Cor magnum, sed flaccidum, coagulato cruore utroque in cavo plenum, parietibus suis, ac potissimum sinistris, extenuatum valde, columnis carneis in utraque cavitate instructum exilibus, debilibusque. Valvularum mitralium margines sinistri cordis duræ, fereque osseæ, ex sese genuerunt quandam penitus osseam substantiam, oblongamque eandem, & phalangi primæ digiti minimi magnitudine parem, in cor ipsum sua pendulam gravitate. In Abdomine Ventriculus decem librarum, capta mensura, capax, non crassus. Magnum Omentum, Jecur, Splen, Pancreas, Renes, maxime dexter, debito longe flaccidiores. Copiosa, fusco-flava, Bilis. Ad Genitalia nihil repertum vitiosum.

Ostendit hæc, ni fallor, Historia anatomica abunde id, quod dixeram, posse scilicet esse præsentis in corpore Aneurysmatum causas, citra eorundem symptomata. Cor utroque in cavo flaccidum, extenuatum, extenuatius in sinistro, oportuisset aneurysmaticum fieri. Corpus osseum mole adeo magnum ad mitrales Venæ pulmonalis valvulas intime, lataque basi, nexum, cum sanguine a pulmonibus omni momento in sinistram cor pulsus, ac proinde hoc cor præternaturaliter irritans, vicissimque contrahente se corde ad valvulas repulsus; corpus, inquam, hoc, & cor, & venam pulmonalem, perpetuo irritans, sanguinisque transitum turbans, debuisset necessario hoc cor extenuatum reddere aneurysmaticum, & Venarum pulmonalium communem alveum vehementer varicosum.

Ut



Ut causa Aneurysmatis sine effectu, ita Asthmatis, Dispnoëæ, Orthopnoëæ, manifestissimas causas, citra horum morborum in vita præsentiam in cadavere experti sumus. Non enim annuli Asperæ arteriæ tantummodo, verum & Bronchiorum, vel, si mavis, intimorum Bronchiorum frustra cartilaginea, plane ossea erant, quæ ad majorum Bronchiorum divisiones intra cavum aereum notabiliter prominula, cum inspirato, tum expirato aeri, impedimento & offendiculo esse eminentia sua, & cavi coarctatione, debuerunt. Attamen non nisi brevi ante mortem, ab hisce causis, quas longa modo dies generat, quidquam Asthmatis, affnibusque illi symptomatibus simile pertulit æger. Interim non advertimus in quinquagenario homine cartilagineorum horum annulorum naturam in osseam mutari, sed solummodo, & nonnunquam, in decrepito senio; ut bene notat incomparabilis *Morgagni lib. 2. Epist. Anat. Med. 15. Artic. 18. pag. 133.* Nihilominus observavimus in ægro nostro Respirationem illibatam, profundam, fortem, lentam, non mutatam a motu & loquela, constantem; verbo talem, qua meliorem habere nemo mortalium possit. Ergone ossea hæc degeneratio solius invincibilis tussis, non aliorum morborum causa fuit? In hoc homine sic videtur saltem.

Verum & Apoplexiæ, variorumque capitis morborum causas idem gessit, quos habuit nunquam. Pauculum feri supra cerebrum effusum, quod integris ejus membranis & crassum esse, & pelluciditate vitreum, videtur; quodque perfectis membranis, tenuis modo lymphæ est; Apoplexiam, Mortes subitanæas, Paralyfes, Convulsiones, sæpe producit, ut me toties Anatome docuit, ut casuum anatomicorum Collectores referunt, ut evidentissimis exemplis, tum *Valsalvæ*, tum suis, *Morgagni* demonstravit, *Lib. 1. Epist. Anat. Med. 4.* Equidem affuere ex hisce Convulsiones; sed an hæc inde? Dubitatum fuisse, innui supra, num a viis primis haud oriundæ, quod flatus, ore pulsi, harum paroxysmos con-

stanti lege terminarent. Sed demus neque hinc easdem ortas esse; demus a causis in encephalo agentibus, id quod tam sæpe observamus, Ventriculum fuisse spasmodice affectum; nonne ex Anatome constitit binas notabiles causas, convulsionibus generandis aptas natas, in cranio repertas esse? Serum scilicet effusum pauculum, & caries cranii cum concretione membranarum, & cerebri degeneratione, ad locum cariosum: quarum posterior ad id longe potentior priore adparet.

Interim utraque harum ortas convulsiones credideris, mirari mecum debebis, quod causæ hæc mechanicæ ultimis octo vitæ mensibus integre siluerint. Nunquid vis Fol. Aurant. adeo energica, ut causas tales mechanicas liget, ne queant ultra effectus producere suos?

Quam ardua aliquando res, morborum diagnosi! Quam indignum honori artis, velle in ejusmodi consultationibus ob fallaces similitudines aliquid ita propugnare, ut haud ita sentientium famæ inde detrahatur! Mortui sæpe veriora, quam vivi, loquuntur.

§. IV. Sed en haud ab similem casum! Juvenis 28. annorum sicci, &, ut videbatur, spasmodici Asthmatis, paroxysmis a biennio affligebatur, causæ, præter nimias forte Lucubrationes, ignarus. Consuluerat me morbum per annum passus, dein alios, tandem me convenit iterum die 17. Septembris proxime elapsi. Contigit porro ut eo tempore coram me, pluribusque Studiosis, paroxysmo invaderetur. Sederet suasi; renuit, mitius sibi esse, citiusque stanti paroxysmum terminari, ratus. Respiratio anhelosa, cita, brevis; nisi ipso eam ita cohibente, & retinente, ut cuncti horreremns. Unicum in respiratione cohibenda solatium situm esse testabatur. Pulsus eodem tempore parvus, tempore, rythmoque inæqualis. Spatio 5. aut 6. minutorum terminabatur accessus; post quem rite valentem se semper ajebat. Quandoquidem selectissimis remediis a variis Medicis præscriptis tanto tempore frustra usus esset, autor fui, ut quovis tri-



trihorio, aut etiam bihorio fumeret guttulas 5. 6. 7. cum aqua spiritus salis ammon. cui ad perfectam saturationem additus esset sal succini volatilis; fumeret autem spiritum hunc sine calce viva paratum, siquidem paratus cum illa, non effervesceret, adeoque perfectum non indicaret saturationis punctum; notante ita in Chemia sua *Hofmanno*. Bene inde habuit, usque ad 21. Sept. cum perfecte sanum se perhibens, circa horam 10. vespertinam paroxysmo correptus, ad horam dimidiam post mediam noctem expiraret.

Die 24. Sept. Anatomen feci, præsente Viro Illustrissimo *Mac-neven o Kelli*, inclytæ Facultatis Medicæ *Pragensis* Directore per universum *Bohemiæ* Regnum, ac Professore, Clarissimo Domino *Pachner*, Foundationis *Windhagianæ* Physico laudatissimo & circumstante magna Studioforum corona.

Pulmo dexter universus pleuræ, diaphragmati, ac jugulo accretus; antè ad Sternum quidem levius, ad posteriorem autem inferioremque thoracis partem firmitus, indissolubiliter vero ad jugulum; quin & ipsi inter se mutuo coaluerant lobi. Notabamus autem qua parte lobus superior jugulo cohærebat, inæqualem duritiem, ac tubercula fere cartilaginea, continentia partim pus saniosum, partim duram ac ferme caseosam materiem. Pulmo sinister perfecte sanus, undique liber.

Annuli asperæ arteriæ, Bronchiorumque tum annuli, tum frusta cartilaginea, rigiditate ossæam æmulabantur naturam; ut mecum clari, qui adstabant, Viri, studioforumque seniores, judicabant.

Cor magnum valde. In pericardio aqua modica. In corde utroque, inque vasis majoribus, imo & perscissis multis minoribus, fluidissimus, absque vel minima alicubi concretionem polyposam, sanguis; contra quam in iteratis toties luctis, & animæ retentionibus, expectari poterat. Cor dextrum tenue valde in parietibus, sinisterum valde crassum, durum, ac rigidum. Capax satis

cor dextrum, ut tres digitos junctos, eisdemque fere medios, capere posset; capacissimum adeo sinistrum, ut totus pugnus in eo absconderetur, vertereturque. Copia in utroque fluidi sanguinis, in dextro major.

Aorta arteria ampla valde a basi cordis usque ultra suum ita vocatum angulum; inde parum angustior, sensim denovo dilatabatur in amplitudinem duplo majorem, ad iliacas fere usque; ita quidem, ut ibidem primo longitudine sex latorum digitorum dilatata, tandem solitam capacitatem, Iliacas datura, affectaret.

Ventriculus magnus, altitudinis quidem solitæ, sed duplo majoris latitudinis. Ingens hepar, ponderosum, compactum, lobo sinistro suo magnam sinistri Epigastrii plagam explens. In vesicula fellea bilis tenuissima, colore ichoris, aut loturæ carniū rubicundioris. Splen durus admodum, figuræ triangularis, angulo acutiore ventriculum contegens. Colon totum contractissimum & vacuum.

Igitur cor dextrum, ratione sinistri, parvum, ac debile; cor sinistrum duritiæ ac densitate non modo robustum, sed non sufficienter flexile atque obsequiosum, capacitate autem aneurysmaticum. Aneurysmatica magna sui portione Aorta. Pulmo in toto latere dextro vicinis partibus concretus, in lobo superiore intime connatus, & tuberculis durissimis ultra medium obsessus. Hæc, inquam, & multa, & capitalia, vitia, deteximus, interea dum nulla in vita signa Aneurysmatis sive cordis, sive Aortæ; nulla signa affecti primario a cohæsione, a corruptione, ab annulorum cartilagineorum rigiditate, pulmonis, comparerent. Et cum causis adeo valentibus morborum tum gravissimorum, tum perpetuorum, non adfuit integro biennio nisi periodicus morbus cum intermedia sanitate, qui similitudinem gessit affectionis spasmodicæ mesochondriacorum forte musculorum; quam detento, dilatato, calefacto, rarefactoque aere, solvere conabatur.



§. V. Terminarem hanc historiam, nisi obviam eundem foret iis, qui forte mirabuntur, minus versati in Anatomicis, quod inter causas majorum morborum hic videar cohæsionem cum pleura pulmonum collocare. Imitatus fui varios *Sepulcræti anatomici*, ac *Medicinæ septentrionalis* Autores; imitatus etiam *Boerhaviū Instit.* §. 835. Sano autem sensu hæc intelligenda sunt.

In cadaveribus secandis raro deprehendimus liberos ab omni cohæsione pulmones; ut haud inepte *Diemerbroeckius* tertiam, aut quartam mortalium partem, hac cohæsione minorem, majoremve laborantem, suspicatus fuerit; idque sæpenumero sic, ut nulla ejusdem in vita signa, aut suspicio, affuerint. E contrario, in gravissimis, iisdemque annosis pectoris, pulmonisque morbis, nullam, aut vix memorabilem adhæsionem detegimus, ut hoc ipso capite bina observatione constitit. An nihilominus his positis nulli ab hac causa aut possibiles morbi, aut inevitabiles? Difficilius admittunt, qui pulmones pleuræ perpetuo contiguos esse statuunt. Demus autem verius hoc systema esse eo, quod id neget, an ideo cohæsiō hæc nunquam morbifica est? An sufficienter considerant illi, quanta intersit differentia inter pulmones pleuræ, exhalante rore intermedio, semper admotos, liberos tamen sanosque; & pulmones sive totos, sive medios, cum pleura unitos, & non raro, eodem rore deficiente, induratos? Equidem ad experimentum provocant, quo toties a morte inventa cohæsiō integra, sine ejusdem in vita notato indicio. Sed quærant primo hi diligentius apud casuum collectores num verâ narrent? Examinent, num frequentes sint casus connatorum undique pulmonum, cum respiratione in viventibus illibata? Afferere ausim vix paucos inveniendos fore. Hinc 2. dico unico pulmone connato, altero libero; vel datis minoribus utriusque, alterutriusve pulmonis adhæsionibus, videri nonnunquam sic affuescere naturam, ut homines quidem initio male habeant, quales utique novi, deinceps vero affuescant,

nec multo ante obitum tempore notas ejusdem exhibeant. Verum an ideo nulli; qui inde male habeant? Et cognovisse me tales puto; & descriptos ab observatoribus ejusmodi casus lego, qui nullam aliam notam læsæ respirationis causam, præter hanc, notent; & magnum *Boerhaavium* hanc etiam morbi recensentem causam deprehendo. Sed tertio, demus tandem inventos in cadaveribus pulmones undique connatos utrosque, [respiratione in vita neutiquam læsa, qualem unum, alterumve casum ipse descripsi, an ideo integra hæc concretio ex morborum erit expungenda causis? Anatome detexit cerebrum cum membranis suis æque exacte implere calvariam, quam pulmones, secundum multorum sententiam, exacte semper repleant thoracem: Ergone connata pia meninx cum dura, arctiusque hæc cum illa concreta, nunquam venient inter causas recensendæ morborum? Præsertim cum ex Anatomicis constet hæc sic gesta in vita fuisse, nullis comparentibus signis? Certe & inculpate hæc tolerata fuisse novi; sed simul, aut Apoplexiæ, aut Epilepsiæ, aut Convulsionis, aut Maniæ, aliorumve Capitis, Nervorumque morborum, unicam extitisse detexi a morte causam. Pericardium secundum *Halleri* in *Addendis* ad *Tom. I. Elem. Phys.* sententiam, exacte tegitur perpetuo a superficie cordis, „ nisi quantum tenuis aquula intercedat; „ an ideo pericardium cum corde concretum nunquam extiterit cordis palpitantis, aliorumve morborum, origo? Experientia mea in cadaveribus propria, notisque a Scriptoribus casibus, novi & inculpate quandoque hunc cordis cum pericardio coalitum toleratum, at sæpius non, nisi cum vita penitus miseranda, gestum.

Si tamen quis a me petierit quid causæ credam, cur hos pulmonum, cerebri meningum, pericardii, coalitus, hi inculpate ferant, graviter illi? respondeo quidem in genere, ut supra, videri nonnullos sic ærumnarum assuescere causis, ut validis vitæ viribus easdem su-



perent: alios vero esse, quibus vita imbecillior nequeat earundem causarum suffocare activitatem; attamen insufficientem ad plures casus solvendo hanc responsionem esse, facile quisque perspicit, qui mecum considerat Historias ab Autoribus, & etiam a me *Tom. II. & VI.* hujus operis, communicatas, quæ pro omni responsione doceant nostram crassam vitæ humanæ, ejusdemque latitudinis, ignorantiam. Videantur in hanc rem *Vindiciæ* meæ contra *Hallerum*, a pag. 232. ad 236.

Tandem ex hisce & innumeris tum in *Tomis* prioribus, tum a casuum *Collectoribus* recensitis, sectionibus anatomicis, evidenter capimus causas mechanicas, fixas, validas, diuturnas, perennium morborum, in corpore humano latere, quæ vel nunquam in actum ducantur, vel per paroxysmos duntaxat, vel etiam perpetuos generent morbos: unde qui malo non perpetuo perpetuas negaret causas, sæpe vehementer falleretur. Causæ hæ perpetuæ, si morbum continuant, proægumenæ simul & procatasticæ causæ vicem gerunt; sin vero intermittentem, videntur proægumenæ præsentibus sæpe carere procatasticis. Cur autem causæ completæ & proximæ, vere existentes, morbum non generent, ad hoc supra respondi.

### C A P U T III.

#### De Hydrope Cystico, et Hydatidibus.

- §. I. Repetitur mirus femine morbus, qui longe, lateque descriptus *Tomo IV. cap. 3. pag. 43. & Tomo V. cap. 2. §. 4.* ac tandem ejusdem additur per mortem finis. *Stupenda Anatome, doctrinam illustrans de Hydatibus. Quæstio de usu ac natura Ventriculorum superiorum Cerebri.*  
§. II.

§. II. *Jecur scirrhusum in vita visum, a morte inventum est mirifice hydaticum.* §. III. *Binæ Hydatides Mammarum, quas scirrhi in cancrum vergentis larva nobis imposuisse, ipsa chirurgica enucleatio nos docuit.* §. IV. *Glandula ingens Thyroidea, præter quodcumque fere genus tumorum, exhibuit nobis quoque ingentes Hydatidas, aquosas, ichorosas, saniosas, sanguineas.* §. V. *Induratos glandularum, partiumque glandulosarum, tumores, haud raro mentiri naturam scrophulosam, scirrhusamve, variis exemplis, tum a Clarissimo Morgagni, tum a propria experientia petitis, demonstratur.* §. VI. *Miranda origo Hydatidum in Viro, quæ specie Herniæ inguinalis incompletæ, scirrhusorumve in ventre tumorum, nos luserat, Anatome detecta.* §. VII. *Examen universæ de Hydatidibus doctrinæ, quæ tandem apparet potius quid non sit Hydatidis, quam quid sit, exposuisse.* §. VIII. *Cuduntur ex cunctis hucusque enarratis Theoremata decem pathologica, & practica.*

§. I. **I**N variis hujus operis tomis multus fui, longueque, in hoc articulo; talis denuo futurus, eo quod similium observationum finis nunquam detur.

Inchoabo a retexendo filo, quod abruptum fuit Tomo V. cap. 2. §. 4. quandoquidem feminae hujus calamitatibus mors finem imposuit, adeoque causas morbi obscurioris rimandi fecit copiam.

Anni 1760. autumnum, maximamque hyemis partem, incommode ac misere citra auxilium transegit, quia auxilium noluit. Anno 1761. Febr. 3. me iterum convenit, monstroso plane, ac veluti in acumen prominulo ventre, citra vel minimam, excepta exigua sinistri Epigastrii plaga, fluctuationem.

Tertiam Paracentesin petivit. Diu super illa inter nos deliberantes, dubii pependimus. Constabat enim ex prioribus & Abdominis laborare, & Cystidis hydrope. Hydrops Abdominis autem nunc, ut dixi, fluctuatione vix percipiendus erat. Interim urfit adeo vitalis indicatio,



catio, adeo proxime suffocanda mulier nobis visa est, adeo anxietates arcebant somnum, ut integris septem septimanis oculis non vidisset illum, adeo denique citam operationem a nobis per DEUM flagitabat, ut paracetesin demum eo epigastrii a latere umbilici loco, in quo levem fluctuationem nos percepisse supra monui, instituerimus; ea videlicet spe, ut aquæ hydropicæ abdominis certo quodam corporis positu, lenique abdominis ab inferioribus eo ducta, directaque pressione, hinc totæ effluerent.

Spes autem hæc fefellit nos. Qui locus fluctuare nobis visus, is verus saccus fuit, plenus humore glutinoso, tres pollices profundus, nec fere quidquam, præ tenacitate effundens.

Porro infelix nostrum conamen incussit nobis metum, ne ad aperturam, id quod in similibus solemne, Gangræna fieret. Hinc tussi quidem mistura cum Oxym. sq. prospexi, Gangrænæ autem Cortice. Unde sola Gangræna averruncabatur, cetera vero symptomata increvere, nausæque ac vomitus frequentissimi, pertinacissimique, una cum deleto penitus appetitu, se prioribus adjunxerunt.

Quod hanc calamitatem unice moderabatur, vinum fuit. Unde per aliquot dies nihil ipsi dedi, quam ovorum vitellos cum vino & aqua conquassatos, pauxilloque tosti panis. Præterea Enema injectum quotidie est. Mirum sane quantopere hinc refocillaretur mulier, quam blando somno inde recrearetur, quamque bonum appetitum, ac digestionem etiam aliorum ciborum inde nancisceretur! Unde lares suos repetere avida, nosocomio dimitti petivit. Abiit 5. Martii.

Tandem, ultimoque, ad 10. Junii reducebatur, ventre tumidissimo, cum ejusdem leviori fluctuantis liquidi verisimilitudine, cum vaginæ prolapsu, oculis ac facie collapsis, pulsu vix percipiundo, jamque in tertium diem continuato vomitu. Vomitu ad sextum diem  
su pe-

superato, calamitates reliquæ auctæ sunt; ipsaque insonnis, delira, & integro triduo cum morte luctata, expiravit Junii 17.

Factu difficilis anatome fuit, eademque adhuc difficilior explicatu. Ita ut qui præsens eandem non viderit, ejusdem legitimam ideam vix formare sibi possit.

Ut in vita, ita in cadavere nihil non extenuatissimum, solo ventre excepto. Animus erat, ablatis integumentis ac musculis, Peritonæum prudentissime aperire; quo in situ immutato, & acuminatum tumorem, & totum contemplaremur abdomen. Conamen vero hoc nostrum elusit idem Peritonæum, indissolubiliter, ac frequentissime, cum contentis in ventre partibus, connatum. Pertundendum ergo ubique fuit, eoque facto, Gelatum flavum, separatis in loculis inclusum, prodiit undecumque. Digitus singulos intrusus in loculos, aliorum loculorum sèpimenta detexit; e quibus pertusis, pressisque, liquor priori similis, præ tenacitate vix fluens, prodiit.

Lento demum, ac tædioso, sordidoque plane examine, constitit degenerascentem uterum non esse, qui corpus adeo prominens in abdomine produceret, ut forte suspicati *Tom. V. cap. 2.* eramus. Uterum enim invenimus mole naturali minorem, vaginam autem ejus elongatam & productam ad altitudinem illam, quæ quatuor digitis latis altior pelvi esset. In latere sinistro Ovarium durius quidem, sed mole non majus, parvaque cum tuba. Uterus apertus facultatem dabat stylo prudenter subeundi orificium Tubæ dextræ, atque ita docuit hanc tubam ad latum ab utero digitum mox abire in saccum ingentem sic, ut totum hoc monstruosum abdomen tam in sinistro hypogastrio, ac ventre, quam in dextro, expleret. Crassus præterea hic saccus erat, informis, interne politus, ac glutinosissima sanie repletus.

Deprehendebatur autem idem duos includere tumores; alterum suo in fundo prope uterum, ovalem, depress-



pressum, palmæ manus magnitudine parem, polita membrana vestitum, aut loculis simili glutinosa sanie refertis divisum; alterum in suo dextro latere, rotundum, rubrum, tuberosum, biennis pueri pugnum æquantem.

Cum Ovarium dextrum non inveniremus, alterutrum horum tumorum suspicabamur Ovarium esse, verosimilius autem eum, qui utero propior; idque ita contigisse, ut tuba primo Ovario extenso accrevisset, ac postmodum inferiora Ovarii præternaturaliter circumplexa, idem demum intra suum cavum locasset.

Atque hi quidem tumores ii erant, qui in cavo sacco prominebant: ceterum plures cernere erat, minores, majores, unum pugno majorem, intra crassam sacci substantiam locatos, ob idque internam ejusdem externamque superficiem inæqualem admodum ac tuberosam efficientes. Erant & hi, haud secus, quam priores, sanioso glutine repleti.

Porro in Epigastrio erat sacci fundus. Dixeram saccum replere cum dextrum, sinistrumque hypogastrium, tum ventrem: non replebat tamen spatium anterieus circa umbilicum, infraque eundem; spatium, inquam, illud, in quo venter quondam adparens acuminatus, graviditatem mentitus erat, ut *cap. 2. Tomi V.* relatum est. Erat igitur in spatio descripto alius peculiaris tumor, magno sacco anterieus adnatus, capitis humani magnitudinem æquans, posterius planus, anterieus protuberans, compositus quoque numerosissimis Hydatidibus, per sua latera mutuo accretis, hincque referens totidem separatos loculos, hic tenues, ibi densos, membranis tuberosos, omnes autem tenacissimo glutine, in alio fuscescente, in alio flavescente, alio iterum viridescente, repletos.

Jamque Peritonæum aliud spectaculum dabat. Concreverat siquidem id cum sacco magno, in toto ejusdem ambitu, quo contiguum illi erat; verum ita, ut Peritonæum esse crederet nemo nostrum. Etenim, & qua par-

te saccum magnum contingebat, & qua reliquum cingebat abdomen, & qua viscera abdominis includebat, gerebat ubique tubercula plurima, quæ in loculos divisa, eandem glutinosam materiem continebant: eorundemque loculorum ope etiam Hydatidibus cum magno illo ac glomerato ad umbilicum tumore intime & commistum, & confusum, deprehendimus.

Vix Intestina cognovimus. Ea quippe, tam crassa, quam tenuia, adeo inter sese commista erant, adeo concreta & connata, ut primo intuitu nihil minus quam intestina referrent. Vera horum ratio erat quod Hydatides in universo Intestinorum ambitu, & in utraque Mesenterii ac Mesocoli superficie excrevissent, inter sese coivissent, ob idque ita omnia intestina inter se mutuo adunassent, conglomerassent, contraxissentque, ut nihil intestinis simile referrent. Sed & Hydatidas easdem glutinosissimus ichor, saniesve, expleverat. Interea mirabamur vesicam urinariam loco locatam suo, ita ut a peritonæo suo in loco servata illa, vagina & sursum excrevisset, uti antea dictum, & deorsum relaxata esset, cum prolapsum formasset; suo tamen cum vesica nexu mansisset immobilis. Forte pondus incumbentis sacci impeditur vesicam sursum pergere, & vaginam sequi: dum e contrario in historia relata *Tomo VI. cap. 4. pag. 64.* degenerascens testiculus dexter, recto intestino immoto, vesicam urinariam viri in cristam Ilei sinistri usque dimovisset, adeoque urethram elongasset.

Thoracis angusta valde capacitas. In dextra Camera Gibbum Diaphragmatis distabat a summo jugulo digitis latis quatuor, quinque digitis in sinistra. Pulmones nec mali, nec compacti, nec ullibi pleuræ, nisi versus jugulum, accreti. Cor in dextro ventriculo Polypum gerebat magnum, atque album, adscendentem in Arteriam Pulmonalem; in sinistro suo ventriculo duplo minorem, eumque cum alio, qui in Auricula, polypo, connatum.



Vasa Piæ Matris sanguine turgida. Ventriculi laterales, sive superiores cerebri, vix guttulas lymphæ paucas gerebant; egregie licet distenti, magni, fornicati. Quid causæ, cur, ubi omnia in cranio tam plena, ut mox a compressione externa ablata cerebrum excrescat in fungos, tamen vacuos toties a nobis repertos hos ventriculos non comprimant, non deleant, vis reliqua molis cerebri, sanguinisque appellentis? Cur in vacuis ventriculis Plexus Choroidæus non perpetuo aneurysmaticus, varicosus, hydaticus?

Si totam anatomen respiciamus, quid monstri Mortales sæpè sinu alunt suo! Quam frequens mutatio exiguæ tubæ Fallopiianæ in massam enormem, informem, ac prope incognitam! Sed causa, origoque, tot millenarum in quovis viscere, in quavis membranacea parte, Hydatidum, quæ assignanda demum? Confer cum hisce Historiam Hydatidum in ventre feminæ, *Tomo IV. cap. 3.* Obscuram totam hanc Medicinæ partem esse, sequentes confirmabunt Historiæ.

§. II. Eruditissimus Medicus, Nosocomii Hispanici vigilantissimus Physicus, *Hazenohrl*, ejusque solertissimus Assistens *Laseowitz*, 14. Febr. hujus anni, copiam mihi fecere hepatis hominis, pridie ibidem denati, una cum morbi historia.

Juvenis 24. annorum, tumido Epigastrio quidem toto, in medio autem ac dextro longe tumidiore, a quadriennio laboraverat. Impedimento id tamen non erat, quo minus Chirurgiam addisceret, jamque in Nosocomio Hispanico Assistantis Chirurgiæ munere fungeretur, donec 4. Febr. acute decumbere cepit. Die febris quinto delirare cepit, inque nonum delirans, obiit.

Nihil lymphæ in tumido ventre, sed jecur monstruosæ molis, ac pluribus veluti scirrhis videbatur obsessum. Horum unum Vir præstantissimus cum suo Assistente aperuerat, cumque insoliti quid ibidem detegeret, Hepar cum reliquis tumoribus intactum ad me mittere decre-

vit. Igitur ille aperto isto tumore magno, in visceris hujus Lobi dextri anteriore parte, utcumque versum lobum minorem sito, mox erumpentem, inque sese infilientem Lympham ad plures, ut putat, mensuras, (inopinato quippe in casu vas ad manum haud erat) stupens vidit. Elapsa autem Lympha, invenit membranam albam, crassam, multis in plagis diaphanam, excavatum in jecinore locum exacte quidem contingentem, verum nullibi adhærentem illi, cum eove connexam. Hanc loco repositam, unâ cum Hepate toto ad me misit.

Membranam dixi, quod, qua alia eam voce nomen, non habeo; verum quo sensu alias membrana vocamus, eo sane membrana vocanda non erat. Alba quidem crassaque erat; sed sive bono, nudoque oculo, sive microscopio intuebaris, nullis omnino sive vasis, sive fibris apparebat composita; ovi albumini ad latam patinam effuso, atque coagulato, quam simillima; lacerabilis ita, ac si cultro quis eam percidisset. Erat etiam lævis, politissimaque excavati jecoris superficies.

Jamque alterum eodem in lobo tumorem aperiens, deprehendi Hydatidas, non, ut in priore, quæ totum cavum exacte expleret, unicam, sed numerosas, libere fluctuantes, citra vel minimam alicubi adhæSIONem, citra ullius pedunculi vestigia, ejus molis inter sese differentiarum, ut minimæ vix lineam in diametro haberent, deinde crescente ordine majores pollicis essent, imo & sesquipollicis diametri.

Cavum tertium in lobo sinistro similes omnino Hydatidas gerebat.

Deinde quarto similes reperii non in cavo hepatis, sed in magno eoque oblongo corpore, quod ad lateris extremi sinistri lobi superiora accretum, figura Lienem referret, quodque tamen Lien non esset; eo quod is, in cadavere, separatus ab illo tumore, inventus fuisset. Aquam continuit cum omnis generis Hydatidibus.



Quintus locus erat a latere dextro prioris, maximique cavi, hepar tam profunde excavans, ut pugnus in eo locari posset; isque non, quemadmodum omnes præcedentes, aqua limpida, verum amurca nigra, tactuque arenacea, repletus: membrana porro unica, explens totum cavum; hanc amurcam continebat, lacera hinc inde ac complicata, & ab aspera amurca adhærente valde indurata.

Pars dextra, superiorque lobi dextri continebat *Sextum* cavum, priore majus, biloculare, crassa itidem ac pingui amurca plenum.

Vesicula fellea paucam quidem, attamen flavam bilem habuit. Pararuntne Hepatis non excavati portiones hanc bilem? An vero ipsius Cystidis felleæ parata fabrica fuit?

In altero, tertioque, ac quarto cavo, multas hydatidas contractas reperire fuit, unde forte aqua illa, in qua reliquæ integræ libere fluctuarunt. In quinto & sexto nulla aqua, sed amurca.

§. III. Scirrhum in Cancrum vergentem olim cum dexterrimo Chirurgo in *Hollandia* enucleaturus, obstupui, ablatis integumentis, inchoatoque enucleationis opere, tumorem subito frangi, & effluente aqua copiosa, totam concidere mammam. Curato vulnere recrevit tumor, qui magnos excitans dolores, ablatu non fuit; semina, nescio a quo morbo, brevi extincta.

Contigit mihi idem *Viennæ*. Doctissimus Chirurgiæ Professor *Leber*, egoque, certo statuebamus verum in Mamma scirrhum adesse, liberumque eundem, & enucleandum. Sub operatione constitit pigni magnitudinis Hydatida esse, quæ a circumcreta, compressuque indurata cellulositate inæquali, scirrhi inæqualitatem referret. Habebat pellem externam albam, crassam, lacerabilem, nihil omnino aut fibrosam, aut vasculosam; ea de causa non fractam duntaxat, quantumvis debilem, quod ab integumentis & circumcreta, indurataque cellulositate æqua-

liter premeretur. Præter Lympham, qua turgebat, continuit quatuor exiguas hydatidas, liberrimas, pedunculi vestigio omnino carentes.

§. IV. Glandulam Thyroidæam tumentem nonnulli *Austriacorum* habent, plus *Styri*, his magis *Carinthi*, omnium autem minime *Tyrolenses*, amplissimæ, salubrisque Provinciæ incolæ; quibus tamen ab Autoribus familiarissima dici solet: hos, inquam, omnium minime eidem obnoxios esse, his beatam hanc provinciam peragratus, attentus in rem, expertus sum.

In cadavere horrendam mole Thyroidæam glandulam nactus, publice dissecai. Mecum Auditores mirabantur nullum fere genus tumorum dari, quin in hac sola Thyroidæa inveniretur. Hinc enim Steatoma, ibi Atheroma, alio in loco Purulentus tumor, in alio erat coagulatus sanguis, fluidus fere in alio, imo hinc glutine loculus plenus erat, alibi calce cum sebo mista, &c. Hæc autem omnia in una, eademque Thyroidæa glandula.

§. V. Anno 1757. in *Tomo II. Rat. Med. cap. II.* varia exempla attuli similium tumorum, maxime in cadavere pueri decennis *pag. ibid. 145. & seqq.* addidique *pag. ibid. & seqq.* quosdam similium tumorum plane incurabiles esse; alios curari quidem, sed redire; nonnullos vero perfecte curari, non redituros. Curabiliore profecto hydaticos tumores pronuntiabimus, cum fracta aut consumpta pellicula, resorberi lymphæ possit, & membrana hydatica fundi, indurataque cellulositas inflammando, suppurandoque consumi. Sed & omnis sorbilis materia, ut puta sanguis, ichor, pus, sanies, aqua, serum, cum sorberi a massa humorum possit, collabentes suos tumores exhibere sæpe debet. Unde hi vel sponte, vel post data remedia non raro evanescunt, iterum, vel minime, redituri.

Uxori optimi *Morgagni*, *Epist. 50.* tumor nuci avellanæ par, forma, duritie, magnitudine, subito de nocte evanescit; redit; repente iterum disparet, non rediturus.

Et



Et ejusd. *Epist. n. 27.* „ Ipsam vero glandulam,  
 „ Febri nulla prævia, sensim intumescere, & duram  
 „ fieri, non secus, ac alias in collo subjectas, cum in  
 „ strumas grandescunt, nimis omnibus notum est, quibus  
 „ magnum plerumque negotium faceffunt, Medicis &  
 „ Chirurgis. Nonnunquam tamen longe facilius, quam  
 „ sperari posset, resolvuntur. Sic in septenni Puella  
 „ *Veneta* Parotidem, memini duram factam, ac valde  
 „ tumentem, nec sine dolore jam tangendam, omni, quæ  
 „ substiterat, paulatim quidem, sed penitus, discussa  
 „ materie, ad naturæ modum rediisse, uno, ut vidi,  
 „ inunctionis ex *Oleo Philosophorum* auxilio.

Pergit ille porro: „ De Strumis autem *Valisnerium*  
 „ nostrum audiui haud semel testantem, cum rustica mu-  
 „ lier filiolum ad ipsum adduxisset strumofam, ipse autem  
 „ ut pauperculæ, & puellulæ, nihil nisi vinum tenue  
 „ sumendum imperasset, in quo insecta, quæ Asellos  
 „ vocant, essent macerata, mulierque ex iisdem vel plu-  
 „ ra, quam ipse dixerat, in vinum semper iniecisset,  
 „ plurimasque urinas sic movisset, exacto mense cum fi-  
 „ lia rediisse, non sine sui admiratione persanata.

Idem *Morgagni Epist. 50. a n. 31. ad 36.* plura exem-  
 pla habet durorum tumorum, a sola materie liquida eos-  
 dem extendente. Omnium vero notabilissimum *Epist. 29.*  
*n. 12.*

Similem & nos, hoc ipso ineunte anno, in Noso-  
 comio habuimus. Mulier quadragenaria, biennio antea  
 enixa, suum primo infantem, deinde cum eodem &  
 alium lactat. Visa aliquantisper id ferre inculpate, de-  
 mum medio Martio 1761. dolore lateris affici cepit,  
 idque in æstatem usque. Ablactato tunc infante utro-  
 que, venaque tunsa, sensim quidem lateris dolorem abi-  
 visse aiebat, ambas vero mammas in tumores duos, 2  
 se mutuo separatos, mammamque vehementer extenden-  
 tes, ac valide demum dolentes, permutatas esse.

Consilium empiricum adplicandi ad dorsum Nucistæ folia, ea spe, fore ut inde mammæ emollescerent, scrupulose sequitur; ita ut trium septimanarum spatio, quinque die, integrum horum foliorum manipulum dorso admoveat. Cessanti demum ab hac adplicatione, tumor in dorso observatur Avellanæ magnitudine, quo mole sensim aucto, dolentes, tumidæque mammæ pedetentim minuebantur; dorsique tumore, binos viriles pugnos exsuperante, ita concidisse mammæ, ut quæ torosas easdem, formosæque habere solebat, vix nunc earum exhibere nobis reliquias posset.

Pauperrima cum esset, & publicæ instructioni apta censeretur, a Viro Exp. & Practico felicissimo *J. Schreibers* ad Nosocomium nostrum missa est, 9. Jan. hujus, quem vivimus, anni. Accesserat prioribus ærumnis, quod a 14. diebus singultu, tussi, ac meri cruoris sputo frequenter laboraret. Igitur capitis instar tumorem video, eumque a metastatica mammarum materie natum ratus, fluctuantemque in eo deprehendens materiem, pertundi curavi. Copioso pure cum sanguine effluente, vix immixta apparebat tumoris moles. Plurima cellulositas semilacera indies magnis solvebatur laciniis, concidebatque sic demum tumor, ut sesquimensis spatio curaretur.

Quæstio est utrum sponte Naturæ facta sit materiæ ad dorsum transmigratio, an vi foliorum Nucistæ? Vis aromatica, ac proinde stimulans, his foliis inest: vim solventem, dissipantem, roborantem, legimus iisdem adscriptam esse. Et egregius *Fr. Hoffman* laudat oleum Nucistæ ut paregoricum; & *Essentiam Nucistæ*, cum ea *Croci*, & *Aqua Anhaltina*, pro linimento loci spasmo affecti.

Experimentis iteratis quæstio hæc determinanda est. Interim quod supra relatum, & a *Morgagni* observatum, denuo hic confirmatur: materiem liquidam duras reddentem tumidasque partes, posse vel integre, vel pro parte; ad tempus, vel perpetuo, deferere has partes, & vel no-



vas sibi vias, tumoresve formare, vel consuetis corporis viis eliminari.

§. VI. Anno 1744. ineunte, Vir procerus, eufarcos, tenebricosa nocte cadit de Promontorio *Delphensi* in flumen præceps, undaque ægre ereptus, & per summa frigora iter plurium dierum, publicus Reipublicæ Nuntius, prosequutus, tumorem percepit in inguine lævo: quem, quod molestus non esset, celavit integro anni spatio. Anno 1745. inchoante, tumor pollices fere quatuor in majore diametro, duos in minore, habens, levem sinistri cruris cum stuporem creare, tum dolorem, cepit. Cumque jam prava, ut mox patebit, symptomata se jungerent, me cum binis Chirurgis in consilium vocavit. Tumor ipse inveniebatur durus, inæqualis, indolens, sub expansione Aponeurotica obliqui externi musculi veluti ex Abdomine natus, ac partim sursum, partimque deorsum sese extendens. Attactu tumoris vix doluit homo, sed vagas imo in ventre anxietates, (sic enim agebat) passus sæpius est, easque nocte adeo molestas, ut lectum relinquere pluries cogeretur: Alvus vix, nisi vi, mota unquam, urina parca, nausea frequens, vomitus sed parcus idem, rarusque; una cum cruris sinistri cedemate. Ambigua primum Herniæ femoralis signa, ambigua deinde signa tumoris scirrhusæ prope duritiei; tumoris, qui longa radice intra pelvim productus, Intestinum Rectum, & Vesicam urinariam premere videbatur, animos nostros in varia auxilia frustra convertisse facile quisque per se videt. Levia denique animi deliquia accessere, quæ ægrum 25. die, ex quo affueram ipsi, sustulerunt.

In Cadavere invenimus tumorem illum intus cavum, plenum ichore, mucos, & puriformi quadam materia, ex inguine continuatum per sinistram pelvis partem, rectumque inter ac vesicam interponentem se; &, ut in inguine, ita quoque in pelvi, tumoribus cavis mucos, ichore, pure, repletis, constantem. Hydatides præ-

terea duas in sinistro, eodemque admodum magno, Re-  
ne, alteram diametri semipollicis, alteram pollicis inte-  
gri; ambas autem non ad Renem, sed intra ipsius ma-  
gni Renis corticalem substantiam reconditas. Cætera o-  
mnia in corpore bona.

Igitur terror, violentia præcipitis casus, frigusque  
tunc, & in itinere deinceps perceptum, Hydatidas in  
Peritonæo generarunt, quæ sensim durioribus, callosisque  
involucris instructæ, nervos, & inguinalia vasa, intesti-  
num rectum, vesicam, suis in functionibus turbarunt;  
quæque, lege consueta, anxietates, nauseas, vomitus,  
vigilias, leipothymias, ipsamque mortem, demum ge-  
nuerunt.

Multis igitur observationibus sic collectis, atque enar-  
ratis, operæ pretium fore videtur in naturam tumorum  
Cysticorum, præprimis autem Hydatidum, pathologice  
inquirere,

§. VII. De Hydatidum, non quo sensu *Hippocrates*,  
veterumque plures, sed quo nos eas intelligimus, origi-  
ne, fabrica, progressu, fuit dudum ab Anatomicis, Me-  
dicisque disceptatum; certi tamen quid nunquam adhuc  
prolatum. Scripsere de Hydatide in *Sepulcræti* Tom. II.  
*Spigelius*, *Th. Bartholinus*, *Diemerbroeck*, *Etmuller*: in  
*Actis Acad. Reg. Se. Paris*. Viri egregii *Maloet*, & *Mo-  
rand*; in *Actis Edimb.* egregius *Monroo*; *Comment. Li-  
teraria Norimbergensia*; & sparsim plures, ut *Warthon*,  
peculiari tractatu *Bidloo*, *Hofmannus* quoque, & egre-  
gius *Boerhaave* in *Epist. de Glandulis* ad *Ruischium*, ut  
etiam dissertatione peculiari doctissimus *Grashuis*: præ-  
terquam quod nonnulli Græcorum Medicinæ parentum  
earundem meminerint.

Collectis horum omnium sententiis, fuere I., qui a  
degenerascentibus ipsis glandulis Hydatidum deduxerint  
originem. Non sufficienter hæc sententia experimentis  
fulcitur. Dum in glandulosa fabrica humor contentus  
est, degenerem fabricam glandulæ detegimus, & in ca-  
da-



davere maxime: in plerisque autem Hydatidibus, quarum data historia a nobis fuit, nihil similis fabricæ detectum est, imo prorsus contrarium. Id porro huic sententiæ concedemus, quod glandulæ sæpius inventæ fuerunt a materia aquosa, ichorosa, sanguinea, purulenta, saniosa distentæ, atque induratæ; haud vero id, quod omnis tumor, quem aqua, aliussve enarratorum humorum implet, distenditque, glandula sit.

II. Sententia illorum est, qui nasci hydatidas in vasis Lymphaticis credant, sic generari, ut tale vas inter singulas qualque, quibus scatet, valvulas, in globum extendatur; dum nempe ab obstaculo quocumque Lympha opposito motu remeat, sicque ipsa sibi viam claudit. Censeo hoc modo non nisi unicam posse Hydatidem nasci, & non ingentes illos, sive Hydatidum racemos, quales uterus non raro format, emittitque, sive innumeras illas solitarias Hydatidas. Etenim reflua contrario sensu Lympha, dum unam erigit valvulam, simul sibi viam ad reliquas valvulas præcludit.

III. Sententia Vermes ad Hydatidas fabricandas necessarios credit. Verminosa Pathologia, luxuriantis ingenii factus, Hypothesibus innumeris nixa, probata nunquam, nisi paucis experimentis, quæ, ut recte monet *Morgagni*, ad casus peculiare, haud vero ad universam Pathologiam spectent; hæc, inquam, toties resuscitata, & sponte corruens, etiam hic ejusmodi sortem nata est, ut fere nemo posthac fuerit, qui Hypothesin hanc, de origine Hydatidum ab uno, alterove aut fictam, aut resuscitatam, tueri ausus fuerit.

IV. Sententia fert valvulas Lymphaticorum vasorum, dum Lympha contrario nisu per illa fluere cogitur, impleri ab eadem, & turgere: Lympham hanc stagnantem lentiores, tenacioresque partes, a suo centro ad circumferentiam pellere; nasci sic membranam externam illam: præterea vero ab intestino motu ejusdem Lymphæ, in hoc semel formato cavo, produci a loco quo-

piam,

piam, ceu centro, quemdam motum, qui motus, dum ab illo, ceu centro, ducit crassiora, simul ad aliquam ab illo centro distantiam format novam, rotundamque pellem; adeoque sic rationem se dare credunt Hydatidum minorum, in majore libere fluctuantium.

Ingeniose sane hi: utinam tam vere! Ac primo quidem tria, quatuorve, simul supponunt, absque ullo argumento, quo vel unum suppositum firment. Deinde Hydatidas credunt inter quasque Lymphaticorum vasorum valvulas, eo, quo explicuere modo, formari. Ergo haberent semper degenerascentem membranam, in eaque fibras, vasaque, pro extremo involucro. Cur ergo toties, & libere fluctuantes Hydatidas, & Hydatidas majores, in quibus cæteræ innatent, invenimus haud alio involucro donatas, quam illi simili, quod a coagulante se ovi albumine, album, scissile, minime vascolosum, fibrosumve, formatur? Si hoc pro se assumserint, asseruerintque id inde probari, quod supra de generatione mirae involucrorum Hydatidum dixerant; unicum modo, quod regeram, habeo: Demus paulisper illis hanc involucrinativitatem; vel ipsum vas lymphaticum, in quo hydatidis eo modo formatur, constanti lege involucrum hydaticum circumdabit; vel hydatidis formata findet suum vas lymphaticum, & cadet: Si hoc ultimum statuunt, rogo 1. cur nunquam ibidem, ubi hydatides in viscere excavato invenimus, simul invenimus, vasorum Lymphaticorum, præternaturaliter & extensorum; & diffractorum, exuvias? reliquias? vestigia aliqua? Rogo 2. si hydatidis frangendo vas suum lymphaticum se liberat, quomodo demum millenos hydatidum explicabunt racemos? Et tandem quod ad 2. sententiam dixi, id hic convenit: si a retrogrado Lymphæ motu, pressaque valvula, hydatidis fit, non fiet unquam in toto illo vase nisi unica: via ad cæteras valvulas præclusa, erecta una.

V. Sententia, ob ineluctabiles priorum Sententiarum difficultates, in cellulis membranæ adiposæ, aut cel-



lulosa hydatidum ponit originem. Et graves quidem in arte Viri hanc sententiam amplectuntur. Tum quod cellulositas major minorve ubique reperiatur, ubi inventæ hydatides. Tum quod videantur in cellulosa substantia nonnunquam cellulæ; quarum aliæ pus, aliæ aquam, aliæ sebum, gelatum, &c. gerunt, sicque hydatidum intellectum facilitare videntur. Tum denique, quod cellulæ adiposæ videantur habere in sese minores cellulas, ac veluti sepimenta, ad explicandas hydatidas, in hydatide inventas, apta nata.

Verum & maximis hæc sententia est implicita difficultatibus. Sumamus generata in hac membrana Hordeola dicta, sumamus Atheromata, Steatomata, Melicerides, &c. an unquam quis vidit involucra horum, quemadmodum ea, quæ descripsi, Hydatidum, cocto albumini ovi similia colore, consistentia, crassitie, dilacerabilitate facili & abrupta?

Quamvis igitur a sex mille ferme annis occasiones videndi Hydatidas mortales habuerint; & quidem primo in pecore, quod ab origine mundi DEO offerendum, primo, num quid morbosum non haberet, lustrandum esset; deinde tum in pecore ad usus philosophicos adhibito; tum in hominibus, qui vel ad durabilem condituram post mortem præparabantur, vel ad usus anatomicos, pathologicosque lustrabantur: quamvis, inquam, gens humana per numerosa adeo sæcula Hydatidas frequentissimas viderit, nihil tamen certi, quam certas observationes, habet; meliusque, quid non sint, quam quid sint, docere potest. Ita ut in Theoretica contemplatione Hydatidum nos doctiores non reperiamus, quam ante mille pluresque præterea centenos annos se fatebatur *Aretæus Cappadox Lib. 2. de caus. diut. morb. Cap. 1.* ubi historia Hydatidum in abdomine repertarum relata: „ Unde, inquit, id genus vesiculæ eruperint, via haud facile reperitur - - & qualis sit ipsarum generationis modus, quid dicam, nihil certi habeo.

§. VIII. Nihilominus ea, quæ certa observando novimus, hæc Pathologicos in usus nos multa docent.

Ac primo quidem Hydatidas plerumque ab ejusmodi continente materia formari, quæ ni undique partibus sive solidis, sive fluidis, fulciretur æqualiter, dissiliret, contentumque effunderet humorem:

2. Generari sic in corpore humano corpora organica morbosa, quæ sive fibrosæ, sive vasculosæ naturæ, ne vel minimam quidem umbram habent. Bis modo *Morgagni* vasa videre sibi visus est; raro & in paucis, vasa detexi ego: in centenis millenisque nulla vidi. Vicina cellulositas degenerascens, atque adhærens, imponere potest, ut falso habeatur pro vero Hydatidis involucre.

3. Non semper pellucidam in hydatide inveniri materiem, sed quoque haud raro glutinosam, vix fluidam, vix ductilem, deinde ichorosam, saniosam, purulentam, imo terrestrem, ut continentem suam tunicam incrustet, induret; colore denique albam, aut flavam, aut fuscam, aut plane viridem, aut etiam nigram.

4. Hydatidas vel racematim inter sese, divisim tamen, cohærere, pedunculo pendulas, haud raro oblongas, atque pyriformes; vel solitarias, liberaeque hærentes, sive in majori Hydatide in viscere aliquo, sive in cavo abdominis; vel denique complures Hydatidas mutuis concrecere lateribus, ut favo apum, quam Hydatibus, similiores sint.

5. Inertem bullam aquosam, levi digiti attactu destruendam, ejus esse potentia, ut, crescendo, a sese removeat compactam viscerum massam, & quidem duram adeo, ut illa Hepatis est. An pro dilatatrice causa necessariam fingemus animam, quemadmodum eam necessariam esse, ut uterus, ovulo in eodem hærente, distendatur, *Stahlianorum* quibusdam placuit? Utique nostro in casu petulans hæc anima condemnanda valde, & castiganda foret. Sufficiat nobis observata physica alia haberi, quæ a *Mariotte*, *Boerhaave*, *S<sup>r</sup> Gravezande*, *Mus-*

*schen-*



*Schenbroek*, exulta, a nonnullis vero male intellecta, pejusque adplicata, egregiam suppeditent hujus phænomeni explicationem.

6. Nullam omnino nostro in corpore partem, plagamve, dari, quæ ab hoc morbo immunis præstari queat. In Utero, in Ovario, in Tuba, in Intestinis, in Hepate, in Renibus, in Peritonæo, in Omento, in Pulmonibus, in Plexu Choroideo, in Mammis, in Genu, in Glandula thyroidæa, in Glandulis colli, vidi ipse: in longe numerosioribus partibus, imo in ipsa cordis substantia, optimus vidit *Morgagni*.

7. Non modo in partibus, cæterum naturaliter constitutis, verum etiam ita degenerascentibus, ut monstra potius, quam partem corporis referant, Hydatidas inveniri, ut abunde docuit hujus capituli §. I.

8. Sponte sæpe easdem rumpi, ruptasque demum in viscerum superficie cicatricem adeo naturalem relinquere, ut quisque facile juraret vulnere olim ibidem inflicto natam hanc cicatricem esse: quemadmodum in cadaveribus rem invenit *Morgagni*. Unde serio animadvertit in Medicos & Chirurgos, qui inventa cicatricula, publice testati sint, cor gravi vulnere quondam laborasse, aut Uterum, aut Jecur, &c. Hinc prudentiæ esse, si quis simile quidpiam in contenta parte deprehendat, ut simul cicatricis vestigia quærat in parte continente, antequam contentam illam partem vulnere quondam affectam fuisse asseveret.

9. Cum similitudo tanta sit inter Hydatidas, Atheromata, Steatomata, Scirrhos, & Cancros, tum quod durities sæpe æqualis sit; tum quod degenerascens cellulositas inæqualitate & duritie tumores duros & inæquales, & asperos referat, qui tamen minime scirrhosi sint; tum denique quod tumor quicumque, premendo nervos, dolores excitet: hinc ab una parte prudenter & caute procedendum esse in definienda, determinandaque natura tumoris; ab altera parte nihil certius esse, quam quod  
vel



vel errantem nostram, vel dubiam sententiam, dies corrigat vivo adhuc homine, qui tumorem habet, aut denato saltem.

10. Hydropas, cum multis hydatidibus junctos, si ex casuum, morte alias detectorum, similitudine, suspicamur adesse, nec remediis internis, nec paracentesi, curabiles esse; excepto forte uno alterove, qui narratur, casu: hinc cum vitalis indicatio præprimis hic urgeat, cavendum esse a remediis drasticis, ne vires concidant; & evacuantibus paucis, maximeque Regimine roborante, vitam, quoad ejus fieri possit, protrahendam esse. Hinc forte haud penitus ineptam hanc Regulam esse: „Is Hydrops omnium maxime curabilis est, qui omnibus suis signis manifestus ab *Hippocrate Libro 2. Prorrhetic. Edit. Foes. pag. 89.* describitur: signis, inquam, perfectæ atque illibatæ sanitatis, excepto solo Hydrope. Novi equidem durum, quinimo ridiculum nonnullis videri *Hippocratem*, sibi tot illæsas functiones reservantem, ad bonam formandam in Hydrope prognosin, ut rari profecto dentur, de quibus bene augurari liceret, Hydropici: neque me latet vel ideo pluribus *Hyppocratem* vituperari, quod ipsi horum complures vel tuto, jucunde, brevique, vel etiam nonnullos laboriose, ab hoc morbo restituerint, quibus vix media affuisset pars earum, quas requisiverat *Cous*, conditionum: novi, inquam, hæc omnia; nihilominus velint, nolintque illi, tandem mecum fateantur necesse est, nunquam fere turpius auguria nostra ab eventu derideri, quam in Hydrope: adeoque nihil eo esse certius, quam Hydropicos eo esse curabiliores, quo pluribus functionibus gaudeant illibatis; & vice versa, eodem eo plus subire discriminis, quo illarum plures læsas habeant. Atque hoc totum, hoc unicum, quod magnus sibi voluerit *Hippocrates*. Quapropter si Hydrops hominem multum lædat; si neque remediis, neque auxilio paracenteseos obaudiat; si redeat, curatus quantumvis visus; si post punctiorem æger ventrem tumidulum servet,



vet, idque maxime inæqualiter; si vires haud constanter emendentur; &c. justus Medicorum metus est, ne palliativa tota fuerit, quæ facta sit, cura; ne viscera, sive valdopere, sive irreparabiliter, obstructa, indurata, scirrhusave sint; ne faccati tumores, ne præprimis legio adsit Hydatidum. Cumque in his omnibus aut magnum in curando laborem in nonnullis, aut curam absolutam in pluribus nullam Medici experiantur, jure utique merito *Hippocrates*, quo fausta caneret, tot requisivit conditiones.

Proderit profecto hæc nobis observatio, ut haud illos imitemur, qui continuo in Hydrope pertinacior nihil non tentantes, debiles aliunde ægrorum vires ultra proiiciant, atque eosdem, ut ita dicam, ante fata necent; sed meliora ab *Hippocrate*, Virisque *Hippocraticis* edocti, eam in dandis, applicandisque auxiliis prudentiam adhibeamus, qua viribus, præprimisque Vitalibus, religiosissime parcamus.

## CAPUT IV.

De Intestino in Inguine perforato, & excrementis inde foras expulsis.

§. I. *Vulnera, aut Sphaceli Intestinorum tam simplicia, quam cum jactura substantiæ, sæpe letalia, non raro curabilia, sive cum labefactata deinceps sanitate, sive cum eadem præterpropter integra. Casus enarratur fœminæ, quæ inflammatione, dein Sphacelo Inguinis laborans, omnia Ileï morbi symptomata patitur; apertoque deinde Inguine fœces, ac semicacta alimenta, inde emisit. Circa trihorium a comestione elapsum, solidiora alimenta colore, ac consistentia sua ad ulcus manifestant se. Ipsum intestinum Ile-*  
*Pars VII.*

um apertum esse verosimile est. Demonstratur Ileum ad magnam a Colo distantiam stercora gerere, ita quidem, ut Libram Mercurii vivi, pridie poti, stercorum sustineat obstaculo. Vis valvulae Tulpianæ aboletur nonnunquam sic, ut stercora, & clysmata ore expellantur, & ut nihilominus in vivis maneat homo, integreque convalescat. *Diagnosis morbi.* Prognosis sequitur; sed ad eandem formandam Hippocrates consulitur. Ad Hippocratis sententiam examinandam, in opem vocatur experientia Medicorum. §. II. Unde primum referuntur ex Vatro tres casus, quorum unum Coli, duos Ilei esse, suspicio est, integra tribus redeunte sanitate. §. III. Deinde casus Fafschii apud Juch in Colo obtinens, cum curatione imperfecta. §. IV. Malavallus binos refert casus, alterum affecti intestini tenuis, alterum crassi, cum perfecta cura: meminitque audacis Agyræ, ad faciliorem herniæ introductionem intestina incidentis. §. V. Seidelius a Schenckio laudatur, ut morbi similis, Ileum forte occupantis, curam integram referens. §. VI. Ramdohr apud Heisterum hominem integre curat, latam portionem Gangrenosi Intestini abscindendo, & abscissas utrimque oras ad se mutuo adducendo, uniendoque. §. VII. Albini miles 20. annis a vulnerato Colo elapsis, apertum id in Epigastrio sinistro exhibet. §. VIII. Idemque monstrat miles Bouchardi, tertio anno a suscepto vulnere. §. IX. Kalschmidii homo a gangrena Ilei curatur cum ano adscititia. §. X. Notabilis per omnia casus Pfassii, cum integra cura, quamvis Ileum variis vicibus pessime affectum visum. §. XI. Maichanquez singulari arte curat Ilei vulnus. §. XII. Mangetus integram curam describit Intestini selopeti majoris globa perfossi. §. XIII. Idem N. C. referunt a globis tribus. §. XIV. Mangetus narrat ex Ileo hernioso, pro Bubonocèle aperto, alterum periisse, alterum integre curatum fuisse. §. XV. Wagnerus quadruplicem curam refert, Ileo intestino in 2. vel 3. vulnerato viso. §. XVI. Sporing similiter. §. XVII. In Acad. Reg. Sc. Par. integra cura fit, partim excisso, partim a natura separato Intestino tenui, ad octo latos digitos. §. XVIII. Mira historia separate magnæ Coli portionis, valetudine integra succeden-



*te, Auctore Magnifico Kestler, §. XIX. Ex neglecta Hernia inguinali perforatio, & transsudatio fecalis, vita salva, sed imperfecta, §. XX. Modus exponitur, quo ejusmodi apertura solent in inguine nasci. §. XXI. Dilata hucusque prognosis aegre nostrae tandem fit, & Hippocrates vindicatur. §. XXII. Indicatio, & cura. §. XXIII. Mira circa tussim. §. XXIV. Multi aegri in Nosocomio pinguescunt.*

§. I. **V**ulnera Intestinorum simplicia persæpe letalia esse, certissimis constat omnium sæculorum testimoniis: at vero eadem hæc, simplicia non modo, verum etiam cum notabiliore eorundem portionis jactura, sive integre curabilia esse, sive cum labefactata plus minus sanitate, experimentis comperimus.

Latus differendi se hic nobis aperit, spatiosusque campus. Porro ut commode atque utiliter spatiemur, Duce utamur notabili casu, quem nostrum nobis Nosocomium suppeditavit.

Fœmina 37. annorum, rarioribus, hisque levioribus, hysterice passionibus exceptis, illibata valetudine perpetuo usa, beato partu ter felix, & a quinquennio, ex quo non peperit, rite menstruans, secundo die Februarii, ultimo elapsi, enarrando nunc morbo corripitur.

Scilicet sana surrexit, elapsa autem una alterave hora subito Hypogastrii dolore corripitur; cujus causam errore quopiam se posuisse negat: neque enim fuillas carnes pridie moderate captas, una cum sale conditis Rapis, edulii genus utique haud insuetum sibi, tanti causam doloris credere se posse. Dolori se calor junxit, clausaque integro quatruiduo alvus. Quarto morbi die vomitus, isque assumptorum, accessit. Vocatus tunc demum Medicus venam illico jubet in pede tundi, potumque purgantem, tribus vicibus exhaustiendum præscripsit: at vero hunc revomuit actutum; moxque dein stercorea vomuit. Interim cum tempus menstruum ad-

O 2

esset,

esset, menses suos solitis suis sex diebus hoc tempore passa est.

Vomitum stercoreis detestabilem, tum ore percepit continuo ægra, tum horruit in excipulo sæpius evacuando maritus. Porro nunc primum advertit parvum inguinis dextri tumorem.

Febr. 8. alvus pauca, exhibito pulvere, successit; & bis iterum secta vena auctus in inguine tumor est, quem herniam esse Medicus censet. Vocati autem duo Balneatores herniam esse negant, sed alius, incerti scilicet generis, tumorem declarantes, emolliens cataplasma sæpe renovandum suadent.

Cum a secundo cataplasmate, nimium calente, inguen veluti ureretur, credit in pejus actum cum tumore esse. Saltem pergentibus cunctis symptomatibus, ipsoque vomitu stercoreo, tumor inguinis 14. Febr. nocte ruptus est, fuditque primo oleum lini, quod enemate injectum ad unc. iv. fuerat, deinde materiem foetore stercoream. Atque ab hoc tempore vomitus penitus cessavit. Conati sunt injectis enematibus materiem tam stercoream, quam semicoctam, alimentosamque ad alvum determinare, sed incasso sæpe labore. Tandem 25. Febr. alvus sponte prodiit, quemadmodum & 26. & 28. Febr.

Hucusque res, me incio, perrexerat, quando egregius Medicus *Schreibers* miserrimam hanc primum invisens, ejusdemque misertus, tum & de publica Studioforum utilitate sollicitus, me convenerit; num intra Nosocomium suscipere illam vellem, propones? Extemplo afferendam jussi; ita ut 28. Febr. ante vespertas allatam jam examinarem, deprehenderemque viribus ac pulsu debilem, cætera bene valentem, & appetitu gaudentem. Aderantque ad vulneris labia cibi semicocti. Digiti porro a vulnere spatio, vulvam versus, aliud vulnus detego, quod ipsa mulier ignorabat adesse. Explorando detego hoc vulnus sub musculis communicare

cum



cum vulnere primario, haud vero in cavum se penetrare abdominis: vulnus autem primarium, externe pollicis latitudine, oblongum, sensim brevius, angustiusque in cavum Intestini penetrare; stylumque ab ejusdem externo latere, longitudine digiti, & ultra, ad extremam ossis Ilei cristam pergere, ita ut inter expansionem tendineam, & peritonæum fistula ibidem formata esset.

Vidimus 1. Martii trihorio postquam jus cum farinaceis coctum comedisset, totam vulneris aperturam oppletam his farinaceis; ita tamen, ut pars hæc esset assumptorum exigua, & alvus prodiret naturalis, bene compacta, fæcalis, colore utcumque grisea.

2. Martii dura copiosaque alvus. Quæ brevi post undecimam comesta Brassica fuerat, in vulnere primum apparuit ad horam pomeridianam secundam. Ita & Radices Dauci 3. Martii. Defuit hac die alvus. Ad 4. Martii immissum enema, incredibilem produxit copiam fæcum, colore griseam, partim pultis instar, partim ingentes compactam in massas. Martii 5. & 7. alvus nulla. Ad 6. & 8. clyisma immissum eduxit copiosam.

Brassicam, & Daucum, & Farinacea juri incocta, vidimus intra trihorium ad vulnus apparere, nunquam autem maturius, quantumvis sæpius vulnus intra id tempus detegeremus. Dubitamus tamen aliquando an non, nonnihil prius? Dubio eximendus, dedi ipsi ruberrime tingentem misturam; verum nihil inde ad vulnus. An quod saliva, succis gastrico & enterico, jure carniū, epota aqua, diluta nimis? Hinc alio die post Brassicam dedi elixa Cerasa. Verum & hoc die exacto fere trihorio, non prius, primum Brassica, & elapso præterpropter ab assumptione quadrihorio, una cum Brassica exuviæ Cerasorum. Sex ab assumptione elapsis horis denuo pelles Cerasorum.

Quærebatur nunc, quodnam Intestinum vulneratum esset? Tenuene, an Crassum? Ab una parte

Colum perforatum esse excrementa suadebant, quæ a principio de vulnere copiosa, parciora dein, prodierant: suadebat præterea olei lini in anum injecti, per inguen elapsus.

Verum ab altera parte breve illud trihorii tempus, quo assumpta in vulnere comparebant, Ileum penetratum esse videbatur innuere. Obiici potest, continua ad vulnus irritatione, eademque forsitan per Intestinarum tractum continuata, res deglutitas veluti sollicitari, quo maturius descenderent. Respondeo me negare minime ab irritamento hoc deglutita citius forte ad hunc locum apparere, adeoque me nihil inde ad physiologiam in sano corpore concludere: sed simul adverto præter celeritatem, etiam deglutitorum immutatam naturam Ilei vulnus potius indicare, idque a Bauhiniana Valvula remotius: præsertim quod ea, quæ alvo reddebantur, bene cocta essent. Etenim demonstravi *Tomo II. pag. 91. & 92.* nonnunquam Intestinum Ileum, ad 2. ad 3. imo fere ad 4. pedum a valvula Coli distantiam, fæcalem colligere materiem. Igitur non repugnat vomitui stercoreo probabilis alias Ilei perforatio: potuit enim is ex materia in Ileo contenta exortus fuisse. Similisque omnino nostra doctissimi *Kalschmidii* ægroto esse videtur, qui in 15. diem Ilei morbi symptomata passus, demum periit, atque a morte exhibuit Intestinum Ileum, ulnæ a Colo distantia, stercore repletum, sic quidem, ut integram Mercurii vivi libram, pridie hautam, exacte sustineret.

Si quis opponat verosimile non videri, ut nostræ foeminæ in casu, quæ fæcalis materies in Ileo adfuisse supponitur, copiosum vomitum stercoreum per integros novem dies continuasset; tum quod stercoris in Ileo presentia rarior sit, tum quod inveniatur, si adsit, parcius: respondeo primo ad casum præsentem exponendum sufficere, ut ejusmodi materies nonnunquam in Ileo adsit; secundo ignorare nos quamnam fæcum copiam Ileo



um quandoque possit continere. Inveni aliquoties scybala pauca, alia vice stercus liquidum copiosius; *Kalschmidius* vero ad ulnæ a colo distantiam usque repletum Ileum; quæ profecto quantitas vomitum fæcalem pluribus continuare diebus posset.

Sed contra; si cum quantitate, & diuturnitate vomitus stercoracei, jungamus olei Lini, enemate injecti, per Vulnus exitum, videmur vix posse, nisi in Colo, vulnus locare.

Imo videmur posse. Demonstravi enim Tom. II. III. IV. in morbis Iliacis Coli valvulam enormi Intestini dilatatione sic aboleri, ut vix reliquias sui superstites exhibeat; quemadmodum in conservatis Tympanitici intestinis sæpe soleo Medicinæ Studiosis demonstrare. Hinc si habeamus exempla deletæ ita valvulæ, ut e Colo patula in Ileum via sit; si deinde habeamus exempla restitutæ sanitatis etiam post certissimum argumentum deletæ vis valvulæ, quemadmodum Historia pueri Tomo III. pag. 95. suppeditat, nulla est in casu præsentis explicando difficultas, si statuamus inchoante morbo viam hanc præternaturaliter patulam fuisse, per eandemque oleum Lini vulnere effluxisse.

DIAGNOSIS proinde patet. Inflammatio valida Intestini Ilei, Peritonæi, Aponeuroseos Musculorum obliqui interni, obliqui externi, forsitan etiam Transversalis, pessimum Ileum genuit; Inflammatione autem in sphacelum versa, portio intestini Ilei, Peritonæi, Aponeuroseos, Integumentorum, corrupta excidit, reliquitque hoc foramen.

Dubia PROGNOSIS, imo valde prava; tum propter gravissimum in Medicina auctoritatem, tum propter evidentissimam experientiam.

Ac primum quidem magni *Hippocratis* auctoritas prognosin admodum pravam dare jubet. Sed mitigant hanc Auctores quamplurimi, eosque inter haud pauci, qui *Hippocratem* hic, si ullibi, insimulent falsi. Neque

defendam *Hippocratem* ego, neque condemnabo. Historia medica candide tradita num forsitan quod in Illo obscurum, quod dubium, quod contrarium apparet, illustratura sit, legitimumque conversura in sensum, sequentia docebunt.

*Hippocratis* igitur *Aphorismus* 18. & 21. *Sect.* 6. sic habent: „ Cui perfecta est Vesica, aut Cerebrum, aut „ Cor, aut Septum transversum, aut aliquod ex Intestinis tenuibus, aut Ventriculus, aut Hepar, letale. „ Si ex Intestinis tenuibus aliquod dissectum fuerit, „ non coalescit.

*Lindenianam* interpretationem sequutus, monendum habeo *Perfectionem*, Διακοπήν, hic *Hippocrati* significare, interprete in hunc locum *Galeno*, Intestini tenuis magnum vulnus, id ad extrema usque dividens, abscindens, integram ejusdem continuitatis solutionem faciens, εἰς τὸ πέρας, ad extremum usque: & quemadmodum *Philothæus* auctor, ut *Lindanus* censet, secundi sæculi, in Comm. ad hunc locum, διὰ βάθος τομήν, sectionem ad profunda, aut per fundum penetrantem. 2<sup>o</sup> Θανατῶδες, & θανάσιμον, haud innuere semper absolutam morbi, vulnerisque letalitem, sed etiam non raro eorum aut pravitatem, aut majus minusve periculum. Confer *Aph.* 4. N. 16. cum 5. N. 1. & 4, & 2. N. 1. cum 4. N. 67. Cui lubet multos *Aphorismos* conferre cum variis *Coacorum*, *Prorrheticorum*, *Epidemicorum*, aliorumque *Hippocratis* operum textibus, is de eo, quod hic assero, brevi convincetur.

Ne longus sim, ob idque tædiosus referendis iis, quæ multi Interpretes, alios alii transcribentes in hos textus commentati sunt, facta producam duntaxat, quæ Prognosin longe firmiorem formabunt, quam omnia illa Opinionum commenta; quæque forsân veritatem *Hippocratis* stantem a parte demonstrabunt. Nec referam, quippe ad rem nihil facientes, quæ multiplices enar-



rantur, Cultrivororum, Insectivororumque historias; cum suspecta sit fides multarum: uti neque casus illos, qui numerosi & apud Auctores extant, & quotidiana experientia confirmantur, mortis post vulnerata intestina, maxime tenuia, observatæ; siquidem id genus vulnera periculi plena esse apud omnes in confesso est.

§. II. Eximius *Vaterus*, merito ab incomparabili *Morgagni* in hanc rem laudatus, refert 28. annorum hominem, qui & multa sæpe devorasset, & æstuante corpore gelidam bibere copiosam solitus esset, inguinis tumorem advertisse, quem Medicus & Chirurgus Herniam rati, Brachierio atque Emplastris curare anniterentur. Aucto cum pessimis Ileii symptomatibus tumore, *Vaterus* in opem vocatus, abscessumprehendit, qui, adhibitis biduo maturantibus, ruptus, primo copiosum pus ingenti cum levamine fudit, sequentibus vero diebus cubitum longos lumbricos, & semicocta alimenta. Spem tamen haud abiciens *Vaterus*, datis remediis traumaticis, balsamicis, ac roborantibus, vidit demum hominem integræ redditum, constantique sanitati.

Ob rationes antea datas Intestinum Ileum apertum fuisse sit verisimile; addit *Vaterus* integre a se curatam mulierem, cui Colon in inguine apertum esse arbitrabatur: itidem sanatum virum a se fuisse, cui Hernia suppurata, extrorsumque rupta esset.

§. III. In Dissertatione, qua D. *Juch* hæc *Vateri* observationes propugnavit, observatio ex *Cl. Fascio* habetur hominis, qui in Bubonocèle sphacelata, excrementa alvina, una cum intestini Coli portione, per inguen excrevit, in vivisque licet imperfectius mansit. An cum Ano factitia?

§. IV. Dissertationum inauguralium de Chirurgia, a solertissimo *Hallero* collectarum, Tomo V. ea *Adriani Malaval* ob binos est memoranda casus.

I<sup>o</sup> Fœminæ, in Bubonocèles operatione, *Intestinum tenue* de Gangræna suspectum, vino, ejusque spiritu,

calefactis irroratur, reponitur. Primo sedantur, tandem silent prorsum prava quæque symptomata, proditque alvus. Decimo vero die, inguine rupto, exeunt continuis 6. vel 7. septimanis excrementa. Attamen consolidatum vulnus est, postque menses binos sat firma restituta valetudo.

2<sup>o</sup> Mulieri in eadem operatione, eodem cum felici in principio eventu, rumpitur ad 7. diem Intestinum foras, & continuis 15. diebus stercora fudit. Die 20. alvus prodiit, & *Octidui* spatio consolidata apertura sanitatem optimam adduxit. Cum nulla ante diem 20. alvus totoque illo tempore excrementa inguine profusa, perforatum videtur Colon fuisse.

Ad confirmandam ejusmodi vulneris letalitati negationem, herniaria methodus cujusquam *Circulatoris* enarratur, qua ille ad faciliorem Intestini elapsi introductionem, illud larga incisione aperire solebat.

§. V. Affertur etiam ex *Schenckii* Libro tertio *Seidelius*, foeminam producens, quæ octavo tumoris inguinalis die primum potum, idque intra *horæ spatium ab eodem assumpto*; deinde etiam portiones carnum, ac panis, aliasque alimenti solidioris reliquias, aperto de inguine misit: assumtis autem medicamentis adstringentibus, consolidantibusque, nec non adhibitis vulneri *Sarcoticis*, primo cibos, tandem & potus retinuit, *sexque hebdomadam spatio elapso*, penitus consolidata apertura, convaluit: *Ileum* penetratum fuisse videtur.

§. VI. Celeberrimus *Heisterus*, ut rem certissimam, narrat in Chirurgiæ Cap. 116. *Guelpherbyti* contigisse, ut in incarcerata Hernia Chirurgus Ducalis *Ramdohr* partem notabilem Gangrænosi Intestini excinderet, utraque extrema ad se adduceret, quo exciperent se mutuo, eaque tunc leviter circumligaret; effectum hinc, ut bina hæc extrema coirent, alvusque deinceps naturaliter semper flueret.



§. VII. Celeberrimi ac nobilissimi *Albini miles*, *Adn. Acad. Libr. 2. cap. 8. pag. 31.* cui *Colon* in prælio *Rameliensi* vulneratum, mansit quidem vivus, verum elapsis deinceps 20. annis *Albino* adhuc ostendit in sinistra Epigastrii Regione suam factitiam alvum, cum tunica villosa prolapsu tam superioris, quam inferioris, quam inferioris vulnerati Intestini portionis.

§. VIII. Similem prorsus Historiam *Mangetus* in *Bibl. Med. Tom. II. pag. 1156.* ex *Bouchardo* refert ea differentia, ut post tres annos ab inflicto vulnere suum virum is viderit; suum vero militem post 20. annos *Albinus*.

§. IX. Doctissimus *Kalschmidius* in *Act. N. C. Vol. 9. N. 4.* Vetulam profert, quæ antiquæ Herniæ incarcerationem passa, ejusdem operationem octavo demum die subiret; Intestino, (& ut ipse dicit, *Ileo*,) ita corrupto, ut intolerabili cum foetore prosilirent faeces. Ubi alvus diu nunc podice, nunc inguine prodiisset, demum post bimestre spatium elapsum, tantummodo quid sanguinis ulcere exivisse; at vero utrum perfecte consolidatum inguen fuerit, an manserit in inguine anus, ex enarratione colligi certo non potest.

§. X. Doctissimus *Pfaffius* *Nov. Act. N. C. Vol. 2. Obs. 12.* hunc notabilem casum refert. Homo 28. annorum biennis herniæ oscheoceles incarcerationem præ nimio messis labore patitur. Binorum Balneatorum laboribus Hernia, quo die morbi non additur, reponitur quidem, verum non cessant Ilei morbi symptomata, atque tunc primum accedens Auctor, stercora reperit vomentem. Petitis auxiliis undecumque, mitigat quidem symptomata, alvumque copiosam solvit, verum adeo non tollit morbum, ut tumor, dolorque scroti, & redeuns intolerabilis abdominis cruciatus, quo morbi die non adjungit, oriatur. Gangræna nata, jubet, aperiant tumidum scrotum; e quo mox flatus & excrementa prorumpunt. Balneator altera die plura in parte fo-

raminula per sondam explorans, invenit in Intestino prope testem nucleos Ceraforum, quorum quadraginta eduxit, sequenti autem die multo plures. Notat porro Historia ægrum, reposita primum hernia, copiosa Cerafa una cum nucleis deglutiisse; notat quoque violentam adeo tussim adfuisse, ut prodirent cruenta sputa. Cognito Intestini vulnere, enemata ultra non iniecit, omnibus Chirurgis, ut ipse putat, ea tunc condemnatis, sed Suppositorium immisit, advertitque crassiora alvo, inguine vero tenuiora, prodire. Jamque, nescimus quo die, novus in inguine tumor natus, suppuratus, & arte apertus, tum pus dedit, tum faeces liquidiores: inguine nunc hæc eiiciente, scroti apertura sensim coivit. Novus tandem, isque priore altior, abscessus in inguine observatur, qui apertus, pus, non faeces fudit; tandem & hoc, & illo sensim consolidatis, sanitas completa successit.

§. XI. Apud *Mangetum Bibl. Med. Tom. II, pag. 524. 525. D. Maichanquez* narrat ex vulnere angustiore, quod uxori inflixerat maritus, demum excrementa prodiiisse „ dilatato parumper vulnere apparet *Intestinum* „ *Ileum læsum*. ( Digito forte explorando deprehendere potuit canalem angustiores, Cellulis carentem, ) „ placuit in casu desperato periculum facere, nec ægra „ 25. annorum dolores recusabat, modo vita donaretur. Intestinum caute acu alligari curo cuti, recentisque laridi lamella interposita, ut facibus alvinis „ pateret transitus, cutem jungere jubeo, quod & factum; potiones præscribo vulnerarias, quibus ad stuporem curata est, binosque enixa est liberos annis „ sequentibus.

§. XII. *Mangetus* ibid. pag. 523. ex *Carolo Patino* refert fuisse hominem, cui globo sclopeti majoris abdomine perfoſſo prope umbilicum, demum die quinto globus ano ejectus fuerit, & perfecta cura, *exacto mensis spatio*, successerit.

§. XIII.



§. XIII. N. C. Decad. 3. ann. 4. referunt curam similem globis tribus ano ejectis; aliamque Rustici, postquam una cum fæcibus nucleos Ceraforum foramine inguinis sponte aperto eiecisset.

§. XIV. Et de duobus, quibus Chirurgi pro Bubone aperuerant ipsam Bubonocelem, unus quidem intra paucos dies obiit, alter autem, cui per 14. dies excrementa exierant, *sex septimanarum spatio* integram vulneris consolidationem nactus est: tandemque & tertius, cui ex *cæso punctim* Ileo chylus effluxerat, curatus integre fuit; referente *Hardero* apud *Mang.* ibid.

§. XV. Idemque pag. 530. ex *Wagnero*, qui ex variis id refert auctoribus, narrat *Ileum transversim percissum*, & extra vulnus prolapsum, futura cum vulnere intercedente, penitus coivisse: in alio integram curam observatam esse, post aperturam vermibus erodentibus factam; tandem *Hafnia* quemdam, erosionem etiam a vermibus facta, integre esse curatum; alterumque, cui ex sphacelata hernia umbil. nuclei prunorum, jam cariosi exivissent.

§. XVI. In *Actis Suecicis Stockh. an. 1746.* notissima mulieris historia est, cui venter rodente & erumpente *Tenia* sæpius apertus, iterumque ad tempus consolidatus fuerit.

§. XVII. In *Hist. Acad. Reg. Sc. Par. anni 1723.* ex suppurata Hernia Chirurgus suscepit ossa pedis ovilli N. 16. exciditque gangrænosi intestini portionem laterum quatuor digitorum; similemque circiter portionem, posthac a natura separatam, invenit. Expectabat porro, ni moreretur homo, anum factitiam; verumtamen observans sensim minus inde exire, dedit ipsi alimenta solidiora, & vidit *spatio 33. dierum* inguen clausum.

§. XVIII. Et quid demum de casu cogitandum, observato a Magnifico Archiatro *de Kestler*, anno huius sæculi 1729. foeminæ scilicet, cui in incarcerata Her-

nia visa esset periisse integra portio, semipedem longa, Intestini Coli: claudente nihilominus accurate se apertura, alvoque totis, quibus deinceps vixit, annis naturaliter fluente? Profecto totam a sphacelo separatam Coli portionem, cum exsiccata eandem, intusque lintheo carpto infarctam, sollicite Vir magnificus reservasset, ad me examinandi, ac Studiosis demonstrandi causa miserat. Ipsum Colon esse, & tota ejusdem substantia, & Ligamenti vestigia, saltem illius Tertii, a *Morgagni*, & *Winslow* descripti, Mesocolo tecti, & quæ aderat adhuc Mesocoli portio, evidenter docebant. Igitur sollicite scrutabamur, qua demum lege notabilis adeo Intestini portio sphacelo solvi, apertoque excidere inguine potuisset, intereaque temporis, non adductis ad se mutuo, ut alibi factum notavimus, utrisque extremis, excrementa a Cæco sic pervenissent ad anum, ut neque anus nasceretur in inguine, neque intra cavum abdomen decideret quidquam?

Res sane nobis incomprehensibilis visa est, nisi concederetur, quæ exciderit, Intestini partem, ejusdem vel tunicam externam esse, remanente interna; vel tunicam esse internam, superstita externa: ut sic, reservata quadam tubi continuitate, excrementa tuto versus anum devolverentur. Verum mox hujus Dilemmatis falsitas apparebat, cum sola interna pars Intestini non habeat ad se accreta ligamenta, nec connatum Mesocolon; cumque externa Intestini portio integra solvi minime potuisset, manente continuitate Coli ope tunicæ internæ: neque enim portio hæc separata lata, & per medium fissa membrana erat, sed clausum intestinum; quod utique hac forma minime separari potuisset, continuitate tubi intestinalis permanente ope tunicæ internæ.

Tandem veram totius phenomeni rationem, & causam sic videbamur intelligere: Intestinum inflammatum, qua parte Mesocolo hæret, accubuit peritonæo in inguine, eidemque accrevit: gangræna incipiente, tunicæ

Inte-



Intestini variæ a se mutuo dissolvebantur: gangrænâ pergente, lata in inguine facta apertura est; ita soluta interna pars intestini, cum *totius* intestini anterioris parte, cum peritonæo, cum expansione tendinea, & integumentis, foras prolapsa est. Habet ergo prolapsa portio cavum integrum, a cujus anteriore parte hæret Mesocolon, ligamentum tertium, omniumque Intestini tunicarum portio, & cujus reliqua pars interioribus Intestini tunicis tantummodo componitur.

Sed statuimus antea tempore inflammationis diræ Intestinum Colon, qua parte Mesocolon habet, accubuisse, & late concrevisse cum peritonæo. Necessè igitur fuit, ut, prolabente extra inguen interna Intestini parte, cum omnibus concretis partibus a facie ejusdem anteriore, ut, inquam, Colon externa sua parte in ventre integrum, firmiter suæ aperturæ oris cum peritonæo cohæserit, ita ut nihil in cavum ventrem dilabi potuerit eorum, quæ a Cæci sacco, aut Intestinis tenuibus deorsum, anum versus descendunt.

§. XIX. Sub finem anni 1745. negligens herniam foemina, incidit in symptomata morbi Ileï, quæ demum aperta alvo brevi evanuerunt. Attamen dum morbum curasse videbamur, aperuit se inguen, fuditque paucam, serosam, flavam, ac subinde vere stercoream materiem. Capto Clariss. *Albini* consilio, laboravi cum Chirurgo novem mensium spatio, antequam locus clausus esset; optima interea vigente sanitate. Locus molliore quidem, sed apto admodum Brachierio firmabatur, ne rediret malum. Attamen sex cum dimidio elapsis annis, denuo aperitur, citra symptomata ulla prava, citra stercoream materiem. Nescio, quem finem res habuerit, quum ad ultimam aperturam, illam cum Patria reliquerim.

§. XX. Docent omnia hæc exempla siccatis ab inflammatione partibus, alterius cum altera cohæsionem fieri, antequam inguen aperiatur: sic quidem sæpe ut  
hil

hil in cavum ventrem, sed per inguinis aperturam; cave clausa, per podicem cuncta exeant.

Haud tamen eodem ubique modo. Vulnura instrumento in Abdomen inflicta, plus periculi habent effundendi cavum in ventrem stercoreis, & semicocti chyli. Docet id notabile exemplum a *Mangeto*, ut teste autopte, relatum hominis, qui sic triangulari instrumento fauciatus, ut vermes excrementaque sinistro inguine exirent, sexto demum post decimum die moriebatur; idque exhibebat præprimis memorandum, quod Intestini Coli labia jam tum undique, firmiterque, & exacte, cum vulneris labiis coivissent: unde mors unice inde ipsi contigerat, quod fæces intra ventrem pulsæ essent, priusquam perficeretur expositus mox coalitus, sæpe sat cito, ut datis exemplis constitit, contingens.

§. XXI. Atque ita Prognosis, pagina 173. petita, & dilata hucusque formari demum potuit.

Prognosis igitur primo fert summo semper in periculo eos versari, quibus intestina, potissimumque tenuia, aut vulnerentur, aut gangræna aperiantur: cum, vel integra aperti Intestini cohæsiōe cum Peritonæo nondum facta, fæces, crudusve chylus intra cavum abdomen dilabi, certumque proinde efficere interitum queant, vel etiam fæcibus quidem extra Inguinis aperturam prorumpentibus, gangræna vero in sphacelum jam conversa, late nimis diffusa per Intestinum corruptio sit. Hacque lege veridicus agnoscitur *Hippocrates*, qui morbum non indiscriminatim Intestini cuiusque, sed Intestini *tenuis*, ut determinate utroque in Aphorismo loquitur, *Θάνασιμον*, vel *Θανατῶδες* appellans, eum valde periculosum esse indicavit. Confirmant hanc Strages, quas adeo multiplices omni tempore solet descriptus hucusque morbus edere. Et si per *Διχοπήν* intelligere debemus vulnus usque ad fundum omnia penetrans, & dividens, ut supra constitit, etiam vere pro-

nun-



nuntiavit, Intestinum ipsum post διακοπήν non coalescere libero, ut antea, modo; cum illud facie anteriore uniri cum Peritonæo, & reliquis læsis in vulnere partibus, iisdemque firmari, obturari, supplerique, ex observatis chirurgicis & anatomicis constet. Ut profecto inique admodum in *Hippocratem* ii Auctores declamarint, qui numerosi, illum hac assertione vehementer errasse, assèverarint.

2<sup>o</sup> Eorum, qui inde non pereunt, multos dari, quibus sanitas omnino integra non redeat, aperta manente inguinis, ventrifve alicubi apertura, per quam, ceu anum, natura suas spurcities, factore abominabiles, hominemque per omnem vitam humana societate fere privantes de corpore eliminet.

3<sup>o</sup> Horum nonnullis alvum nunquam ultra per anum emitti, imo in Intestinum Rectum & Colum, utpote collapsum, enemata immitti amplius non posse; ut *Vaterus*, *Bleigni*, &c. habent: nonnullis vero manere aliquam sive fœcum, sive materiæ mucosæ, renacisve, per Intestinum Rectum excretionem; ut *Acad. Reg. Sc. anni 1701. Platerus*, *Hildanus*, *Bleigni*, *Passinus*, *Cheseldenus*, *Albinus* viderunt.

4<sup>o</sup> Reperiri etiam, quos Artifices peritissimi, adductis ad aperturam vulneris ambabus separati Intestini oris, invicemque unitis, atque ad vulnus alligatis, ita percurarunt, ut continuaretur canalis intestinalis a summis ad infima usque, & alvus lege naturali deinceps semper processerit.

5<sup>o</sup> Passim his, qui integre curati, adeoque ad perfectam sanitatem rediisse perhibentur, Intestinum manere loco læsionis angustius, prætereaque ad locum vulneris adfixum & connatum, ob idque causam pravorum quandoque symptomatum, imo leti ipsius existere: constare quippe ex Historia Medica, & confirmari notabilissimis exemplis anatome demonstratis, ab egregio *De la Peyronie Tom. I. Act. Acad. Chir. Par.* truculentissimos do-

lores Colicos hinc nasci, dum Intestina materie aut flatibus nimium turgent, spasmisque torqueantur; imo vi spasmorum, aut impletionē nimia rerum indigestilium, Intestinum ad locum adhæſionis dilacerari, & abdomen facum impletionē letali turgere. Accretionem hanc Intestini cum abdominis partibus confirmatam *Heister* vidit in foemina eadem, quæ integre sana ab operatione *Ramdhorii*, ( vid. pag. 180. ) anno posthac pleuritide occubuit. Unde id hominum genus semper de hisce præmonendum est. Atque hisce omnibus ita consideratis, clare patebat in foemina nostra Prognosis. Vel enim morituram gangræna partis affectæ, vel gangræna abdominis, si forte intestinum in toto vulneris ambitu necdum hæreret exacte cum Peritonæo, ita ut in cavum ventrem fœces a superioribus descendentes, facile & subdole dilaberentur: vel victuram quidem, sed cum molesta in inguine ano: vel curandam integre quidem, attamen cum proægumena permanente causſa variorum morborum, ni caveret sibi, imo & mortis. Videatur super his omnibus Ill. Præses, *Cap. de Vuln. Abd.*

§. XXII. Indicatio fuit vires conservare, auferre impedimenta consolidationis, vul purum, atque ab aëre tutum, molle & humidum conservando, alimenta eligendo ea, quæ quotidiana experientia docebat omnium minime per aperturam exire, & alvum propterea liberam clysmatum ope perpetuo servare. Enemata enim formidanda, ut supra vidimus, quando Colum apertum necdum agglutinatum est, ne in cavum abdominis cadant, hic tuto injecimus, eo quod Ileum læsum crederemus.

Vidimus his scopis conferre alimenta facilis digestionis, & cum consuetudine plebejorum convenientia. Ius carniū præprimis indicatum, omnium maxime vulnere difflebat; uti & quæ siti sedandæ necessaria aqua. Hinc Cerealìa, ac Farinacea varia incocta jurbus proderant, & aquæ potus ita moderatus, ut parva  
admo-



admodum copia sumeretur, & sitis potius emulsis sedaretur spissioribus. Usus demum docuit alimenta solidiora, pauca quidem copia simul, sed repetita, omnium maxime ad consolidationem facere. Præsertim si jaceret mulier tota fere die in lecto. Ulcus interea tectum primo fuit Cataplasmate emolliente; deinde Emplastro Diachyli cum gummi, superposito Cataplasmate, postea Emplastro defensivo rubro, tandem eo, quod dicitur *Fernelii ad rupturas*. Tertio mense potuit sine nocumento aliquantum sedere, tandem & surgere, ambulare, operari sine incommodo. Advertimus porro haud simul & semel ulcus clausum; sed ita, ut primo per 1. 2. dies, dein per 4. vel 7. clausum esse videretur, ac posthac denuo aliquot extillantibus guttulis humesceret. Contigit sic, ut mulier hæc intra binos menses curata dici potuerit, excepto hoc repetente aliquoties stillicidio; curata vero integre perhiberi non potuerit, nisi mense inchoante sexto, quando levis hæc ulceris veluti sudatiuncula cessavit, non reditura. Juvit ad integram consolidationem vinum marte & cortice peruviano medicatum.

§. XXIII. Symptomata aliena nulla se junxerunt morbo, toto curæ tempore, nisi tussis, cujus nulla indagari causa potuit, morigera tamen demulcentibus ac paregoricis. In homine *Pfaffi* pag. 138. notavimus tussim molestanti atque violentam. Et *Albini* miles pag. 181. tussi vexabatur, quotiescumque aërem frigidiusculum ad nudum Intestinum admisisset, nec antequam recaluisset sedanda. Observando potius hæc discimus, quam Physiologie explicamus. Neque Intestina, Mesenterium, ac varix abdominis partes duntaxat, hanc observationem suppeditant, verum & aliæ plures. Ventriculi morbi dantur, quos pertinax tussis comitetur; mox his curatis evanida. Et quisnam subinde, meatum auditorium scalpendo, haud tussiat? Acriorem, pertinaciorum, & ad omnia rebelliorum tussim observavi nunquam, quam in

Puerpera olim; attamen, ejecto pudendis corpore oblongo, calloso, veluti incantamento curatam. In diagnosi, prognosi, ac cura morborum, observationes ejusmodi usum habent. Bis diarrhæam passa est, Rheo, & Lysimachia victam.

§. XXIV. Egressa demum nosocomio est, pinguis & torosa; id quod in ægris nostris toties observantes, minus remediorum vi tribuimus, quam vitæ ab omni cura & sollicitudine vacuæ, somno pleniori, quieti, optimo alimento.

## C A P U T V.

### Varia.

---

§. I. *Puellæ Atresia laborantis, de qua anno 1761. cap. 2. a pag. 52. ad 60. Historia completa.* §. II. *Quædam de utero gravido.* §. III. *De Calorem generantibus causis aliis præter attritum, imo absente attritu.* §. IV. *De Observationibus Clinicis Nosocomii.* §. V. *De Febre Hæmorrhoidali: deque Observationibus Nosocomii circa Hæmorrhoidas.* §. VI. *Ad Quæstionem de Bezoardicis remediis, toties a gravissimis Practicis explosam, jamque nihilominus renovatam, Responsio.* §. VII. *Nonnulla de Mistura Viennensibus dicta Hoffmanniana.* §. VIII. *Quædam, quæ ad C. II. §. V. omissa fuere.* §. IX. *In quosdam Criticos.*

§. I. **Q**Uæ Atresia laboraverat puellæ Historia anno superiore data est, sed incompleta felici exitu terminata fuit. Tumores in abdomine varii, copiosaque in Vagina callositas, methodo interna, externaque ibidem enarrata, atque ad Octobris circiter exitum



tum continuata, sensim fusa sunt, mensesque rite fluere interea cœperunt: ita ut perfecte sana die 5. Nov. 1761. domum perrexerit, & hoc mense Septembri proxime elapso ob ventriculi vitium me conveniens, testata sit menses sibi copia ac tempore debitos adesse, nullosque aut in ventre tumores, aut nullam ad pudenda superesse callositatem. Novo sane argumento Corticis peruviani præstantiæ; licet enim alia remedia præter hunc dederimus, prout superiore tomo descripsi, tamen iusto cuique rerum æstimatori evidenter apparebit Cortici potissimum adscribendam Victoriâ esse

§. II. Cum anno superiore de Viscerum Cavorum dilatatione agerem, eademque nunc incrassari, nunc extenuari, nunc ejusdem manere crassitie in dilatatione, ostenderem, evitari non poterat, quin sermo incideret in uterum, veluti cavorum viscerum fere principem, propriaque observatione typis necdum edita, quod de eo demonstratum esset, confirmantem. Addam propterea, quam præsens annus academicus suppeditarit, novam confirmationem.

In tertium mensem gravida vapulat a marito pedibusque ad hypogastrium conculcatur. Venter posthac ratione graviditatis crevit quidem, sed admodum inæqualiter: ita ut dextro hypogastrio ille sensim tumidior, ac tandem sub menses ultimos admodum turgens observaretur, suspicioque Gemellorum, quorum in medio alter, alter sinistrorsum locatus esset, animis innasceretur Obstetricantium. Denique 31. Jan. hujus, quem vivimus anni, partus ingruere dolores. Recte tum uterum situm, tum foetum, arbitrata obstetrix, prægnans serio cooperaretur, adhortata est. Cum autem minime promoveretur partus, alia obstetrix, & tertia, & quarta, atque ordine hoc & octava vocatæ, socordem esse, quod cum natura foetuque haud cooperaretur, parturientem clamarunt. Unde tandem inhumanus maritus, duplex, ut patebit, homicida, verberibus il-

lam, quo cooperaretur, adegit. Illucescente inanium partus dolorum septimo, eidemque fatali die, optimæ spei Studiosus, inque arte obstetricia magnæ dexteritatis D. *Hopf*, invenit in ore uteri humerum infantis, & secus illum funiculi partem portionemque placentæ. Cum educturus infantem, hæc omnia loco movere deberet, ac ferme removisset, subita ingensque hæmorrhagia foeminam subtulit.

Adductum mox ad me uterum examinavi. Facie anteriore sectus ille, infantem eximendi gratia, distentus mansit, ubique fere pollicis habens crassitiem. In perscissa transversim hac crassa substantia vasa inventa numerosa sunt, angustiora, ampliora, & quæ calamus scriptorium facile caperent, nonnulla, omnia autem fere vacua. Necessè porro fuit, ut hæc ipsa vacuitas, & tempestatis frigus ingens, horum vasorum lumen, uterique crassitudinem, multum imminuerint. Quo loco placenta fuerat, cernere erat vestigia multa lacunarum. Idque notabile præprimis, quod uterus in ambitu placentæ fibras musculares referret bene multas; cujus modi fibræ *Ruischio* ideam muscoli fætum pellentis, placentamve, generare quondam potuere. Portionem crassi hujus uteri, demonstrationis ergo, servo in liquore.

Quod vero partum adeo difficilem reddiderat, ac crudele mariti facinus arguebat, erat uteri substantia, dextera sui parte abeuns in Steatoma figuræ fere rotundæ, pendensque pondere medico Libras tredecim & quatuor uncias. Ovarium utrumque naturaliter sese, una cum tubis, habebat. Præ enormi igitur hoc Steatmate necesse est uterus & rigidus, & pro parte repletus fuerit, adeoque dolores partus in fætum directe agere non valuerint; imo potius ipsum Steatoma, urgentibus hisce doloribus, corpus infantis compresserit, neve rite exiret, impediverit.

§. III. Observationes Thermometricas nostras, circa varium gradum Caloris, in varia sanorum ægrorum-



rumque corporum conditione, ac statu, nec non circa ipsarum calorem gignentium causarum diversitatem, multis hujus anni academici experimentis ita reperiimus confirmatas, ut data dudum de iis sententia, undique facta testaque videatur. Inter multas observationes, cum prioribus nostris easdem, referenda historia videtur, quæ hac æstate, in Acutis morbis publice tractandis, observata est.

Fœmina 37. annorum febre continua putrida laborans, ( quæ nobis observata immortalis Cœi de fallacia judiciorum in diebus non bonis, cum materia haud rite cocta, veridica omnino esse, usque in quartam hebdomadam, demonstravit, ) die morbi 4. 5. & 6. perpetuo conquerebatur de interno calore urente, caloremque 6. 8. 10. 12. gradibus naturali intensiorem in Thermometro notabat; interea dum ego, dum nonnulli Medici adstantes, dum tota Studiosorum cohors, vix unquam in pulsu motum febrilem notabilem palpabilemve, imo potius pulsum bonum, plenum, æquabilem deprehenderimus; dein die 7. 8. 9. 10. & Thermometrum, & sensus ægræ, & tactus noster, & febrilis admodum pulsus, calorem magnum una demonstrarunt. Ut merito putem nihil certius, demonstratiusque esse hac propositione: Caloris causam indubitato esse mutuum vasorum humorumque inter sese, nec non ipsarum humorum nostrorum particularum attritum; ac vero necessario caloris causas longe alias, quam hunc attritum, in rerum naturâ existere; quandoquidem calor tum ad sensum, tum ad thermometron, isque & intensus admodum & diuturnus, toties in homine reperiatur penitus absente, omnium votis attritu. Miror ab iis, qui hujus veritatis testes oculati aut fuerunt, aut esse potuerunt, haud ita pridem in publica Thesi indirecte eandem oppugnatam esse.

Constitit quoque, experimentis infinitis repetitis, medium horæ quadrantem sufficere, ad hominis explo-

randum cum thermometro calorem, additis ad notatum tunc gradum gradibus binis. Solet quippe 1<sup>o</sup> calor verus, isque haud ultra augendus, quadrantis horæ spatio notari: 2<sup>o</sup> a semiquadrante ad quadrantem binis tantummodo gradibus augeri. Unde liquet semiquadrantis spatio haberi determinatum caloris gradum, additis duobus. Vix enim ex quinquaginta vicibus semel continget, ut hæc regula fallat; & si rariore casu, saltem haud ultra dimidium, integrumve gradum, fallit. Sed hæc ea conditione dicta sunt, ut thermometer & bonum sit, & bene ab initio vestibus ac stragulis tectum, dum sub axilla ponitur.

§. IV. Observationes Clinicæ de Acut. morborum cruditate, de coctione perfecta & imperfecta, de eadem inchoata & completa, de statu morborum, de diebus indicatoriis & criticis, de Metastasi varia, de morbis novis ex præcedente acuto natis, de urina, de pulsu, de respiratione, de varia Hypochondriorum in Acutis conditione, de signis ex habitu corporis petendis; æque variis functionum læsionibus; hæc, inquam, observationes nos demum omnes convicerunt veraciorem in tota Bibliotheca, Scholave medica, Auctorem *Hippocrate* non dari. Quod cum ita se habeat, merebitur sane hæc materies, ut DEO vitam largiente viresque, Tomus hujus operis octavus integrum *Hippocratem*, ad lectos ægrorum demonstratum, & confirmatum, compendio exhibeat; quo demum omnes ad *Hippocratem*, Virosque Hippocraticos, & admirandos, & sequendos incitemur.

§. V. Doleo ex male intellecta doctrina mea Theses quodammodo erroneas sæpius a Medicinæ Candidatis proferri publice. Amans illos perpetuoque amaturus, & jam sæpius hoc ipso Tomo septimo veram meam sententiam paucis elucidavi, & circa quasdam nondum recensitas Theses sequentibus elucidabo.



Propositum iterata Thesi fuit, *Dari Febrim Hæmorrhoidalem*: postremaque vice defendenda simul proposita fuit Hæmorrhoidalis fluxus crebritas, Viennensibus, quam cæteris omnibus, notabilior.

Quid illi nomine *Febris Hæmorrhoidalis* intelligant, id plane ignorare me fateor; ignorabunt forte quoque Thesium auctores. Oportet enim hoc nomine intelligant Febrim, vel quæ ab Hæmorroidum affectione, obstructione, inflammatione suam ducat originem, vel quæ Hæmorrhoidum fluxum pro crisi habeat. Porro neutro modo hanc febrim licebit hæmorrhoidalem vocare.

Non priore modo; nam in Libro, unde hoc nomen mutuati sunt, signa nulla enarrantur prægressæ alicujus affectionis hæmorrhoidalis: e contrario verbis notatur disertis post febrim jam natam, nec raro alterum, tertiumve diem jam numerantem, tumentes demum apparuisse Hæmorrhoidas.

Neque etiam posteriore modo. Narrat enim morbi historia admodum frequentem hanc febrim fuisse, attamen vix esse inventos paucos, quibus aut a natura, aut ab arte promotus hic fluxus fuerit: multos vero nifus duntaxat hæmorrhoidales, citra fluxum earundem, perpeffos esse; irritoque hoc nixu, citra alias substitutas, sive a natura, sive ab arte, evacuationes, cito integreque convaluisse.

Demus autem, quod dari non potest, a paucis eorum numero, qui in frequenti admodum febre hac fluxum hæmorrhoidalem a natura, arteve passi sunt, totam febris naturam desumi oportere, ideone *Febris Hæmorrhoidalis* appellanda est? Eodem sane jure inflammatoriam aut acutam quâmcumque febrim vocares Alvinam, vel Mesentericam, quæ alvo judicetur; Renalem, quæ per urinas; quæ emesi, Vomitoriam; quæ sputis, Sputatoriam; quæ catameniis, Menstrualem; quæ post aurem tumoribus, Paroticam; & sic porro. Est igitur loquendi modus, qui e scholis medicis peti-

rus non est: quemque Auctores harum Thesium ad lectos ægrorum, me demonstrante, non didicerunt.

Qualisnam ergo est, de qua hæc Theses febris? Febris est talis indolis, ut similem sui in tota Historia medica non habeat: quippe quæ in summa, imo in crescente Cruditate, bonis jam gauderet perturbationibus criticis; quæ irritis, nec per alias excretiones suppletis, ad evacuandum nisibus, brevi tutoque judicata esset: cum e contrario perpetua atque æterna Naturæ Lex sit, ut Criticæ perturbationes, si profuturæ sint, cocta materie, bonoque die compareant; utque morbi minime judicentur ab irritis ad evacuandum conamine, nisi eidem alia evacuatio conveniens, atque sufficiens succedat; aut nisi, defectu etiam hujus, vagi materiæ morbosæ errores homines diu torserint, &, multis occisis, demum quosdam post diuturnas ærumnas in vita servant. Quemadmodum in illa Epidemia apud *Hipp. Epid. Lib. I. pag. 941. 945. Fœs.* in qua nullæ omnino crises observabantur, aut nullæ saltem, quæ id, quod inceperant, perficerent.

Obiiciet mihi forte quisquam benigna resolutione eos fuisse curatos, quibus irritis naturæ conamine, nec aliunde suppleto, cita contigerit perfectaque salus, adeoque famosam hanc febrim, veluti sui similem in Medicina non habentem, a me describi non oportere.

Verum qui sic censeret, is leges & conditiones benignæ resolutionis, ad gravem, ad periculosam, ad inflammatoriam hanc febrim, contra omnem Medicinæ legem, experientiamque applicaret. Secundo non adverteret idem, hac sua prolata sententia, illico rationem concidere totam, ob quam vocetur febris hæc Hæmorrhoidalis.

Atque hæc de nomine hujus Febris sufficiant. Superest additamentum videre ad Thesin de febre hæmorrhoidali, ultimo defensam, adjectum: „ Et Hæmorrhoides Viennensibus, quam aliis Nationibus, magis familiares sunt: ut merito de his suspicentur sæpe Medici.

Pau-



Paucis Lectorem hic volo. Nonus jam annus est, quod & in ipsis ægrotantibus, & in scriptis Tyronum in gratiam typo editis, & in Cathedra, genuinam *Hippocratis*, id est, Naturæ, tradiderim de Hæmorrhoidibus doctrinam; qua constitit vere Criticas dari Hæmorrhoidas, tum in Chronicis, tum nonnunquam Acutis in morbis, hæque a Medicis attente observandas esse, juvandas, ac promovendas: dari præterea Hæmorrhoidas symptomaticas: dari etiam noxias plane, & perniciosas: tandem auctoritate & experientia eos damnandos esse cum Medicos, tum Plebejos, qui omnium fere morborum curam ab Hæmorrhoidibus, vi promotis, expectarent. Hanc meam sententiam Thesibus de hac re publice editis cognitam, Clari Viri, quorum alii calidis in Regionibus, alii in frigidis, Medicinam faciunt, literis ad me datis confirmarunt.

Quod autem maxime Medicinæ Studiosos de Hæmorrhoidum apud *Viennenses*, universosque *Austriacos*, natura convincere debuit, numerus est bis mille & ultra hominum, quorum exactissima Historia adhuc prostat, qui, ipsis circumstantibus, examinabantur, & quos inter vix quatuor extitere, in quibus ipsa Natura hæmorrhoidum fluxum indicaret. Igiturne, post tantam experientiam, ipsis adstantibus captam, *Viennensibus*, *Austriacisque*, Hæmorrhoides præ aliis familiariores? Hæmorrhoides saltem illæ, quæ se aperiundas clament? Minime; nisi velint eas frequentes hic esse, atque pro crisi notandas, quas, natura non indicante, Medici & Chirurghi hominibus sponte creant: verum tunc nullatenus intellexere me in *Tractatu de Hæmorrhoidibus* docentem, atque omnium sæculorum auctoritate demonstrantem, qua demum ratione Medici has considerare, & circa easdem gerere se debeant. Doleo profecto has Theses ipsis consideranter elapsas esse, id præprimis veritus, ne qui alibi gentium easdem legant, vel animum in studendo socordem, vel in proferendo aut obstinatum, aut malevolum fuisse suspicentur.

§. VI. Eodem prope modo res habet erga *Febres malignas* dictas, quibus *Petechiæ*, *Miliares*, aliave exanthemata, se jungere solent. Propriis ad lectos ægrorum experimentis, numerosa Tyronum semper cingente Corona, petitis ac repetitis; Libro meo de *Febrium Divisionibus*, ( in quo præcipuorum cujusque Nationis, præsertim Germanæ, Medicorum, suffragiis luculentissimis, suffultus fui; ) nec non *Tomis Rat. Med.* 3. 4. & 5. demonstratis, Medicinæ Studiosi convictri fuerint oportet de veritate Asserti, statuentis malignitatem morborum sæpe a Methodo medendi unice gigni; petechiales autem & miliares efflorescentias perquam raro naturæ curantis esse opus: præcipue dum hæc invictis experimentis confirmata viderunt in spatiosissimo Nosocomio Hispanico, ab eruditissimo, sagacissimoque ibidem Medico, Discipulo quondam meo laudatissimo, *G. Hazenrohl*, edito tractatu anno 1761. An igitur mirari me non oportuit, quod e schola Viennensi Pathologica prodierint, qui publice edidere hanc Thesin: „ Sed „ etiam absque calido regimine erumpunt exanthemata, non igitur aut febris miliaris, aut alia, a calido semper oritur regimine, aut bezoardico medicamento. *Praxis*. Et dubitari potest an unquam a bezoardico medicamento exanthema enasci visum? „ Profecto cum ejusmodi opinione in ægrorum perniciem nonnulli abuti possent, cogor paucis eandem examinare.

Vera in eo dixere a calido regimine, aut bezoardicis, *haud semper* exanthemata nasci; neque unquam id asserueram, sed *sæpe*: & si non exanthemata, saltem alia frequentia mala. Potuerant, debuerantque meam circa hæc mentem clare percepisse, in *Vindiciis* meis contra Apologiam *Ill. Halleri*; quas *Vindicias*, ut verbo hic moneam, Vir quispiam, æque in Theoreticis, quam in Practicis, præcellentissimus, confirmaturus est, numerofo plane experimento & vivis in brutis, & potissimum in vivis hominibus, multis coram testibus,



magnisque suis sumtibus, capto. Hinc hisce non immoror; quæ vero ad Bezoardica, & ad regimen calidum spectant, hæc paucis tangam.

Varii generis Bezoardica sunt. 1<sup>o</sup> Bezoardicum *Animale*, confectum ex Hepate & Corde Viperarum, siccatis in sole, inque pulverem redactis. *Lemmerpharm. univ. pag. 130.* Ratione salis alcalini & obesse in febribus putridis potest, augendo, quæ ad putredinem adest, dispositionem; & nocere potest movendo sudorem eo morbi in stadio, in quo aut nihil movere licet, aut saltem non sudores.

2<sup>o</sup> Bezoardicum animale aliud est *Lapis Bexoar*, præsertim Orientalis. Pluries hunc ad experimentum in Nosocomio revocavi, siquidem AUGUSTISSIMA, pro munificentia sua, promovendarumque scientiarum amore, copiam hujus lapidis mihi fecerit. Præter alia experimenta quondam publice capta, hæc 13. & 14. Julii hujus anni cœpimus. Lapis nucis moschatæ minoris magnitudine, per horam in unc. iv. aquæ frigidæ immissa, dabat aquam grate amaram. Relicta per 10. horas amarorem eidem aquæ copiam conciliavit nauseosum, & omnibus nobis, quorquot gustaverimus abominabilem. Unde merito conclusisse videmur infusionem ita dictam Lapidis Bezoar, cum aqua aliqua aromatica, aut cum vino, uti plurimum fit, remedium movens esse, stimulantisque ad sudores. Referri huc & Bezoar Occidentalis, Pedra del Porco, Pæstitius Lapis de Goa, &c. &c. solent.

3<sup>o</sup> Bezoardicum *minerale* vocant Antimonium fixatum cum spiritu nitri; id quod parum calcinatum, corrosivum; quod multum calcinatum iners, quod justo modo calcinatum, prodesse in morbis potest. Bezoardica varia mineralia ab aliis metallis parantur.

4<sup>o</sup> Remedia elapso sæculo, prioreque hujus, quod agimus, sæculi parte, titulo Bezoardicorum famosa varii generis erant, quemadmodum apud *Michaëlem, Lu-*

*Ludovicum, Schröderum, Herculem a Saxonia, Techmeyerum, Barbette, Etmüllerum*, innumerosque alios Scriptores medicos, præsertim *Germanos*, legimus. Sic erat v. g. Mistura contracta Bezoardica, sic vocata, binis assumenda dosibus composita ex dr. i. Mist. simpl. Ludovici, & dr. semis Liq. c. c. succinati. Hæc autem Mistura simplex Ludovici sic parabatur: ℞. spir. tart. rectificatissimi p. iiii. spir. urinosi volatilis, & spir. vitrioli novies sublimati, ā p. i. Totum hoc, cessante effervescencia, misceatur cum spiritus Theriacalis V. partibus, & per retortam destilletur. Si nunc huic simplici dictæ misturæ Camphorā, Opium, & Santalum, addebantur, vocabatur Tinctura Bezoardica. Alia quoque Mistura Bezoardica celebris erat hæc: ℞. Aq. Rutæ, Scorzonæræ, ā unc. ij. Mist. simpl. Ludovici dr. i. Spir. fulig. rect. gr. XXX. Syr. Scordii dr. IV. m. pro binis dosibus. Ubi vero post hæc data ad sudores delirium imminabat, dabant sequens: ℞. Aq. Cord. Herc. a Saxonia unc. i. Aq. cinamomi dr. IV. Aq. Theriac. camph. dr. ij. c. c. essentificati, vel loco ejus, Sal. Vol. c. c. Scrup. i. Salis vol. succ. Grana X. Syr. Flor. Tunicæ dr. IV. Ad sudorem vero una dosi tunc eliciendum dabant Tinc. Bezoard. Ludovici dr. i. cum Scrup. i. spir. c. c. Ad normam porro hanc innumeras invenire est formulas apud Auctores supra laudatos, aliosque.

Porro quod omnia hæc Bezoardica in morborum principio data, repetitaque, calorem jam nimium augerent, non movenda moverent, turbarentque coctiones, flos Hippocraticorum virorum, *Sydenham, Baglivus, Boerhaave De Gorter, Ill. Præses*, ipseque etiam *Cl. Fridericus Hoffmannus*, unanimiter sese horum usui opposuerant; veluti malignitatem ita dictam in morbis, ac varii generis efflorescentias, petechias maxime ac miliares producentium, foventiumque: quemadmodum videri compendio potest *Tract. de Febr. divis.*

Quod



Quod Hoffmannum hic cum cæteris laudem, per-  
verse concepta de egregio hoc Viro opinio me cogit;  
ubique enim condemnat Regimen calidum, & Alexi-  
pharmacorum, Bezoardicorumque usum; compendio au-  
tem Capite de Febre purpurata §. II. „ Quam gravi-  
„ ter, inquit, dein calida & alexipharmaca medica-  
„ menta noceant, docuit sane uberius experientia, qua  
„ constat eadem, cum astuoso Regimine, in causa esse,  
„ quod ingruente primum novo hoc morbo (miliari)  
„ omnes fere perierint, quum jam sub temperata me-  
„ thodo plurimi evadant. Quin liberalior tantum infu-  
„ sorum, & decoctorum calidorum potus, sudorem ni-  
„ mium movendo, & serum plus justo exhauriendo,  
„ officit. „ Equidem suasit nonnunquam Bezoardica:  
sed qualia? Scilicet sua; ex c. c. non usto, Lap. Cancr.  
Antim. diaph. & Cinnabari. Non sunt hæc communi  
notione Bezoardica.

Et in Cap. de Febr. epid. exanth. sive petechizante:  
„ Ex medicamentis, inquit, Alexipharmaca, salia vo-  
„ latilia, Bezoardica calida & spirituosæ, licet ceu effi-  
„ cacissima vulgo commendentur, plus damni, quam  
„ emolumenti, attulerunt, præsertim liberalius, & cum  
„ calido regimine exhibita. Diffolutionem enim sangui-  
„ nis elementorum promoverunt, & ob id majorem pe-  
„ techiarum fecerunt copiam; vel Cephalalgias etiam,  
„ anxietates, inflammationes, vel etiam sudores copio-  
„ sos suscitaverunt. Quin novimus his ad præsertionem  
„ cum regimine assumptis, MOX IPSO CONTAGIO COR-  
„ PUS fuisse affectum.

Et ut innumeros similes locos præteream, instar  
omnium ille est, quem habet Cap. de Febr. ard. „ No-  
„ tandus vulgaris admodum tamen perniciosus ERROR  
„ PRACTICUS, quo primis statim diebus, liberali ma-  
„ nu essentias Bexoardicas, & Alexipharmacas porrige-  
„ re suescunt MORBORUM ARTIFICES, AD MALI-  
„ GNITATEM, UTI STOLIDI PUTANT, A CORDE  
PEL-

„ PELLENDAM. Hæc enim, si sanguis redundat, æstum  
 „ inflammatorium magis augent, & febrem graviolem,  
 „ & diuturniorem reddunt; quin si alvus simul diu-  
 „ tius clausa, SANGUINEM NIMIUM RESOLVENDO,  
 „ EXANTHEMA PARIUNT.

Ut & Cap: de *Purpura Chronica*: „ Multo vero  
 „ minus . . . essentias & tincturas Bezoardicas, hic  
 „ morbus ferre potest, sed potius ex illorum usu sem-  
 „ per augetur, magisque accenditur. Vidimus certe  
 „ mitioris alias genii purpuram Chronicam, febris &  
 „ vehementiæ symptomatum prorsus expertem, . ho-  
 „ rum, & regiminis usu IN MALIGNAM FUISSE CON-  
 „ VERSAM . . . . . Et in genere id quoque pro  
 „ comperto est Purpuram, quo citius, & impetuosius,  
 „ per medicamenta, & calidum regimen expellitur,  
 „ EO FACILIUS & LEVISSIMA DE CAUSA EVANE-  
 „ SCERE, & INTERIORA REPETERE.

Magnorum igitur horum Virorum exempla semper  
 in praxi sequutus, ea nunc in nonum annum Medici-  
 næ Studiosis ita demonstro, ut de veritate moniti cla-  
 rorum horum Virorum nullum dubium superesse possit.  
 Et nihilominus, quis credere possit! ejusmodi reperiun-  
 tur, qui schola mea vix egressi, publice sustineant du-  
 bitari posse, num a Bezoardico medicamento natum un-  
 quam exanthema sit? Erubescio dum Viennæ ejusmodi  
 proponi video, & me ideo circa hæc explico, ut dum  
 boni practici alibi hæc legent, noscant saltem ex me  
 non hausta, ex mea schola petita non esse.

§. VII. Ejusdem propemodum farinæ est, quod in  
 alia Thesi inaugurali circa Misturam ita dictam *Hoffman-*  
*nianam* est prolatum: „ Mistura Hoffmanniana haud  
 „ recte *criminatur* in febribus, non tantopere stimulat,  
 „ ac dragma nitri in Libra una vehiculi. „ Nihil hic,  
 „ nisi vitiosum, profertur. Etenim 1<sup>o</sup> non determinatur  
 copia Misturæ, quam Celeberr. *Hoffmannum* ipsum,  
 varia copia, varia ingredientium proportionem, dedisse,  
 ex



ex lectione omnium ejusdem operum constat. Oportuisset profecto prius exacte determinare vehiculi, contentique in eodem dosin, antequam minus stimulan, quam dr. i. nitri in Libr. i. vehiculi, statueretur. 2<sup>o</sup> Auctores ejusmodi Thesium in Nosocomio non didicerunt Nitrum semper hac proportionem ad vehiculum dari oportere ægris. Vix quatuor Libræ dragmam nitri capiunt, quando a stimulo vel minimum metuimus, præsertim dum ægri copiose bibunt. Sed 3. si mistura hæc, antenatum *Hoffmannum* jam obsoleta, *Hoffmanniana* debeat vocari, per me licet: nam & sic cum cæteris ipse folleo; modo *Hoffmanni* prudentia, & circumspectione, adhibeamus eandem. Optimus enim ille Vir curam tradens *Februm continuarum putridarum* curam *Febris ardentis*, curam *Inflammatoriorum quorumcumque morborum*, vix hujus misturæ, eive similis, meminit; longe alia, eaque sæpe adposita satis, præscribens: interea dum quamplurimi Medici, contra mentem, consuetudinemque *Hoffmanni*, Acutos suos ægros ab ipso morborum principio, perque totum eorundem decursum, hac mistura infarciunt totos. Tandem 4<sup>o</sup> quandoquidem Absorbentia acidis saturata, adeoque etiam Mist. *Hoffmanniana*, auxilii aliquando præstantis sint in morbis, quos diuresi curari Natura docuerit, ut nonnullæ sunt Dysuriæ, & quidam cum valido pruritu cutanei morbi, quales eorundem Vires in ægris Nosocomii demonstravi; facile per se quisque percipit, remedium hoc diureticum iis in morbis & damnosum esse posse, & damnosum sæpe esse, in quibus tota Schola Hippocratica cane pejus & angue vetet, quidquid, Natura non indicante, imo repugnante, crudos, ob idque ad motum bonum ac salutarem ineptos, movere possit humores: in eo occupata unice, ut coctionem promoveat, viasque excretorias omnes expediat sic, ut paratas easdem, aptasque omnes, inveniat post coctionem Natura, perque harum unam, pluresve, morbosam eliminat materiem.

§. VIII. Ad male intellectam meam de lata pulmonum cohæſione cum pleura ſententiam, utrum ſcilicet morbifera dicenda illa eſſet, an non; *Cap. II. §. V.* reſpondi: neglecta tamen neceſſaria animadverſione in citationem plurimorum Auctorum, qui apud Ill. *Hallerum Elem. Phyſiol. Tom. III. pag. 122.* vel Lobi, vel Alterutrius, vel Pulmonis utriuſque omnino concreti, in genere; & *pag. 133.* veluti *integræ cum integerrima reſpiratione cohæſionis*, teſtes fuiſſe perhibentur.

Itaque regero 1<sup>o</sup> Cunctorum, qui hic laudantur, Auctorum numerum valde exiguum eſſe, præ numero illorum, qui hanc adhæſionem ſive aliquam, ſive integram, morboſam notaverint.

2<sup>o</sup> Haud vero omnes illos Scriptores id teſtari, quod teſtati eſſe Ill. Viro *Hallero* videantur.

Primo enim Juvenis apud Ill. *B. van Zwieten, Comm. Tom. I. pag. 510.* non habuit adhæſionem dimidii pulmonis, ut *Hallerus* ſcribit, ſed dextri pulmonis tantummodo *medii lobi*. Addere neceſſario hic debeo, Ill. Præſide notante, juvenem, ante fatalem Apoplexiam, Hæmoptoicum fuiſſe.

Secundo, quæ ex *Actis Haarlemſibus* notatur cohæſio, *ſiniſtri* quidem totius pulmonis fuit, ſed non geſta inculpate. Additur enim reſpirationem fuiſſe a novem & ultra menſium ſpatio *valde impeditam*.

Tertio inter illos, qui integram cohæſionem cum integerrima reſpiratione obſervaverunt, recenſeor & ego, *Rat. Med. Tom. II. Cap. 8.* minus æque tamen. Sic namque ſcripſi ibidem *pag. 136.* „ Nec vitioſe reſpiravit quatuor primis diebus, uti neque poſt peripneumoniam curatam, niſi ſub mortem. Reſpiratio tantum fuit naturali brevior, pulſusque naturali paulo celerior ac debilior, vix tamen inæqualis. „ Præterea operam navaturus omnem, qua juxta Leges phyſiologicas vitæ modum explicarem hominis, qui totum thoracem, pleuram, diaphragma, pulmonem, pericardium,



dium, cor, vasa majora, mediastinum, in unum solidum sic concretum habuerat, ut harum partium nulla potuisset seorsim moveri; amplectabar, ut longe commodiorem, illorum sententiam, qui pulmones perpetuo statuunt contiguos pleuræ; & nihilominus rem hanc totam, ut mihi inexplicabilem, cogebar dimittere. Unde profecto qui hac mea historia uti vult, ad probandam integerrimam cum universo accreto pulmone respirationem, tum plus dicit, imo utcumque contrarium potius quam ego; tum si quid illud prius probaret, consequeretur quoque necessario id, quod omnia mox enumerata viscera partesque, in unum solidum perfecte concretæ, integerrimam & circulationem, & respirationem non læderent. Quia igitur quod nimis probat, probat nihil, mentio non fuisset hujus casus facienda.

Quarto *Boyleus* inter eosdem numeratur. Verum nec ille *integrum* Pulmonem adhærentem vidit, nec cum illo integre adhærente *integerrimam* notavit *respirationem*. Ait quippe se vidisse Pulmonem *multis in locis* adnatum, qualisnam vero respiratio fuerit, ne meminit quidem.

Quinto idem testari narrantur *Acta Edimburgensia*, *Act. Tom. II.* Acta quidem hæc nonnullos incompletos coalitus notant, sed egregii Viri *Waugh*, & *Lewis*, respirationis notabiliter in vita læsæ meminerunt; & ad adhæSIONem completam, cujus *Hallerus* mentionem facit, doctiss. *Andrew St. Clair*, respirationem, quamvis ætate mortem præcedente emendatam notet, eandem saltem antea admodum difficilem, atque cum tussi pertinaci, nocturnisque sociatam describit sudoribus: præterquam quod, si quid probaret hæc historia, una probaret, quod absolum, pulmones, ut pleuræ undique adnatos, sic eosdem totos tuberculis caseosis, vomificis purulentis PLENOS, respirationem integerrimam non lædere. Typographo metam urgente, deficit tempus reliquos laudatos in *Elem. Phys.* Auctores consulendi.

3<sup>o</sup> Demum assero multorum in Anatome minus versatorum Sectionibus diffidere, prudentiæ sæpe esse; cum in casuum Collectoribus haud desint, qui inter cohaesionem fibrosam, & aliam sive mucosam, sive inflammatoriam, sive serosam nuncupandam, de qua toties Tomis prioribus egi, quæque brevi ante mortem fit, haud sufficienter interstinxisse videantur. Quos porro si expunxerimus, numerus tandem illorum, qui notabilem integrumve pulmonem ad vicina coalitum, cum illibata respiratione, observaverint, exiguus omnium apparebit.

§. IX. Refutatio a me expectabitur forsitan iniquarum Quorundam animadversionum, publicis Novelis insertarum, in *Tomum VI. Rat. Med.* & in meas contra Ill. *Hallerum* editas *Difficultates*, ac *Vindicias*. Verum cum ab una parte harum animadversionum Auctores seipso refutarint, ineptissimos se demonstrando, qui de rebus Medicis tolerabile quid proferant; cum ab altera parte, quemadmodum paulo ante monui, eximium opus, meris, iisdemque numerosis experimentis Halleriana refutaturum, ad Typum paratur, aliusque Vir in Italia Celeberrimus simile contra *Hallerum* opus paret; æquitas a me hac vice poscit, ut hos Scriptores publice non prostituam, sed ipsis potius suam ipsorum crassam, & ineruditam Criticem condonem.



ANTONII DE HAEN

S. C. R. A. MAJESTATIS CONSILIARII  
ET ARCHIATRI

DE IRRITO USU CICUTÆ IN CARCINOMATUM  
ALIORUMQUE MORBORUM CURATIONE

EPISTOLA.







*VIRO PRÆNOBILI AC CELEBERRIMO*  
 BALTHASARO LUDOVICO TRALLES  
 MEDICO VRATISLAVIENSI

ACCADEMIARUM CÆsar. N. C. ADJUNCTO ET  
 ELECT. BOICÆ SCIENTIARUM SOCIO, &c.

**M** Emineris, Vir Celeberrime, quum in ultimo Tuo de inoculatione opere scripsisses, observationes Viennenses de cicutæ præstantia etiam Vratislaviæ comprobatas esse, quod, datis mox ad Te litteris, humanissime petiverim, ut curatorum illorum historiam, quos cognovisses ægros ante datam cicutam, quibus præter cicutam datum nihil admotumque fuisse nosset, quosque postea aut egregie emendatos, aut perfecte curatos, lætus salutasses, mecum communicare dignarere: me quippe tum fore, qui eandem publica luce donaturus, cicutæque futurus encomia-

miaſtes eſſem. Æternum enim numen veneror, quod eam mihi mentem benignus inſeverit, ut ſalute humana nihil acceptius, nihil umquam haberem antiquius; ad quam proſecto de qua lis eſt planta, plurimum conferret, ſi, quas illi vires ineſſe perhibent, revera poſſideret.

Eandem poſſidere illas, nullus principio dubitabam. Pilulas inde paratas, ultra ſexennium eſt, dederat mihi illuſtriſſimus noſter præſes *L. B. van Swieten*, ut in ſcirrho & cancro earumdem vires explorarem, ſuppreſſo quamvis plantæ nomine, quod publicare necdum ſibi licere aſebat: quo autem audax in experiundo eſſem ſuam ille fidem, ſuam interpoſuit experientiam. Neque proſecto vel hilum hæſitavi, fide munitus tanta atque auctoritate. Imo gratias divinæ providentiæ venerabundus egi, quod denique ſummarum maximeque formidandarum generis humani, in eoque amabilis præcipue ſexus, calamitatum medelam propitius revelaffet.

Experimenta igitur actuum inſtitui, eaque bene multa, antequam qua uterer cicutam eſſe noſcerem. Quod autem experimenta illa minus favebant, ego inſtituebam eadem auctiora, ratus, ne ab optimo quidem medicamento expectari poſſe, ut omnes ex æquo ſanaret: & forſitan eos, qui penitus incurabiles, meas hucusque in manus incidiffe, in caſuros tandem, qui ſaneſcerent, qui comprobarent medicamenti virtutes, qui eadem me, qua ceteros, lætitia perfunderent.

Interea aliorum recenter evulgatis experimentis tamquam propriis meis gaudebam, & ubique laudabam cognitæ tunc mihi cicutæ vires. Eramque ejus in Italia præco. Et, ſi quem cupido tenet noſcendi, cur nobiliſs. comes *Roncalli Parolino* in epiftola ad *Cl. Bianchi* conqueratur: *che io non foſſi troppo cortefe*; cauſſa eſt, quod cum Mantuæ 1760., menſe Septembri, ille me officioſa ſalutatione honoraret, & in cicutam acriter in-



veheretur, ego forsan paulo acrius ejusdem efficaciam propugnarem.

Atque ita fere biennio egi. Tandem quum ea experimentorum meorum infelicitas esset, ut quibus cicutam spatio anni dimidii, anni integri & sesquialterius, dederam, eorundem nulli sanescerent, unus periret alterque; quum præterea similes querelæ aliorum aures circumsonarent; penitus, fateor, animus vacillavit.

Interea obstupescens inaudio *libellum* de cicuta alterum prelo mandari. Itaque *Ill. præsidem* adire ego; ipsi infortunia mea exponere, diaria 23. ægrorum, quos ab initio in curam susceperam, monstrare, obtestari per omnia sacra, nihil ultra publici juris fieri permitteret, donec quæ a pluribus caperentur experimenta numerosiora omnem amovissent hæsitationem. Quippe si, quæ ego infortunia mœrebam, eadem & aliis contingerent, eosdem his præposteris laudibus indignaturos, nostramque facultatem de fama, quam celebrem, quam venerandam, apud exteros conquirere cœperat, periclitaturam. Interea me non quidem ultra in Nosocomio, in quo præ locorum angustia foetor cicutæ, ceteris, eadem non utentibus, permolestus esset, sed foras, eadem, qua antea sedulitate experimenta prosequuturum.

Non expedit, enarrare, quis fuerit hujus colloquii finis. Nosse sufficiat indictum mihi bellum ab eo die fuisse, idemque hucusque non continuare duntaxat, sed ingeminare.

Quum interim, quo in experiundo frequentior, eo essem in curando infortunatior, experimentis meis vel ideo fidem esse denegandam contenderunt, quod non ultra in Nosocomio eadem sub oculis meis instituerem: Homines, ac præsertim quidem pauperculos, a medico medicamenta accipere, sæpe eadem aut negligenter, aut nihil omnino assumere, vendere aliis, & sic porro.

Quamvis experimentis in Nosocomio captis æque fuisset quam extrailud infelix; quamvis etiam in libellis de cicuta plura experimenta extra quam intra Nosocomium capta legantur, tamen inani hoc prætextui adhuc semel obviam i.e. volui. Septemdecim ægros, quos similes varii morbi affligerent, quique in *libello primo de cicuta recensentur*, in nosocomium meum induxi, cicutam iisdem omnimodo applicui, & bis in septimana cunctis Medicinæ studiosis, proficerent, nec ne, examinandos produxi.

Emanante in urbem cicutæ apud hos omnes inertia, accusarunt me, quo fundamento nescio, ignorantias methodi veræ cicutam exhibendi. Qua de causa humanissimis litteris *Illm. Præsidentem* hortabar, ut hora sibi commoda vellet examinare ægros meos, tum qui in Nosocomio degebant, tum etiam qui extra illud cicuta utebantur, ad datam quippe horam omnes illi sistendos: nihil mihi gratius fore, quam ex ipso discere, non vitio cicutæ, sed meo, qualiacunque infortunia conquererer, contingere. Sed neminem vidi, & ne responsum quidem. Experimenta nihilominus auxi ad numerum CXX.

Quum tandem cancrofarum fæminarum octo mihi periissent, ceterorumque & nemo curaretur, & multi peiorarentur; quumque ex *Bohemia*, ex *Imperio*, ex *Gallia*, *Anglia*, *Belgio*, *Italia*, similia infortunia aut litteris perciperem, aut dissertationibus intelligerem impressis, ab experimentis novis desistendum esse arbitratus sum; cicutam & inertem esse & noxiam a prægressis convictus.

Interim videas, quanti faciam Tuam, optime Tralles, auctoritatem, dum vix lectis in ultimo Tuo opere *Breslaviensium* experimentorum encomiis protinus & eorundem historiam abs Te peterem, &, sub narratis supra conditionibus, me evulgaturum illam, tum laudaturum



turum cicutam esse sponderem. Qui hisce meis adeo æquis atque sinceris votis satisfaceret, Tu, amice candidissime, unus esse debuisti, unus esse potuisti, qui, veri amore raptus, & Tua propria, observata ex Diariis depromere, & cunctorum Breslaviensium Medicorum, Chirurgorumque, qui cicuta usi erant, testimonia, proprio ipsorum nomine consignata, colligere, & ad me tanta cum diligentia & attentione transmittere dignabare.

Vix accepta, legi eo, sancte testor, quo promiseram animo. Reperi catalogum undeseptuaginta ægrorum. Vidi clarorum virorum, qui cicutam ipsis dederant, alios aliis esse huic plantæ favorabiliore; Teque, Vir egregie, minus quam expectatam: vis probe a me notari, non scripsisse Te, pag. 234. vexatissimi argumenti; Vires ejusmodi cicutæ abs Te visas, & comprobatas esse, verum ejusmodi de illa laudes percepisse, quæ illis, quas Tu novo huic invento decernere posses, majores essent.

Horum undeseptuaginta scirrho vel cancro sive occulto sive aperto 36 laborarunt, omnium ergo media parte plures. Laborarunt 6 colli tumoribus, Vomica 1, Fluore albo 3, Asthmate 1, ventris duritie ac tumore 3, teste indurato 4, venereis denique malignisque ulceribus 15.

Ex illis, qui scirrho aut cancro laborarunt, periere 30 miserrime, & incurabiles 6 manserunt, colli tumoribus laborantium 2 curati, 4 minime, Vomica curata, Asthma levius inde creditur, 3 leguntur ventris duritie ac tumore curati, 3 curati a duro testiculo, 1 non. Tandem a malignis ulceribus ac fistulis 11 curati, 4 non curati.

Liceat, Vir eruditissime, hæc singulatim examinare. Deprehendimus primo ex eis, qui vero scirrho aut cancro laborarunt, nullum seu nullam (pleræque enir-

foeminæ sunt) curatum esse, earundemque  $\frac{5}{6}$  misere per-  
riisse. Advertimus quoque hoc peculiariter à practi-  
cis *Breslaviensibus* esse notatum. Scilicet egregium  
Chirurgum *Hauptmam* aperte fatentem legimus, a-  
pertum cancerum numquam se cicutâ curasse, nec cu-  
ratum a quopiam nosse. Dexterrimum Chirur-  
gum *Beer*, ob a nemine curatum se vidisse, nec se unquam  
illum curasse. Exper. Medicum *Wickè*, cancro nun-  
quam profuisse cicutam. Experti itaque idem sunt  
*Breslavienses* quod ego, quod Viennæ multi mecum,  
quod centeni medici *Galli*, *Itali*, *Germani*, *Angli*,  
*Belgæ* toties experti sunt.

Si cum hisce adeo universalibus observatis, om-  
nem omnino excludentibus exceptionem, conferamus  
libellos de cicutâ, primum, alterum, & supplemen-  
tum necessarium, deprehendimus nihil frequentius à  
cicutâ, quam cancos & scirrhus aut curari, aut e-  
mendari insigniter. Libell. I. pag. 6. „ In strumis scir-  
„ rhosis, in indurationibus glandularum, mammarum,  
„ & pessimis canceris non exiguos effectus vidi, &  
„ expertus sum. „ — Pag. 103. „ Indurata & scir-  
„ rhosa in iisdem etiam casibus resolvit, ubi alia me-  
„ dicamenta maxime penetrantia nihil efficiunt „ Pag.  
104. „ Cancro ponit limites &c. Acre cancrum e-  
„ mendat, foetorem dispellit. Ichorem cancrum in  
„ bonum Pus convertit. Pag. 100. Dexter F. *Le-*  
„ *ber* pertinacissimos scirrhus in diversis corporis par-  
„ tibus resolvit. Cancros plurimos non modo in  
„ mammis, sed & in facie, ad oculos, nasum &c. e-  
„ mendavit, & quosdam integre curavit „. Sunt tot  
fere scirrhorum aut cancrorum curationes, quot capita  
libellus habet.

*Libellus alter* sic inquit: „ Quo sæpius cicutam ægris  
„ exhibeo, eo majorem semper in hac planta virtutem  
„ & effi-



„ & efficaciam admiror. — Pauloque post, opus non  
 „ esse scribit eam ornare encomiis, quum eadem accu-  
 „ ratissime capta experimenta eloquantur „. Nec mi-  
 „ rum, quum libellus integer, innumeros penè referat  
 „ a cancro aut scirrho cicuta persanatos efficacia. Qua-  
 „ re & pag. 287. legitur: „ *Cicuta cancrum curat*. Id,  
 „ *multiplici experientia convictus, vidi*. — Et pag. 291.  
 „ *si femina statim in principio mala sua detegant, &*  
 „ *si Medicus debito tempore cicutam adplicet, certus*  
 „ *sum, nos intra uliquot annos raro visuros mammarum*  
 „ *cancrum. Et supplementi necessarii*. Pag. 37. „ *Cicuta*  
 „ *fundit scirrhos etiam antiquos*. P. 40. *Cancrum curat*  
 „ *aut emendat ejus acrimoniam, Pusque bonum inducit,*  
 „ *sopit dolores.* „

Libello de *Stramonio* &c. p. 111. & 112. „ *Cicuta*  
 „ *dissipari, ait, veros inveteratosque scirrhos, & cancos*  
 „ *exulceratos* „.

Libello de *Colchico autumnali* p. 77. easdem canit  
 de cicuta laudes additque: „ *Balneum ex cicuta infusa*  
 „ *paratum, cui totum agrotantis corpus immergitur,*  
 „ *multum subinde juvat, efficitque ut extractum interne*  
 „ *datum longe citius scirrhos & tumores solvat, sanetque*  
 „ *ulcera cancrosa saniosa*. P. 92. „ *Medicus - - - pro-*  
 „ *priam uxorem cum omnium stupore ab ingenti mammae*  
 „ *cancro liberavit.* „

Quid ad hæc omnia, Vir carissime? Viennæ, ejus-  
 que singulari in vico cicuta multiplici experientia *scir-*  
*rhos veros, antiquos, inveteratos, pertinacissimos resolvit,*  
*curat, cancos ingentes, exulceratos sanat.* — Dum in-  
 terim Breslaviæ. Pragæ, Mediolani, Parisiis, Londini,  
 Amstelodami, tam ii, qui ceterum laudant cicutam,  
 quam qui eandem vituperant, illam in cancris unanimi  
 voce inanem clamitent, in scirrhis vanam reperiant.  
 Quid, inquam, ad hoc? Cicutam Viennensem, ais,  
 palamque ajunt tecum omnes *Breslavienses*, Tui colle-

gæ, miranda hæc solam patrare, indigena aliarum regionum curari nullos.

Sed *Viennensis* cicutæ libras, ultra 500., *Viennæ* emptas, ceteræ regiones devorarunt, nec umquam scirrhus cancroſve veros se inde curasse, vel ipsi fatentur sponte, vel veritate convincuntur: Nonne vestri id unanimi voce clamant? nonne idem plures nationes?

Verum urgebis ex *Libello 2. de Cic. p. 3.* amaras querelas, in hæc verba erumpentis scriptoris: „Doleo  
„summopere, centenas aliquot libras extracti cicutæ;  
„ex herba sicca parati, me infcio, *Vienna* in alias regiones esse transmissas; Quod nonnulli id semel ex recentis penuria fecerunt, dum ad externas regiones plus mittendum esset, quam de extracto ex recenti herba parato mitti posset, inficias non ivero; ast vero Pharmacopœos sequentibus postmodum annis ex recenti planta extractum parasse, cum certissimum est, tum ex eo patet, quod ejusmodi nihil umquam postea ab auctore postulatum sit.

Si ergo unico anno id contigit, id annis posterioribus viribus non potuit derogare cicutæ: quin etiam quo anno id contigit, si minores magnas tamen, vires ejusmodi extractum possidens effectū bono apud extraneos laudatum fuisset.

Obiicies mihi secundo auctoris querelas in *supplemento necessario* p. 8. & 9. „Extractum vero non ubique ad meam mentem paratur. „Sumunt enim  
„succī expressi ingentem copiam, eam in vase cu-  
„preo igne satis forti coquunt, foetor inde ingens  
„longe lateque spargitur, avolat, quod est optimum; præterea nimium sollicitè succum & extractum purificant. „Subterfugium hoc æque ægrè quam ego, Præstantissime Tralles, admittes, si mecum cogites, herbæ foetorem, qui nunc optimus a  
con-



conquerente auctore vocatur, maxime avolare, dum ad fomenta & injectiones aqua coquatur; & tamen hujus decocti egregias celebrari, in ejus operibus, vires: deinde nec foetorem in extracto parando avolare, cum mures perpetuo redoleat. Et si a vase cupreo nocumentum pateretur, id profecto symptomata a cupro genita demonstrarent.

Sed quid immoremur ejusmodi excogitatis subterfugiis refutandis, dum auctori urbiq̃ universæ notissimum sit, extractum cicutæ, quo ego mea infelicia experimenta ceperim, quod ille, egoque ad exterarum regiones, ubi nil effecerit, miserimus, esse plane idem, esse de eadem massa, ex eademque area petitum, ex qua petitum sit illud, quo ipse in Nosocomio suo, quo alibi admiranda illa perficere se dicat, quibus cuncti ejusdem scatent libelli. — Cessent itaque aliarum nationum medici experimenti defectum in cicutam suam patriam refundere: cesset ipse auctor, de cicutæ præparatione conqueri, dum constet; eodem cicutæ extracto, & me & multos externos, quo ille usus fuerit, usos esse.

Sed hoc pacto conquereris, Vir expertissime, non solui sed amplificari magis, quod explicandum mihi ænigma proposueras, cur scilicet tot *Viennensium* scirrhi, cancrique curæ laudentur. interea dum *Viennensium* medicorum plurimi, dum reliqui per universam Europam Medici atque Chirurghi, cicutam deprehendant esse ad hosce morbos curandos ineptam?

In rem ingratham atque odiosam me inducis, Optime Tralles: quum urgeas tamen expedire cam conabor. Ac quidem, si repetas mecum, cancri, scirrhi; scrophulæ &c. definitionem, & quam in re horum tumorum singuli a singulis discrepent, mox defectum insignem reperiēs in *cicutæ libellis*, qui hæc nomina sic commiscēt confunduntque, ut ad singulam fere historiam indi-

digeant correctione. Hoc semel admissio, ænigmatis Tui solutionem pro parte habes.

Missæ ad me fuit, ad convincendum me, die 3. Jan. 1760. Fæmina, quæ cicutæ usu a pessimo exulcerato cancro liberata dicebatur. Fæminam videram antea nunquam, ideoque num vero cancro laborasset ab eoque biennali cicutæ usu curata esset, aliorum fidè & testimonio credere poteram; ex enarratione autem mulieris haud ita fuisse suspicabar.

Biennio post urgebantur cicutæ patrōni, ut curatis per cicutam suis me pervicacem & obstinatum hominem, erroris convincerent tandem. Porro hi, qui integro quādriennio cicuta usi, jam numerosum jactabant curatorum catalogum, aptum hominem, quem ad me mitterent, non habuere, nisi eandem hanc fæminam. Et quod abs Te, Vir Clarissime, notatum velim, ipsa hæc fæmina, quæ biennio elapso in laudem cicutæ ad me missa fuerat, quæ post illud biennium adhuc unica erat, quam ad convincendum me, mandato coacti, aptam credebant, hæc, inquam, ipsa toto hoc ultimo biennio ob novam mammæ duritiem cicutam sumserat. Pulchrum profecto ad convincendum exemplum! Quo autem hanc ignominiam a cicuta amoverent, & in me (quis crederet?) converterent, schedulam dederant mulieri, in qua monebar, mammam mansuetius examinare; quandoquidem eadem, ante duos annos radius a me contrectata, induruisse sic, ut toto hoc tempore cicuta de integro indiguisset. Capis facile inane commentum. Itaque examinavi denuo, sed mansuete, fæminam, &, accuratius repetita cum illa morbi historia, convincebar, eandem nec cancro umquam laborasse, nec quo morbo laborasset curatam esse. Est fæmina casus secundi *Libelli primi de cicuta*. Tumores ambulantes, scrophulosos, illa gesserat per an-



annos, varias corporis glandulas, alias post alias, afficientes; loco sæpe motos emplastris, sponteve; renatos ac mole aliquando duriores cutimque nonnunquam inflammantes. Horum adhuc unum notabilem sub axilla gerebat. Repeto itaque, si consideres, illos, post millena experimenta, nullum mihi exhibere, præter hanc mulierem, potuisse; si attendes eandem scirrhosam cancrisamque fuisse numquam, ænigmatis Tui ignes solutionem.

Secundo, præcox gaudium de aliqua sub cicuta usu mutatione, quam etiam a natura factam cernimus, in causa fuit, ut curari jam, imo ut curatum clamitarent, quod tale minime erat. --- Sic nuperrime iterum contigit, ut fæminæ Comædæ, a cancro per cicutam curatæ, fama aulam expleret urbemque, eaque tamen ipsa, elapsis abinde 14. diebus, cancro mortua sepeliretur. ---- In *libello secundo* integræ cancri cura totis tribus paginis descripta habetur mulieris, cujus maritus lignum jam aptaverat, unde statuam Æsculapio suo conditurus esset, quam condituram mors brevi, ut privatis litteris novi, insequuta prohibuit.

Et, si legas in eodem *libello secundo* a Pag. 262. ad 277. ovantem de curato pene cancro historiam, an crederes, Vir doctissime, cancrum paulo post adeo malignum fuisse, ut fuerit ferro amputandus? Nec dubites: in trophæum cicutæ excellentissimus comes maritus, nunc princeps a rege fratre creatus excisam mammæ portionem *Praga Viennam* misit. Vidi, contrectavi, mensuravi illam. Tres pollices Viennenses tumor, jam spiritu, quo ferebatur, contractior, quacunque mensuraretur in parte, in diametro latitudinis habebat; in ea altitudinis duos. Prudens Chirurgus una abstulerat papillam, & pollicem latum substantiæ mammæ ab altero papillæ latere, utpote scirrhis minoribus refertam.

Ter-

Tertio, defectus memoriæ ( cur enim odiosiore verbo utar ) in causa fuit, ut, in ægrorum tradenda historia, cancerum exulceratum vocarent, ubi v. g. inflammatio in suppurationem octidui spatio abiverat; & ut ambos pedes foedissimis ulceribus exesos scriberet, ubi non nisi parvæ pustulæ duæ uni pedi aderant, quas prurientes puella scalpserat, & ubi tertia demum nascebatur a candelæ scintilla, quæ in idem crus, Chirurgo id examinante, infortunata exciderat. Convictus hac de re fui, quando anno fortisfiqui altero, ab illa ita dicta curatione, elapso, eadem puella me conveniens, ejusdemque mammæ novam inflammationem exhibens, præteritam dabat historiam suam. Curante me illico Chirurgum vocari, qui in *libello secundo* de cicuta hanc ut exulcerato cancro & cruribus exesis laborantem describi curaverat, juvencula eum de memoriæ lapsu convicit sic, ut defendere ultra se non posset.

Id generis historiæ plures existant. Lapsus memoriæ fuit, quando curatas a cicuta scripserunt duras viscerum obstructions; interea dum ex formula, quam mihi tradi curaveram, paulum extracti cicutæ, cum copioso sapone Veneto, & gummi amm. mistum, datum fuisse intelligerem.

Lapsus memoriæ fuit, quando, cicuta in ulcere gangranoso nihil proficiente, cortex Peruvianus miranda præstitit, & nihilominus non huic, sed illi, egregiæ emendationis laus adscripta fuit.

Lapsus memoriæ erat, inter integre a cancro curatos recensere, eorumque curationis famam undique spargere, quos, diro cancro enectos, dudum recondiderat tumulus. Equidem testimonia complura posideo.

Sic omnibus ad ænigma respondisse videbor; Tibi autem, Vir celeberrime, ut sentio, necdum. Difficilli-



ficillimus enim in credendo urges me, ut respondeam ad innumera testimonia cancroſi, v. g. ichoris in pus album bonum mutati, decreſcentis mox doloris, ſedati cujuſvis ſymptomatis, reditus cum ſomni deperditi, tum appetitus proſtrati, univerſique corporis toroſitatis; quæ ſub uſu cicutaë animadverſa, omnia reditum ſanitatis manifeſte demonſtrant.

Magna proſecto narras, Optime *Tralles*, ſed audi & alteram partem. Primo hanc ichoris in pus converſionem id per ſe non demonſtrare probabo; deinde docebo, non omnium obſervatis bona hæc ſigna cicutaë concomitari uſum.

Primo, bella donna *Tournefortii*, atropa *Linnaei*, ſolanum furioſum, ſolanum maniacum, *πύχρον παρανοιάσπον*. ex clarorum virorum conſilio & præſcripto, a me data cancroſis, eundem effectum edidit, ſæminarum cum interitu. Vide experimenta mea hac planta facta, *Rat. med. Tom. 2. p. 45. & 46.*

Secundo. Neque ego ichoris in pus converſionem obſervavi tam frequentem in hiſ, quibus cicutam dedi ego, nec in illis, quibus per alios eadem data adfui, ulceraque inſpexi; neque idem alii ita obſervarunt. Nonne & id mecum veſtri *Breſlavienſes* agnoſcunt? In eorum testimoniis plures ægri recensentur, quibus omnia in ambitu exſudans ichor eroderet; alii, quibus a cicuta ichor niger; alii iterum ulcus multo ſordidius, latiusque ſerpens. Appetitus autem proſtrationem in omnibus ſuis acerbæ conqueſt ſeſt. Clar. Chirurgiæ profeſſor *Neubaur*. Textorique ipſi *Tuo*, annon cum tumor major, tum ſordidius ulcus, tum novus ſana in mamma tumor, & in pleriſque glandulis, obſervabantur, interea dum cicutaë aſſiduum faceres copioſumque uſum? Et annon matronæ *Tuæ* ſcirrhus a *Vienneniſi* cicuta in peſſimum ſe convertit carcinoma, &, ut ultimis itel-

teris notas, jam occidit? Et in alio numquid non pro pure sanguinolentus a cicuta ichor. Omnes tandem vestri nec bonum corporis habisum restitutum cancrōsis; nec sæpe etiam vim dolores sopientem, somnumque conciliantem se expertos testantur. Videas ergo quam parum hæc omnia cum libellis de cicuta conveniant.

Et ut pauxillum adhuc in hoc argumento immoremur, quando auctor sic vim sopientem dolores, ac somnum conciliantem, cicutæ extollit, quando in *supplem. necessario* p. 40. ait, *sopit dolores*, quando ibidem p. 66. scribit, *sæpe mingendi dolores opio citius sistit*; cernimus tamen illum opio frequenter indiguifse. Lib. I. p. 33. 51. 56. 57. 75. *Libello secundo* Pag. 12. 14. 48. 49. 103.

Quin & incomprehensibile, ac plane paradoxon videtur, id statuiffe. Præterquam enim quod nec in meis, nec in *Breslaviensium* pluribus, ea vis cicutæ confirmata fuerit, si consulam auctorem, qua nemque dosi, a cicutæ extracto, hanc vim edl putet, video a granis 2 de die observasse eandem, & sic porro a granis 4, ab 8, a 12, 20, 30, 60, 120, 180, 240, idque haud rariore admodum casu, sed frequenti. Si granum opii consuevit homini blandum conciliare somnum, erunt alii, qui indigeant dupla dosi, rariores qui triplo, quadruploque, rarissimi qui quintuplo, qui sextuplo uno die indigeant. Cicutæ autem dosi cur adeo immense augenda sit, ex compartione cum ceteris paregoricis haud facile capitur.

Et in agris, qui carentes dolore, somnoque gaudentes, cicuta propter exulcerationes indolentes utantur, quo manet vis sopiens? Numquid quis inculpate fumet opii dosin consueta quinquaginta duplo maiorem? Utique vir mihi notus, qui antiqua atque pertinaci exulceratione versus tempus dextrum minime dolente  
la-



laborans, suasque tres extracti cicuta dragmas trime-  
stri spatio quotidie abliguriens, ut citra ullam emen-  
dationem, ita quoque citra ullum auctum somnum,  
eam copiam assumsit.

Itaque si primo tempore cicuta grani 4. 8. 10.  
bonus somnus adeo frequens erat, cur in libellis poste-  
rioribus praesentatur ejusdem semiuncia, quae ex prio-  
ris libelli calculo grana opii 24 imo 30 continere de-  
bet, cur, inquam, soporiferi remedii tam enormis  
in die una praescribitur dos, citra vel minimam  
indicatam cautelam; ut ratione paregorici fieri oport-  
tebat?

Auget paradoxo mirabilitatem hocce observatio-  
num par. *Lib. de cicuta* 2. Pag. 234. Miles, mul-  
ta a cicuta sperans, unciam extracti mediam, quae  
pauillatim adsumenda fuisset, die unico abligurit.  
Nullus inde somnus, sed alvus per triduum quin-  
quagesies.

Secundo, formula cujusdam Nosocomii & publi-  
ca testimonia certiores nos reddunt de cujusdam me-  
dici audacia, qui, a consueta cicuta extracti dosi  
nihil lucratus, integram ejusdem quotidie libram,  
longo tempore, forma pilularum, vel in mixturis,  
decoctisve solutam, singulis aëgris propinavit, absque  
tamen vel minima mutatione in somno vel excretio-  
nibus. Ubinam hæc virtus soporifera? Æternus de-  
buisset obrepere somnus.

Sed hac occasione pro ænigmate ænigma Tibi  
liceat, Vir clarissime, proponere. Explices mihi qui-  
dem intelligam sequentia. *Lib. I. p. 103.* Hoc reme-  
dium nullam corporis actionem, secretionem, aut ex-  
cretionem turbat, agit *modo insensibili*, nec alvum,  
nec vomitum, nec sudorem movet. Hæc scribeban-  
tur, dum triennii tempore innumera dederat experi-  
menta cicuta, ut ejus effectus jam certo certius con-

R

sta-

stare deberent. ---- Videamus Supp. necess. P. 35.  
 „ Raro tamen alvum movet, & rarissime vomitum;  
 „ quandoque transpirationem auget, sæpe autem uri-  
 „ nam copiosam & glutinosam prolicit. Etiam ipsi  
 „ auctori, Tomo 2. pag. 284. urina a cicuta copio-  
 „ sior. Iterum supp. necess. pag. 35. In *plurimis* ta-  
 „ men ægris *nullam* excretionem sensibilibiter auget „  
 ----- Mox vero P. seq. „ Auget secretiones, unde  
 „ sæpe aures, nares, os faucesque siccas, reddit hu-  
 „ midas, transpirantes „ ----- P. 38. Producit spu-  
 „ tum, ut jam monuerat Lib. I. P. 107. „ Cicuta non  
 „ impedit sputa, sed ea potius movet, „ Pergit Sup-  
 „ plem. necess. Pag. 27. „ Prodiit urina copiosa cum  
 „ multo glutine. „ Pag. 66. „ A granis duobus quo-  
 „ tidie extracti sumtis urina copiosissima, cum multo  
 „ glutinoso sedimine: dum vero uno die a cicuta  
 „ abstinetur, pauca est urina, nec videtur sedimentum. „  
 Si hæc ita se haberent, cicuta profecto potentius  
 diuretica famoso oxymelle colchicato foret.

Dum hoc mihi, Vir clarissime, explicabis, simul  
 addas, obsecro, aliquam super dieta elucidationem.  
*Lib.* enim 2. P. 291. „ Cicuta nunquam strictum exi-  
 „ git vitæ regimen. Admittit ea omnia, quæ ægri  
 „ ventriculus facile digerit, & quæ in bonum nutri-  
 „ mentum transeunt. Neque interdicitur vinum, ne-  
 „ que vitantur acida, prudenti & moderata copia  
 „ sumta. „ Et *suppl. necessarium* P. 64. Acida pro  
 condimento conceduntur, prædominantia vero minus  
 conducunt. Vinum bonum iis, qui assueverunt, non  
 nocet. Assueverunt autem pene Austriaci omnes, ideo-  
 que nullis eorum cancro laborantibus & cicuta uten-  
 tibus nocet. Attamen Lib. I. P. 105. cancrōsis & scir-  
 rhosis mammis nocere acida vinosa &c. In tanta se-  
 cum contradictione adhuc ignorat observationem plane  
 memorabilem Clarissimi *Breslaviensis*, quem veneror,  
 ami-



amici, quam legi attonitus, certo scilicet se scire, in cicutæ usu nihil nocentius esse carne ejusque jure. Profecto observationem ejus falsam nostrorum medicorum nonnulli clamabunt, qui cancos pessimos perfanare se gloriantur, juribus carniū, quibus cicutā incoxerit. Quamvis multa Tibi, Vir celeberrime, respondi, ut satisfacisse videri possim, tamen adhuc hæsitantem Te percipio, & serio rogantem, cur, præter libellorum auctorem, tot clari apud ipsum laudati viri, aliique venerandi Medici, cancos curatos se vidisse aperte testentur, dum interea numerosi per Europam medici, Vestrique omnes Breslavienses, ut ut quidam cicutæ dediti, id constanter negent.

Resp. prim. Non omnibus medicis maximeque junioribus licuit adeo felicibus esse, ut duros tumores rite internoscere noverint. Itaque ut hunc errorem in nonnullorum libros irrepsisse supra demonstratum fuit, sic in eundem incidisse, multorum data, typisque evulgata testimonia manifeste arguunt.

Resp. secund. Dum multi, auctoritate perculsi, nihil fidentius assumerent, quam vere curari scirrhus & cancos: dum fallentem passimque mendacem sub cicutæ usu emendationem suspicerent, mox illi se curare cancos, eosdemque prope curatos esse alta voce clamitarunt. Multorum tamen eorum in honorem asserere teneor, fuisse tanti candoris plures, ut, dum deceptos se viderent, præcox assertum revocarent, quemadmodum voce nonnulli apud me, litteris alii, illud revera revocarunt. De animi aut levioris aut perversi hominibus, qui, quo aut placeant, aut altius promoveantur, casus subornent, hic sermonem facere non convenit.

Sed tertio, historia medicinæ nobis res ejusmodi suppeditat, ut statui oporteat, plures eximios viros citra ullum detrimentum honoris in hunc errorem labi potuisse.

Egregius *le Dran* refert nobis foeminae cancerum, qui, si fuisset amputatus, 7. vel 8. libras pondere æquasset, in gangrenam abiisse, totaque sua mole bidui spatio de corpore fuisse separatum. Magna hæmorrhagia prægressa, pus bonum apparuisse purumque ulcus: labia ulceris, elapso 4. 5. septimanarum spatio coire, bonamque renasci carnem cœptam esse, tuberculum, quod pedetentim cicatricis æquaret magnitudinem, & minore quam mensis spatio in priorem excresceret magnitudinem.

Ponamus, cicuta sub usu, naturæ opera tale quid fieri; an Tu, Vir amicissime, an ego. an omnes nobiscum effectum adeo stupendum cicuta adscribere gravaremur? Erraremus tamen.

Cancro mammae domicella. Ultrajecti affecta ex summis viris, celeberrimis Ultrajectinae Accademiae professoribus, nihil sibi auxilii superesse, præter amputationem, intelligit; ea tamen lege, ut propter alium sub axilla tumorem operationem non subeat, nisi consultis prius *Leydensis* Academiae oraculis, Albino, Gaubioque. Igitur Lugdunum Batavorum proficiscitur, hos consulendi causa. At operationem propter illum axillæ tumorem dissuadet uterque. Pallians autem unguentum magnus præscribit Albinus. Repetit illa domum uni Deo rem committens & nec unquam usa unguento.

Elapso aliquo temporis spatio, contigit, ut celeberrimus Gaubius ab ægro Ultrajectum invitatus forte fortuna Chirurgum videat, qui secum Albinoque consulentem virginem fuerat comitatus: a quo hic mox percunctari adhuc ne virgo vivat? Et viventem exclamare ille & citra cujusque sanatam opem. Attonitus, vixque præ gudio se possidens, amicus illi hominum Gaubius, eam invisere tendit, ab eademque ut monuerat Chirurgus percipit, nullo au-



xilio unquam adhibito, nec Albiniano quidem unguento, mammam, haud diu post iter Lugdunense, detumescere coeptam tandem una cum axillæ tumore paulatim ad perfectam rediisse sanitatem.

Ex illa miranda historia ipse clar. Gaubius nosque cum eo omnes concludimus, in cicutæ laudem nos eandem enarraturos fuisse, si, quo tempore citra ullam medicinam juvencula curaretur, hanc ipsi herbam dedissemus.

*Acad. Reg. Soc. Paris. anno 1703. consulatur.* Vir nobilis in fossam cum equo præcipitatus, testiculum læsit. Labentibus quatuor exinde annis, testem sensim crescere atque indurescere, indolentem tamen, percipit. Anno quinto tumor cum ingens, tum durus, acute dolet. Scrotum empiricus aperuit, quosdam liquores iniecit; incassum autem his tentatis, oportuit, ut vulnus denuo consolidaretur. Resolventia emplastra non profuerunt. In consilium vocati Chirurgorum *Parisinorum* celeberrimi, amputationem quidem proposuere, sed quibusdam de causis periculi vacuum haud esse addiderunt. Dubiæ alæ committere se ille nolens, *Lugdunum Gall.* petit; convocatosque ibidem celebriores in arte magistros ejusdem reperit cum Parisiensibus sententiæ esse. Ille vero nihil horum. Domum reversus exacta diæta usus est, & subinde rhei tantillo. Spatio anni necdum decurso, moles, durities, dolor, testem relinquunt; sic, ut illo equite nihil sanius.

Similem morbum si, adeo inopinato, dum cicutam exhiberemus, consanescere cerneremus, an dubitaremus cicutæ curæ adscribere laudem? Annon probabile magnos in arte nostra viros sic fere inevitabiliter posse errare.

Sed est & alia ratio nostri hac in parte erroris. Tumor nec scirrhus, nec cancrus, origine;

incremento, duratione, magnitudine, duritie, aspera inæqualitate, dolore ac purpureo cutis colore, potest nobis cancrusus videri, ut cancrusus curari, qui neutiquam cancrusus sit. *Tom. 7. Rät. Med. a P. 129. usque ad 137.* historias complures enarravi, quæ cum mihi tum aliis scirrhi ac canceri larva imposuerunt, quas ne longus sim quæras ibidem. Sed cogita mecum hydaticum tumorem, quem ibidem scirrhum, qui in cancrum vergeret, mentitum esse videas, a natura resorberi cicuta interim exhibita; an facile nobis condonandum non foret, quod primo impetu cicutæ laudem tribuerimus? Profecto nemo nobis vitio hoc vertere posset; modo quod honestos, quod candidos viros decet, ea essemus ingenuitate, ut, quando postea experimentum, in millenis aliis, qui scirrhos cancrisque referrent, tumoribus falleret, quando etiam ejusmodi tumoris amputatione de errore convinceremur; quando denique ipsorum lympham posse resorberi clare intelligeremus; ut inquam, tunc nos primo illo impetu præmaturius exsultasse fateremur. Annon credis Vir clarissime, celeberrimi *Morgagni* uxoris, cujus ibidem memini, tumorem, strumofamque ibidem *Valisnerii* puellam, ad hoc tumorem genus referri merito posse? Utique purgantia eaque repetita, imo spontaneæ diarrhœæ, plus simplici vice ejusmodi tumores mihi videntur abstulisse. Et miles, cujus p. 22. memini, qui sive a cicuta, sive errore diætæ, sive sponte, alvum quinquagesies tridui spatium deponendo enormes suos omnium fere colligi glandularum tumores amiserat, annon quoque id genus tumorem habuisse videtur?

Atque ita Tibi, Vir Honoratissime, sufficienter respondisse videor ad ea, quæ ad scirrhosos & cancrusos tumores seu veros seu falso sic creditos, seu tandem eosdem mentitos, spectent. Jamque proprius  
ani-



animi candor viros in arte graves eo redegit, ut cicutæ in his tumoribus curandis efficaciam ignavius tueantur, tuerique imo vix audeant ultra. Ne tamen hæc plantâ eandem, quam toties sæculis superioribus subierit, subeat denuo sortem, laudant eandem in ulceribus fistulisque malignis, faucium, linguæ, labiorum, genæ, juguli, colli, crurum, brachiorum, universarumque denique corporis partium. Video plures vestrum velle hæc saltem in parte patrocinari eidem.

Æquum est & cicutæ vires in hisce morbis examinare, ut demum Tibi Vir existimatissime, omni ex parte obedivisse videar.

Plura tantavi hujus generis experimenta cum cicutâ, quæ mihi pro votis non cesserunt; tentaverè vestrum plures sine successu; *Viennensium* simile tentamen sæpe frustra fuit. Attamen & vestri & nostri felicem gavisi sunt tentaminis sui effectum, haud omnino rarum, quem an cicuta, qua cicuta, ediderit, examinandum est.

Liceat examini huic præmittere, quæ nuper *Tom. 9. Rat. Med. cap. 6. §. 2.* scripsi. „ In morbis „ curaneis, antiquis, ulcerosis, in ulceribus spinæ „ ventosæ foedissimis, in tumoribus arthritici, conti- „ nuamus id, quod superioribus annis innui, pul- „ chras observare aut emendationes aut curationes „ eorum, quos consueta artis auxilia haud levave- „ rant, ope sollicitæ continuæque applicationis aquæ „ calidæ sive puræ, sive, ne forsan pauperes eam „ præ nimia simplicitate neglegant, repudiantve, me- „ dicatæ redditæ, a malva, parietaria, chærophyllo, „ althea, sem. lupini &c. vetustiores, viros in arte „ graves, hæc in parte imitati, qui, dum consuetis „ unguentis, & emplastris ejusmodi mala aut diffici- „ lius aut nullatenus curari cernerent, fomenta a-

„ quosā, reddita ejusmodi vegetabilius medicamento-  
 „ sa, vehementer laudarunt: Dioscorides, inquam,  
 „ Dodonæos, Clusios, Lobelios, Sanctorios, & no-  
 „ vissimum auctorem præclarum Morgagni, qui epist.  
 „ 37. §. 3. calcaream podagricorum materiam sola a-  
 „ qua calida fuisse resolutam refert. „

Ut hoc probem, unam adferam alteramque hi-  
 storiam: Juvenula annos nata 24. me cum sua  
 matre convenit 17. Febr. 1759. genam suam fini-  
 stram exhibens, ab anno ætatis octavo, scilicet a  
 16. annis, foede exulceratam, sic quidem, ut jam  
 inde oculo suo, quem vehemens inflammatio fre-  
 quenter occupabat, valde metueret. Octennium erat,  
 quod incassum sibi esset ptyalismus per Mercurium  
 tentatus. Pædore præterea anxia & tussiens, men-  
 ses habens raros, alvumque segnissimam, ope me-  
 dica undique egebat. Exploravi itaque, inde usque  
 ad anni 1760. 25. Martii diem, omnia artis in-  
 terna externaque auxilia, quæ nota mihi in arte e-  
 rant, & quibus nonnunquam ejusmodi mala cedere  
 videram. Sæpe sæpius spes curæ affulsit, totiesque  
 iterum evanuit. Omnium maximam spem faciebāt  
 dragma lapidis medicamentosi Crollii cum Lib. II.  
 aquæ mista, verum neque etiam hinc constantia cu-  
 ræ. Itaque a 28. Martii die 1760. cicutæ extra-  
 ctum dedi, augendo quotidie dosin, donec ad drag-  
 mas ejusdem duas pervenerim, eamque dosin diu  
 continuarem. Faciem autem primo emplastro de ci-  
 cuta texi, eoque incasso, decocto cicutæ diu noctu-  
 que multo tempore fovi. Bimestri elapso, ob fe-  
 brim quotidianam, prurientesque totius corporis pu-  
 stulas, aliquantisper hanc methodum interrompere  
 debui: febre cum pustulis devicta, resumsi. Cogit  
 deinde vomitus sanguinis, & œdema crurum, desi-  
 stere parumper. Sed his mutatis in melius ad eam-  
 dem



dem methodum redditum est. Sub diu protracto cicuta<sup>æ</sup> usu, & tumor ad axillam nascebatur, & fluor uteri albus, quod utrumque iterum sub ejusdem continuato usu cepit. Tandem quod sub prioribus medicandi modis dolueramus, idem & hic, ut nunc læti exsultaremus, nunc iterum spem omnem curæ abiiceremus. Cum nihilominus remedii fama me animaret, tertiam hanc ejus resumptionem a 18. Febr. 1761. ad 7. August. protraxi. Tunc vero cachexia univ<sup>er</sup>sa, & non minus dolentia, quam irregularia catamenia, a cicuta abstinere, urgentibus maxime occurrere symptomatis, jusserunt. Mense Octobri a gena versus labii inferioris tam internam, quam externam partem, subnascebantur bullulæ instar phlyctenarum, quibus succo sempervivi majoris & melle rosaceo profui. Tandem corpore nunc emendatiore ad diem 28. Januar. 1762. faciem fovere cœpi chærophyli siccati decocto, sic ut calide tota die ac nocte applicaretur & spongia eo madida continuo, non ablato apparatu, renovaretur. Unde intra 14. dies mutatio adeo insignis, ut quot aderant medicinæ studiosi mecum obstupescerent; brevique postea ulcus cernerent integre curatum, cicatrice inferius tantum paulo rigidiore, & nova cute cum antiqua minus concolore. Sæpius vero postmodum indiguit medicina, priorum cachexiæ symptomatum nunc his nunc illis redeuntibus, ulcerè autem bene clauso.

Puero similiter a longo tempore pertinaciterque affecto solus usus aquæ cum malva coctæ, interpolatis purgantibus, curam publice perfecit.

Puella rustica, propter tumidas induratasque atque hinc inde fœde exulcerantes universi colli glandulas, æstate anni 1761., cicuta<sup>æ</sup> extracto & fomento in nostro Nosocomio incassum tractata, tandem

dem cicutæ valedicto, simili, qua prior, methodo sesquianno postea decurso curata est, domumque remissa. Recidivam cessantibus mensibus passa rediit in Nosocomium finiente Octobri 1764. Spatio hoc trimestri, aquosis emollientibusque tantum fovendo ulcera, & menses restituendo, curatam remisimus.

Horrenda manuum crurumque elephantiasis, æque quinquenni, epoto decocto althææ, partibusque affectis eodem diu ac noctu fotis, balneisque, eousque hac hyeme curata est, ut vas, libras octo liquidi capiens, deciduis crustis tuberibusque expletum fuerit. Renascens crusta eodem auxilio decedit. Si morbus non curetur, id quod ignoro, saltem ab aquæ calidæ usu fotuque capit insigne levamen.

Sed ut hæ curæ succedere mihi, ita plures omnem meam operam luserunt; id quod & cicuta. utentibus vestris nostrisque practicis, pari modo contigit.

Attamen mecum, Vir clarissime, censes, opinor, id evidenter ex dictis constare, quod, si ejusmodi curæ nonnunquam perficiantur, eæ perficiantur unico aquæ calidæ fotu, sive ea pura fuerit, sive cum uno altrove simplicium cocta. Sed corpora vides uno atque alio tempora huic curæ faventiora. Sic juvenula mea non curabatur olim fotu cicutæ, curabatur autem postmodum chærophylli decocti fotu. Et, quum constet experimento multiplici, non herbam sed aquam adduxisse salutem, contingere potest, ut prius adplicatum chærophylli, vel althææ, vel malvæ decoctum nil profit, postliminio vero profit illud cicutæ, & vice versa, ut, hoc primum adplicato, non curetur morbus, applicato verro *illo* deinceps, curetur. Aperte id juvenula, plures alii, evincunt.



Vera proinde ratio patet curationum, quæ cicutam famosam reddidere. Capitur, unde *Anglus* ille, contractus atque rigidus totus, cujus restitutio publicas explebat novellas, ad suarum redierit usum partium. Intelligitur, cur *Parisiensis* medicus, celeberrimus *Maloet Acad. Reg. soc. Par. anno 1728.* exsiccationem & contractionem summam cruris, ex quo nata ancylosis erat, ob eamque jam decreta cruris amputatio, tam feliciter reddiderit sanitati. Curam huic similem pro parte jam absolvi balneo aquæ, bis die adhibito, pauculum lavendulæ aquæ addendo. Nec *Cl. Maloet* nec alii nec ego ad similia indigemus cicuta: &, qui similia fotu & balneo cicutæ perfecisse se gloriantur, concedere demum nobis debent, vi aquæ & non cicutæ se ea perfecisse.

Quæri tandem posset, *an cicuta nemini umquam mortalium noceat?* Negatur audacter. Sæpius repetita legitur negatio. Utinam demum id adfirmare ferius ocyus non cogeremur! Profecto completa illa omnium totius corporis partium insensibilitas, quæ, nullo ejusmodi morbo prægresso, qui simile quid gignat, nata sub usu cicutæ, & pertinax observata *Breslaviæ* fuit, pene cancroso bonum pus jam dante; quemadmodum aliqui eorum, qui cicuta in cancro utuntur, ante mortem experiri solent; ulceré cancroso præ deficiente pure aut ichore jam sicciori; id quod passim illis contingere cernimus, qui a cancro per cicutam curati dicti, brevi moriuntur; an, inquam, cicutam suspectam reddere non possit?

*Socraticum* per artus gelu, multis septimanis molestum & ad mortem usque perseverans, in publico civitatis ministro sub usu cicutæ genitum, bini clari & seniores urbis medici mecum gemebundi videntur.

An autem publica; eaque fere quotidiana exempla non prostant, quæ demonstrent, scirrhis & can-  
crosis mortem a cicuta accelerari? Luculenta 30. fe-  
re annorum praxi edoctus, fœminas complures, quas  
dirum hoc malum adfligebat, cura; ut vocant, pal-  
liativa, bono regimine, per plures minoresque annos  
in vita servabam; quod idem mecum omnes practi-  
ci se fecisse latantur: ex quo, vero cicuta percre-  
buit, vidimus has fœminas omnes; quibus & ego  
& alii cicutam constanter dedimus, miserrime; soli-  
toque citius perire. Quin & nonnullis; indirecte  
saltem, me cicuta vehementer nocuisse; est quod  
acerbe dolere numquam satis possim. Quum enim  
principio ægre ferretur, me mammæ tumorem mo-  
bilem, eumque in corpore unicum, enucleando cu-  
rasse, ac si cicutam sua privare gloria intendissem;  
debui deinceps omnes ejusmodi fœminas cicuta tra-  
ctare, pereuntesque cicuta videre, quas ferro alioquin  
sanas integrasque conservaturus fuisset. Horrorem  
profecto omnium per Europam medicorum animis  
incutiat oportet memoria tristes millenarum mulierum;  
quas ab elapso retro septennio hæc planta aut lon-  
ge præmaturius occiderit, aut unico salubri ferro de-  
traxerit.

Nunc ipse per Te, æquissime ac candidissime  
Tralles, judices velim, utrum cicuta nocuerit mor-  
talibus; nec ne?

Atque ita abunde me ad omnia Tua respon-  
disse, arbitror. Interim, Vir amicissime, miseran-  
dam meam cogita sortem, quem, quod torrenti me  
opponam, odium inique prosequitur, calumniæ im-  
pune lacerant, & omne deferit tutamen. Vivo ni-  
hilominus, & tranquillus. Omnipotentis in sinu re-  
cumbo. Illi, Illi, inquam, unice debeo, qua du-  
cor, animi fortitudinem, majorem debiturus, dum  
quæ



quæ impendunt mihi supervenerint. Non enim cedam ultroneus. Professoriam spartam, quoad licuerit, ornabo. Vale, ama me, perpetuoque in Tuis habeto.

Dabam Viennæ 3. Feb. 1765.























